

Uso di sostanze illegali nella popolazione giovanile scolarizzata. Anno 2012

ITALIA	15-19			PREVALENZA NELLA VITA (%)														
				15			16			17			18			19		
				M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T
SOSTANZE																		
Cannabis	33,0	23,2	28,1	11,2	8,4	9,8	25,7	16,3	21,1	33,3	23,0	28,2	42,4	29,0	35,4	49,7	37,0	43,4
Cocaina (totale)	5,4	2,4	3,9	2,1	1,7	1,9	3,6	2,1	2,9	4,6	1,9	3,3	6,1	2,4	4,2	9,8	3,8	6,8
Eroina (totale)	2,3	1,2	1,7	1,5	1,6	1,6	2,4	1,2	1,8	2,1	1,3	1,7	2,6	0,7	1,6	3,0	1,0	2,0
Allucinogeni (totale)	5,4	2,4	3,9	2,5	1,4	1,9	3,8	2,2	3,0	4,8	2,5	3,6	6,1	2,1	4,0	9,3	3,8	6,6
Stimolanti (totale)	5,2	2,5	3,8	2,4	1,7	2,0	3,8	2,1	2,9	4,4	2,6	3,5	5,9	2,4	4,1	9,0	3,5	6,2
Alcol	90,1	87,1	88,6	80,2	75,0	77,6	89,4	85,4	87,4	92,1	89,1	90,6	93,6	92,3	93,0	94,4	92,8	93,6
Energy drink	67,6	49,8	58,7	60,2	42,2	51,2	65,0	48,3	56,7	69,0	50,8	60,1	71,2	53,2	61,9	71,8	53,6	62,8
Tabacco	60,4	61,5	60,9	40,1	40,6	40,4	56,1	57,2	56,6	62,1	64,1	63,0	68,1	67,5	67,8	73,4	75,5	74,5
Anabolizzanti	2,7	1,0	1,9	1,8	1,0	1,4	2,1	1,3	1,7	3,4	0,9	2,2	3,1	0,7	1,9	3,2	1,0	2,1
Psicofarmaci (totale)	10,4	20,3	15,4	8,5	16,8	12,6	9,6	19,2	14,4	9,7	20,1	14,8	10,8	20,2	15,6	13,0	24,7	18,8
Farmaci attenzione	4,3	5,4	4,9	3,4	4,2	3,8	4,2	4,9	4,5	4,0	5,8	4,9	4,2	5,0	4,6	5,6	6,9	6,2
Farmaci diete	2,3	7,2	4,8	1,6	5,6	3,6	1,9	6,9	4,4	1,9	7,4	4,6	2,8	7,4	5,2	3,2	8,5	5,8
Farmaci dormire	7,0	13,7	10,4	5,7	11,2	8,5	6,5	13,0	9,7	6,6	13,5	10,0	7,5	13,3	10,5	8,6	16,9	12,7
Farmaci umore	2,2	3,8	3,0	1,8	3,0	2,4	2,1	3,7	2,9	2,0	3,4	2,7	2,5	3,9	3,2	2,8	4,7	3,8
Gioco d'azzardo	60,6	43,2	51,8	53,0	38,3	45,6	58,2	41,0	49,6	59,6	42,8	51,2	65,0	44,0	54,0	66,8	48,6	57,7

Fonte: Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche

Nota: allucinogeni: LSD, funghi allucinogeni e ketamina; stimolanti: amfetamine, ecstasy e GHB; binge drinking: 5 o più "bevute" di fila
 psicofarmaci: farmaci per dormire, diete, iperattività e umore

Uso di sostanze illegali nella popolazione giovanile scolarizzata. Anno 2012

ITALIA	15-19			PREVALENZA NEGLI ULTIMI DODICI MESI (%)														
				15			16			17			18			19		
				M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T
SOSTANZE	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T
Cannabis	26,7	17,5	22,1	9,4	6,9	8,1	21,9	13,7	17,9	28,3	18,6	23,5	35,0	21,9	28,2	37,1	24,8	31,1
Cocaina (totale)	3,8	1,6	2,7	1,7	1,5	1,6	2,6	1,3	2,0	3,2	1,4	2,3	4,5	1,3	2,8	6,6	2,3	4,5
Eroina (totale)	1,8	0,8	1,3	1,2	1,2	1,2	2,1	0,8	1,4	1,7	0,9	1,3	2,1	0,5	1,3	2,0	0,6	1,3
Allucinogeni (totale)	3,6	1,4	2,5	1,9	1,0	1,5	2,9	1,3	2,1	3,3	1,5	2,4	4,1	1,1	2,5	5,6	2,0	3,8
Stimolanti (totale)	3,6	1,6	2,6	1,6	1,2	1,4	2,7	1,3	2,0	3,2	1,8	2,5	4,5	1,6	3,0	5,9	2,2	4,0
Alcol	84,1	78,1	81,1	69,5	62,1	65,8	82,8	75,0	78,9	87,4	81,2	84,4	89,7	85,6	87,6	90,0	85,0	87,5
Energy drink	53,6	28,3	40,9	45,4	23,9	34,6	51,6	28,9	40,3	55,0	30,0	42,7	56,4	28,1	41,8	58,5	30,2	44,5
Tabacco	43,1	43,7	43,4	25,4	29,1	27,2	38,8	41,2	40,0	45,0	46,5	45,7	49,5	47,7	48,6	54,6	52,5	53,6
Tabacco (almeno una sigaretta al giorno)	26,1	24,7	25,4	10,5	12,7	11,6	20,8	19,8	20,3	27,5	25,8	26,7	30,9	28,7	29,8	38,7	34,7	36,7
Anabolizzanti	2,0	0,6	1,3	1,4	0,6	1,0	1,6	0,8	1,2	2,6	0,7	1,6	2,4	0,3	1,3	2,1	0,5	1,3
Psicofarmaci (totale)	5,8	10,7	8,2	4,2	8,1	6,2	5,1	9,8	7,4	5,4	10,6	8,0	6,3	10,6	8,5	7,5	13,8	10,6
Farmaci attenzione	2,8	2,9	2,9	2,2	2,3	2,2	2,4	2,7	2,6	2,7	3,1	2,9	2,8	2,6	2,7	3,6	3,8	3,7
Farmaci diete	1,6	3,4	2,5	0,9	2,4	1,7	1,2	3,6	2,4	1,6	3,7	2,7	2,0	3,6	2,8	2,1	3,8	2,9
Farmaci dormire	3,6	6,9	5,2	2,4	5,2	3,8	3,0	6,0	4,5	3,3	7,0	5,1	4,1	6,8	5,5	4,8	9,0	6,9
Farmaci umore	1,6	2,0	1,8	1,2	1,8	1,5	1,3	2,0	1,7	1,3	1,6	1,5	2,1	2,1	2,1	2,1	2,4	2,3
Gioco d'azzardo	55,1	35,8	45,3	46,8	31,2	38,9	52,6	33,7	43,1	53,9	35,5	44,7	59,6	37,0	47,8	61,7	40,7	51,2

Fonte: Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche

Nota: allucinogeni: LSD, funghi allucinogeni e ketamina; stimolanti: amfetamine, ecstasy e GHB; binge drinking: 5 o più "bevute" di fila
 psicofarmaci: farmaci per dormire, diete, iperattività e umore

Uso di sostanze illegali nella popolazione giovanile scolarizzata. Anno 2012

ITALIA	15-19			PREVALENZA NEGLI ULTIMI TRENTA GIORNI (%)														
				15			16			17			18			19		
				M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T
SOSTANZE																		
Cannabis	17,8	10,3	14,1	6,0	4,6	5,3	14,6	8,6	11,7	19,9	10,5	15,2	23,2	12,8	17,8	24,4	14,3	19,4
Cocaina (totale)	2,3	1,0	1,6	1,2	0,9	1,1	1,6	1,0	1,3	2,1	0,8	1,5	2,8	0,7	1,7	3,4	1,2	2,3
Eroina (totale)	1,4	0,5	1,0	1,1	0,9	1,0	1,4	0,6	1,0	1,3	0,6	1,0	1,5	0,3	0,9	1,7	0,4	1,1
Allucinogeni (totale)	2,1	0,9	1,5	1,3	0,8	1,1	1,8	0,9	1,4	2,0	0,9	1,5	2,4	0,7	1,5	2,8	0,9	1,8
Stimolanti (totale)	2,3	1,0	1,6	1,1	0,9	1,0	1,6	0,9	1,2	2,2	1,1	1,6	3,0	0,7	1,8	3,3	1,2	2,2
Alcol	70,4	59,0	64,7	49,9	39,0	44,4	67,5	54,6	61,1	74,2	62,5	68,5	80,4	69,5	74,8	78,5	67,8	73,2
Energy drink	38,6	15,9	27,2	33,0	14,8	23,9	37,3	17,4	27,4	40,4	16,6	28,7	40,1	13,8	26,5	41,5	16,9	29,3
Binge drinking	42,4	27,8	35,1	23,6	20,1	21,8	38,8	26,0	32,5	45,4	29,4	37,5	51,7	30,3	40,6	51,4	32,5	42,1
Tabacco	36,4	35,4	35,9	18,7	21,9	20,3	31,8	32,1	31,9	37,9	37,0	37,5	43,1	39,5	41,2	48,6	44,8	46,7
Anabolizzanti	1,6	0,4	1,0	1,0	0,5	0,8	1,3	0,6	1,0	2,0	0,5	1,2	1,9	0,2	1,0	1,7	0,4	1,0
Psicofarmaci (totale)	3,8	5,8	4,8	3,0	4,2	3,6	3,0	5,6	4,3	3,6	5,5	4,6	4,1	5,5	4,8	4,9	7,7	6,3
Farmaci attenzione	2,0	1,8	1,9	1,5	1,4	1,4	1,6	1,9	1,8	2,0	1,7	1,9	1,9	1,4	1,7	2,7	2,3	2,5
Farmaci diete	1,3	1,9	1,6	0,9	1,4	1,2	1,0	2,2	1,6	1,3	1,8	1,5	1,5	2,0	1,8	1,7	1,9	1,8
Farmaci dormire	2,3	3,7	3,0	1,7	2,6	2,2	1,7	3,3	2,5	2,3	3,9	3,1	2,6	3,4	3,0	3,1	4,9	4,0
Farmaci umore	1,2	1,3	1,3	0,9	1,3	1,1	0,9	1,5	1,2	1,0	1,0	1,0	1,6	1,2	1,4	1,7	1,5	1,6

Fonte: Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche

Nota: allucinogeni: LSD, funghi allucingeni e ketamina; stimolanti: amfetamine, ecstasy e GHB; binge drinking: 5 o più "bevute" di fila;

psicofarmaci: farmaci per dormire, diete, iperattività e umore