

Uso di sostanze illegali nella popolazione giovanile scolarizzata. Anno 2013

SOSTANZE	15-19			PREVALENZA NELLA VITA (%)														
				15			16			17			18			19		
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T
Cannabis	36,0	25,3	30,8	15,4	9,9	12,6	27,7	19,2	23,6	37,7	26,2	32,2	43,4	31,2	37,4	52,5	38,3	45,6
Cocaina (totale)	5,4	2,8	4,1	3,4	2,1	2,8	3,6	2,3	3,0	4,1	2,4	3,3	5,2	2,5	3,9	9,8	4,4	7,2
Eroina (totale)	1,9	1,2	1,5	2,3	1,5	1,9	2,1	1,5	1,8	1,6	0,9	1,3	1,5	1,0	1,2	1,8	1,2	1,5
Allucinogeni (totale)	5,1	2,6	3,9	3,1	1,9	2,5	3,5	1,8	2,7	4,6	3,0	3,8	4,8	2,4	3,6	8,7	3,5	6,2
Stimolanti (totale)	5,4	2,9	4,2	3,3	2,0	2,7	3,3	2,6	2,9	5,0	3,1	4,1	5,9	2,9	4,4	8,8	4,0	6,5
Alcol	90,7	87,2	89,0	81,4	75,6	78,5	87,5	85,1	86,3	93,1	89,4	91,3	94,6	92,1	93,4	95,9	92,9	94,5
Energy drink	71,8	54,0	63,1	63,1	46,8	55,0	69,7	54,4	62,3	73,0	54,0	64,0	76,2	58,1	67,2	75,9	56,4	66,5
Tabacco	60,1	61,6	60,8	40,9	43,1	42,0	53,2	56,3	54,7	62,0	63,1	62,5	67,3	68,4	67,8	74,2	75,0	74,6
Anabolizzanti	1,8	1,3	1,5	2,1	1,5	1,8	1,9	1,2	1,6	1,6	1,4	1,5	1,2	1,1	1,1	2,0	1,2	1,6
Psicofarmaci (totale)	11,9	22,3	16,9	10,8	18,6	14,7	11,3	20,5	15,7	11,7	21,8	16,5	12,1	22,7	17,4	13,3	27,0	19,9
Farmaci attenzione	4,7	5,9	5,3	4,5	5,2	4,9	4,3	6,1	5,1	4,9	5,5	5,2	4,6	5,7	5,1	5,2	7,2	6,2
Farmaci diete	2,5	7,8	5,1	2,1	7,0	4,5	2,2	6,7	4,4	2,7	7,6	5,0	2,5	8,5	5,5	2,9	8,9	5,8
Farmaci dormire	8,4	15,2	11,7	7,5	12,2	9,9	8,3	13,5	10,9	8,2	15,4	11,6	8,3	15,2	11,7	9,3	18,9	13,9
Farmaci umore	2,5	4,7	3,6	2,1	3,9	3,0	2,4	4,7	3,5	2,7	4,3	3,5	2,0	4,5	3,3	3,2	6,0	4,6
Gioco d'azzardo	60,3	41,5	51,1	50,0	34,7	42,4	55,3	39,2	47,5	60,8	39,2	50,4	65,8	43,1	54,5	67,9	50,2	59,2

Fonte: Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche

Nota: allucinogeni: LSD, funghi allucigeni e ketamina; stimolanti: amfetamine, ecstasy e GHB; binge drinking: 5 o più "bevute" di fila

Psicofarmaci: farmaci per dormire, diete, iperattività e umore

ITALIA	15-19			PREVALENZA NEGLI ULTIMI DODICI MESI (%)														
				15			16			17			18			19		
SOSTANZE	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T
Cannabis	30,0	19,2	24,7	13,1	8,2	10,7	23,2	15,7	19,6	32,7	21,2	27,2	36,1	24,2	30,2	42,3	25,8	34,3
Cocaina (totale)	3,7	1,8	2,8	2,5	1,3	1,9	2,8	1,6	2,2	3,0	1,9	2,5	3,6	1,6	2,6	6,3	2,4	4,4
Eroina (totale)	1,5	0,9	1,2	1,9	1,1	1,5	1,7	1,2	1,5	1,4	0,8	1,1	1,1	0,6	0,9	1,5	0,9	1,2
Allucinogeni (totale)	3,4	1,6	2,5	2,5	1,4	2,0	2,8	1,0	1,9	3,1	2,3	2,7	3,2	1,4	2,3	5,0	1,8	3,4
Stimolanti (totale)	3,7	1,9	2,8	2,6	1,5	2,1	2,2	1,6	1,9	3,6	2,0	2,8	4,0	1,9	3,0	5,7	2,4	4,1
Alcol	84,3	77,4	80,9	69,7	61,9	65,8	80,0	73,9	77,0	87,3	80,1	83,9	91,2	85,1	88,2	91,5	85,1	88,4
Energy drink	56,7	30,9	44,1	48,1	28,1	38,1	54,7	32,0	43,7	59,1	30,3	45,3	61,0	32,7	46,9	60,0	31,6	46,2
Tabacco	43,0	42,8	42,9	27,1	29,7	28,4	36,4	40,5	38,4	44,6	44,7	44,6	49,3	46,9	48,1	55,2	51,2	53,3
Tabacco (almeno una sigaretta al giorno)	25,5	23,8	24,6	11,5	12,1	11,8	19,0	19,8	19,4	26,3	24,7	25,5	29,7	26,7	28,2	38,4	34,1	36,3
Anabolizzanti	1,3	0,7	1,0	1,6	0,9	1,2	1,4	0,7	1,1	1,2	0,6	0,9	0,8	0,6	0,7	1,3	0,6	1,0
Psicofarmaci (totale)	6,0	11,5	8,7	5,4	9,5	7,4	5,4	10,3	7,8	5,8	11,6	8,6	6,1	11,7	8,9	7,0	14,2	10,5
Farmaci attenzione	2,8	3,2	3,0	2,9	2,9	2,9	2,3	2,9	2,6	2,6	2,9	2,8	2,5	2,9	2,7	3,3	4,1	3,7
Farmaci diete	1,6	3,8	2,6	1,4	3,5	2,5	1,5	3,4	2,4	1,6	4,0	2,7	1,6	3,7	2,7	1,7	4,0	2,8
Farmaci dormire	4,1	7,4	5,7	3,6	5,8	4,7	3,9	6,6	5,2	4,1	7,8	5,8	4,1	7,4	5,7	4,7	9,2	6,9
Farmaci umore	1,6	2,7	2,1	1,4	2,5	2,0	1,6	2,6	2,1	1,6	2,7	2,1	1,2	2,5	1,8	2,1	3,1	2,6
Gioco d'azzardo	54,5	33,1	44,0	45,0	27,2	36,2	49,6	31,2	40,6	54,3	30,8	43,0	59,1	34,7	46,9	62,9	40,7	52,1

Fonte: Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche

Nota: allucinogeni: LSD, funghi allucingeni e ketamina; stimolanti: amfetamine, ecstasy e GHB; binge drinking: 5 o più "bevute" di fila

Psicofarmaci: farmaci per dormire, diete, iperattività e umore

SOSTANZE	15-19			PREVALENZA NEGLI ULTIMI TRENTA GIORNI (%)														
				15			16			17			18			19		
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T
Cannabis	20,3	11,6	16,0	8,7	5,3	7,0	16,0	10,0	13,1	22,8	12,6	17,9	24,3	14,6	19,5	27,9	15,1	21,7
Cocaina (totale)	2,3	1,1	1,7	1,9	1,1	1,5	2,1	1,0	1,5	1,8	1,2	1,5	2,0	0,9	1,4	3,6	1,4	2,5
Eroina (totale)	1,3	0,7	1,0	1,7	0,8	1,2	1,5	0,8	1,2	1,2	0,5	0,9	0,8	0,5	0,6	1,1	0,7	0,9
Allucinogeni (totale)	1,8	0,9	1,3	2,0	1,2	1,6	1,7	0,6	1,2	1,8	0,8	1,3	1,4	0,7	1,1	2,0	1,1	1,6
Stimolanti (totale)	2,2	1,2	1,7	1,8	1,0	1,4	1,5	1,0	1,2	2,5	1,0	1,8	2,1	1,2	1,6	3,1	1,6	2,4
Alcol	70,7	58,2	64,6	48,9	39,7	44,3	63,9	52,0	58,1	74,9	60,0	67,8	81,5	69,2	75,4	81,5	68,8	75,4
Energy drink	40,6	17,4	29,3	33,9	16,2	25,1	40,3	19,2	30,0	43,6	16,6	30,7	42,1	17,5	29,9	42,5	17,5	30,4
Binge drinking	41,3	28,1	34,9	24,6	17,2	20,9	35,6	27,3	31,5	44,0	29,3	37,0	48,9	33,3	41,2	51,3	33,0	42,5
Tabacco	37,2	36,0	36,6	21,2	22,8	22,0	31,1	33,2	32,1	38,6	36,8	37,7	43,4	39,8	41,6	49,5	45,9	47,7
Anabolizzanti	1,0	0,6	0,8	1,4	0,8	1,1	1,2	0,6	0,9	0,9	0,5	0,7	0,6	0,5	0,5	1,1	0,5	0,8
Psicofarmaci (totale)	3,8	6,5	5,1	3,3	5,6	4,5	3,5	5,5	4,5	3,6	6,6	5,0	3,7	6,2	5,0	4,6	8,4	6,4
Farmaci attenzione	1,9	2,0	1,9	2,0	2,0	2,0	1,5	1,8	1,7	1,7	1,8	1,8	1,7	1,5	1,6	2,4	2,8	2,6
Farmaci diete	1,2	2,2	1,7	1,2	2,4	1,8	1,1	2,0	1,5	1,2	2,4	1,8	1,2	2,1	1,7	1,4	2,2	1,8
Farmaci dormire	2,5	3,9	3,2	2,1	3,2	2,6	2,3	3,2	2,8	2,5	4,1	3,3	2,3	3,9	3,1	3,0	5,1	4,0
Farmaci umore	1,2	1,7	1,5	1,1	1,5	1,3	1,3	1,6	1,4	1,1	1,7	1,4	1,0	1,6	1,3	1,5	2,2	1,8

Fonte: Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche

Nota: allucinogeni: LSD, funghi allucinogeni e ketamina; stimolanti: amfetamine, ecstasy e GHB; binge drinking: 5 o più "bevute" di fila

Psicofarmaci: farmaci per dormire, diete, iperattività e umore