

**Monitoraggio dei dati relativi  
al consumo di alcol e ai problemi correlati  
nella Regione Veneto  
- Anno 2003 -  
(Legge 125, 30 marzo 2001)**

***ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI  
PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA  
VOLONTARIATO E NON PROFIT***

***DIREZIONE REGIONALE PER I SERVIZI SOCIALI  
SERVIZIO PREVENZIONE DELLE DEVIANZE***

Gli autori:

Roberta Potente  
Marco Scalese  
Olivia Curzio  
Matilde Karakachoff  
Sabrina Molinaro  
Fabio Mariani

Consiglio Nazionale delle Ricerche  
Istituto di Fisiologia Clinica – Sezione di Epidemiologia e Ricerca sui Servizi  
Sanitari

## INDICE

<b>INTRODUZIONE</b>	Pag. 7
<b>IL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE NELLA POPOLAZIONE GENERALE – ANNI 1998-2003</b>	Pag. 13
<ul style="list-style-type: none"><li>• La prevalenza dei consumatori di bevande alcoliche</li><li>• Le tendenze di consumo delle diverse bevande alcoliche</li><li>• I consumatori di bevande alcoliche<ul style="list-style-type: none"><li>• I consumatori di vino</li><li>• I consumatori di birra</li><li>• I consumatori di aperitivi alcolici</li><li>• I consumatori di amari</li><li>• I consumatori di liquori</li><li>• I consumatori di bevande alcoliche fuori pasto</li></ul></li></ul>	
<b>IL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE NEGLI STUDENTI E NEI LAVORATORI DEL VENETO</b>	Pag. 31
<ul style="list-style-type: none"><li>• Il consumo di bevande alcoliche nella popolazione studentesca</li><li>• Il consumo di bevande alcoliche nei lavoratori</li></ul>	
<b>LA RETE DEI SERVIZI PER L'ALCOLOGIA</b>	Pag. 43
<ul style="list-style-type: none"><li>• I Servizi Pubblici</li><li>• La rete del volontariato</li></ul>	
<b>ANALISI DELLA DOMANDA SECONDO LE RILEVAZIONI DEL MINISTRO DELLA SALUTE</b>	Pag. 51
<ul style="list-style-type: none"><li>• Analisi a livello regionale</li><li>• Analisi a livello di Aziende ULSS ed Ospedaliere</li></ul>	
<b>I RICOVERI OSPEDALIERI PER PATOLOGIE ALCOL-CORRELATE</b>	Pag. 65
<ul style="list-style-type: none"><li>• Le dimissioni con diagnosi principale</li><li>• Le dimissioni con diagnosi principale o secondaria</li><li>• La mobilità dei ricoveri ospedalieri</li><li>• Le dimissioni ospedaliere e i soggetti per diagnosi <i>direttamente</i> correlate</li></ul>	
<b>ALLEGATI</b>	Pag. 81



## **I**NTRODUZIONE

---



## INTRODUZIONE

La legge 125 del 30 marzo 2001 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol-correlati", all'art.3, comma 1, prevede la realizzazione da parte delle Regioni di attività di monitoraggio annuale dei dati relativi al consumo di bevande alcoliche e ai problemi alcol-correlati, secondo criteri definiti dal Ministero della Salute.

Il presente rapporto, realizzato per la Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali dall'Istituto di Fisiologia Clinica – Sezione di Epidemiologia e Ricerca sui Servizi Sanitari del CNR di Pisa, si riferisce all'attività di monitoraggio dei dati riferiti all'anno 2003, condotta secondo gli indicatori epidemiologici e le fonti di dati definiti dal Ministero della Salute e riguardanti principalmente il consumo di bevande alcoliche nella popolazione generale (utilizzando le indagini Multiscopo ISTAT), l'utenza dei servizi pubblici e le ospedalizzazioni alcol-correlate. Proprio per consentire di monitorare il fenomeno del consumo delle bevande alcoliche nella regione Veneto nel corso degli anni, è stata considerata la serie storica dal 1998 al 2003.

La realizzazione del monitoraggio *regionale* evidenzia alcuni elementi di criticità:

- l'aumento, seppur lieve, nella popolazione generale del numero di consumatori di bevande alcoliche con tassi di prevalenza superiori a quelli nazionali;
- l'aumento dei consumatori adolescenti e giovani di entrambi i sessi;
- l'aumento dei comportamenti di consumo a rischio, quali il consumo fuori dei pasti e le ubriacature, in particolare nella popolazione giovanile;
- la precoce età di iniziazione al consumo di bevande alcoliche;
- l'aumento del numero di utenti in carico ai servizi di alcologia delle strutture pubbliche del Veneto;
- il decremento delle ospedalizzazioni per patologie alcol-correlate.

Nel corso dell'anno 2003, nella *Regione Veneto*, la quota dei consumatori di bevande alcoliche (calcolata utilizzando i dati ISTAT delle Indagini Multiscopo), pari al 79% della popolazione di oltre 14 anni, è stimata in circa 3.110.000 soggetti con tassi di prevalenza superiori a quelli nazionali sia tra i maschi che tra le femmine.

Il confronto con l'anno 1998 evidenzia un aumento nella popolazione maschile dei consumatori di bevande alcoliche (+1,2%), in particolar modo tra gli adolescenti (+17%). Risulta rilevante anche l'aumento registrato tra le adolescenti (+32,6%) e le giovani di 18-24 anni (19,5%).

Risultano aumentati i consumatori di aperitivi alcolici (+17,2%) per effetto soprattutto dell'aumento nel collettivo femminile (+20% circa) e in particolare tra le adolescenti (che passano dal 9,5% nel 1998 al 38% nel 2003) e tra le giovani di 18-24 anni (dal 40% del 1998 al 50% di 2003).

Si rileva un aumento anche del numero di consumatori di superalcolici (+7,4%) con tassi di prevalenza superiori a quelli nazionali sia tra i maschi che tra le femmine. L'aumento è dovuto soprattutto all'incremento registrato nella popolazione maschile e in particolare giovanile. Anche tra le adolescenti si registra un aumento delle consumatrici di superalcolici che passano dal 6% del 1998 al 18% nel 2003.

Nella popolazione veneta si assiste ad un aumento di circa il 13% della quota di chi assume bevande alcoliche fuori pasto, con particolare rilevanza tra le donne (+21,7% vs 9,3% dei maschi) ed in particolare tra le giovanissime di 14-17 anni (che passano dal 12,7% del 1998 al 33,7% del 2003).

Se si considera la popolazione di 16 anni o meno, l'aumento risulta ancora più rilevante: i 14-16enni che consumano bevande alcoliche fuori dei pasti passano dal 12,7% del 1998 al 28,5% del 2003, corrispondente ad una quota stimata di circa 38.300 giovani.

Si potrebbe ipotizzare che l'aumento dei giovani che assumono bevande alcoliche fuori pasto sia direttamente correlato al considerevole aumento dei giovani consumatori di aperitivi alcolici, in particolar modo tra le adolescenti, che nel corso dell'anno 2003 raggiungono la stessa numerosità e il medesimo tasso di prevalenza dei coetanei maschi.

La birra e gli aperitivi alcolici risultano le bevande alcoliche preferite dai giovani veneti, mentre la popolazione più adulta consuma tendenzialmente il vino. Decresce il numero dei forti bevitori, di coloro cioè che consumano oltre ½ litro di vino o di birra al giorno, in particolar modo tra le donne di oltre 45 anni.

Rispetto all'età di iniziazione al consumo di bevande alcoliche, il primo bicchiere viene bevuto a 11-12 anni. Generalmente il vino è la prima bevanda alcolica assunta e per circa il 36,5% degli studenti veneti tale comportamento è avvenuto dagli 11 ai 12 anni. Le bevande alcoliche a gradazione alcolica maggiore si sperimentano dai 15 ai 16 anni, mentre le prime ubriacature intorno ai 15 anni.

I soggetti alcolodipendenti in carico alle strutture pubbliche del Veneto nell'anno 2003 sono stati 10.531 (con un aumento di circa l'8% rispetto all'anno precedente), il 30% dei quali risulta nuova utenza. L'età media dell'utenza risulta di circa 46 anni e per i 2/3 è rappresentata da maschi.

Circa il 37% e il 32% degli utenti veneti ha seguito trattamenti rispettivamente di tipo psicoterapeutico e/o di sostegno psicologico (counselling e psicoterapia individuale e/o di gruppo) e di tipo medico-farmacologico in regime ambulatoriale o di ricovero ospedaliero. Circa il 16% dell'utenza è stato inserito in gruppi di auto-mutuo-aiuto e il 2% in comunità terapeutiche di tipo residenziale o semi-residenziale.

Nelle strutture ospedaliere del Veneto, nell'anno 2003, i ricoveri con diagnosi principali e secondarie selezionate come *direttamente* alcol-correlati sono stati 14.447 e si riferiscono a 9.454 pazienti.

Il 67,5% dei pazienti ricoverati è di sesso maschile con un'età media pari a 57,4 anni, di circa cinque anni inferiore a quelle delle pazienti ricoverate per le medesime patologie (62,5 anni).

Il raggruppamento diagnostico più presente è quello relativo a "Steatosi, epatite e cirrosi alcolica" con il 64% del totale dei soggetti ricoverati, seguito dal 25,3% dei ricoverati per "Sindrome di dipendenza da alcol".

Il 78,6% dei pazienti di 55 anni ed oltre è ricoverato per "Steatosi, epatite e cirrosi alcolica", mentre per il 56,5% dei giovani di 15-34 anni si è trattato di un ricovero per "Sindrome di dipendenza da alcol".

Nel presente rapporto, ai fini dell'attività di monitoraggio dei dati relativi al consumo di bevande alcoliche nella popolazione generale e alla dipendenza alcolica rispetto l'anno 2003, sono stati considerati gli indicatori epidemiologici e le fonti di dati definiti dal Ministero della Salute.

Nello specifico sono stati considerati:

- Il consumo di bevande alcoliche nella popolazione generale dal 1998 al 2003
- I consumatori di bevande alcoliche nella popolazione generale (elaborazioni su dati ISTAT)
- Il consumo di bevande alcoliche negli studenti e nei lavoratori (elaborazioni su dati ESPAD ed IPSAD)
- La rete dei servizi deputati alla gestione degli interventi (elaborazioni su dati forniti dalla Regione Veneto – Rilevazioni Ministero della Salute)
- Gli utenti alcolodipendenti in carico alle strutture pubbliche (elaborazioni su dati forniti dalla Regione Veneto - Rilevazioni Ministero della Salute)
- La prevalenza delle patologie alcol-correlate nei ricoveri ospedalieri (elaborazioni su dati forniti dalla Regione Veneto).



**CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE NELLA  
POPOLAZIONE GENERALE**

---



## **IL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE NELLA POPOLAZIONE GENERALE - ANNI 1998-2003**

Secondo le indicazioni fornite dal Ministero della Salute, per definire il numero dei consumatori di bevande alcoliche a livello regionale sono stati utilizzati i dati delle indagini multiscopo "Aspetti della vita quotidiana - Stili di vita e condizioni di salute", condotte annualmente dall'ISTAT sulla popolazione generale.

Seguendo il report realizzato dall'Osservatorio Nazionale Alcol dell'OssFAD<sup>1</sup>, si è tentato di analizzare l'andamento del consumo di bevande alcoliche a livello regionale dal 1998 al 2003 e valutare, quindi, eventuali variazioni avvenute durante il quinquennio considerato.

Ai fini di poter realizzare una comparazione a livello nazionale, le analisi sono state effettuate considerando le classi di età che riguardano gli adolescenti (14-17 anni), i giovani (18-24 anni), i giovani adulti (25-44 anni), gli adulti (45-64 anni), i giovani anziani (65-74 anni) e gli anziani (75 anni ed oltre).

Inoltre, proprio per analizzare l'impatto del consumo di alcolici tra gli adolescenti al di sotto dell'età legale (16 anni), sono state effettuate analisi descrittive a livello di singole età di 14, 15 e 16 anni. Sono state inoltre elaborate stime di numerosità sulla base della proiezione delle frequenze alla popolazione nazionale e regionale di pari età, pesandole attraverso le frequenze utilizzate dall'ISTAT in fase di campionamento.

Per le elaborazioni delle prevalenze dei non consumatori e dei consumatori di bevande alcoliche (dato non elaborato dall'ISTAT), così come indicato dall'OssFAD, sono stati considerati "non consumatori" tutti i soggetti che all'indagine ISTAT hanno dichiarato di non consumare alcuna delle bevande alcoliche considerate, mentre sono stati considerati "consumatori" coloro che hanno dichiarato di consumarne almeno una o che non hanno fornito alcuna risposta.

### **LA PREVALENZA DEI CONSUMATORI DI BEVANDE ALCOLICHE**

Le analisi effettuate evidenziano che in Italia il numero di consumatori di bevande alcoliche rimane costante nel corso degli anni considerati, circa 74% della popolazione generale di 14 anni e più, con quote che raggiungono, nel corso dell'anno 2003, l'87,1% nel collettivo maschile e il 61% in quello femminile.

La distribuzione dei consumatori maschi di bevande alcoliche sulla base delle classi di età, con l'eccezione degli adolescenti, evidenzia una certa omogeneità dei tassi di prevalenza in tutte le classi, compresi tra l'84,1% e il 91,2%, rilevati rispettivamente tra gli ultra 75enni e i 45-64enni.

Il medesimo andamento, ma con tassi di prevalenza inferiori, si evidenzia anche tra le donne: il range di valori delle prevalenze è compreso tra il 49,4% delle ultra 75enni e il 65,7% delle 25-44enni (Tabella 1).

---

<sup>1</sup>E. Scafato, S. Ghirini, R. Russo. I consumi alcolici in Italia. Report 2004 sui consumi e le tendenze (1998-2001).

## Il consumo di bevande alcoliche nella popolazione generale

Tabella 1 – Frequenze e variazione percentuali per sesso, classi di età - 1998-2003

ITALIA		Anno						Δ % 1998/ 2003	
		1998	1999	2000	2001	2002	2003		
Maschi	14-17 adolescenti	STIMA	684.404	661.117	717.259	686.500	673.595	680.486	0,6
		%	50,8	55,9	56,8	54,8	53,1	51,1	
	18-24 giovani	STIMA	2.165.380	2.184.943	2.045.260	2.015.851	1.943.179	1.896.998	1,0
		%	84,1	83,8	84,9	87,2	84,6	84,9	
	25-44 giovani adulti	STIMA	7.934.929	8.030.876	8.118.178	8.144.643	8.019.035	8.113.130	0,1
		%	90,2	90,5	90,9	90,7	89,3	90,3	
	45-64 adulti	STIMA	6.280.994	6.326.353	6.430.773	6.469.427	6.459.604	6.490.794	1,3
	%	90,0	90,3	91,0	90,9	90,8	91,2		
65-74 giovani anziani	STIMA	2.254.160	2.268.294	2.277.613	2.418.162	2.336.860	2.309.444	1,2	
	%	86,2	86,3	86,2	88,4	87,6	87,2		
75+ anziani	STIMA	1.150.333	1.169.680	1.239.561	1.292.346	1.322.653	1.402.376	7,0	
	%	78,6	77,2	78,2	81,6	80,2	84,1		
<b>TOTALE MASCHI</b>	STIMA	<b>20.470.200</b>	<b>20.641.263</b>	<b>20.828.644</b>	<b>21.026.929</b>	<b>20.754.926</b>	<b>20.893.228</b>	<b>1,2</b>	
	%	<b>86,1</b>	<b>86,7</b>	<b>87,2</b>	<b>87,7</b>	<b>86,6</b>	<b>87,1</b>		
Femmine	14-17 adolescenti	STIMA	458.432	510.950	529.470	519.178	418.198	471.583	5,2
		%	38,4	41,9	43,1	44,3	36,7	40,4	
	18-24 giovani	STIMA	1.561.714	1.570.167	1.482.810	1.412.312	1.369.908	1.398.698	2,5
		%	60,2	64,5	64,1	62,5	59,7	61,7	
	25-44 giovani adulti	STIMA	5.832.993	5.949.091	6.093.348	5.999.034	5.699.917	5.807.908	-2,2
		%	67,2	68,0	69,3	67,9	64,5	65,7	
	45-64 adulti	STIMA	4.730.207	4.916.575	4.949.709	4.993.336	4.797.997	4.748.139	-0,9
	%	65,1	67,5	67,6	67,9	65,2	64,5		
65-74 giovani anziani	STIMA	1.894.456	1.897.712	1.950.309	1.884.523	1.847.112	1.868.932	2,9	
	%	56,0	58,4	58,5	55,9	56,6	57,6		
75+ anziani	STIMA	1.238.805	1.295.510	1.317.594	1.428.975	1.338.523	1.412.775	-1,2	
	%	50,0	48,6	49,3	52,4	47,1	49,4		
<b>TOTALE FEMMINE</b>	STIMA	<b>15.716.607</b>	<b>16.140.005</b>	<b>16.323.240</b>	<b>16.237.358</b>	<b>15.471.655</b>	<b>15.708.035</b>	<b>-0,7</b>	
	%	<b>61,4</b>	<b>63,0</b>	<b>63,6</b>	<b>63,1</b>	<b>60,1</b>	<b>61,0</b>		
<b>TOTALE</b>	STIMA	<b>36.186.807</b>	<b>36.781.268</b>	<b>37.151.884</b>	<b>37.264.287</b>	<b>36.226.581</b>	<b>36.601.263</b>	<b>0,4</b>	
	%	<b>73,3</b>	<b>74,4</b>	<b>75,0</b>	<b>75,0</b>	<b>72,9</b>	<b>73,6</b>		

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

In Veneto, nel periodo 1998-2003 il tasso di prevalenza dei consumatori di bevande alcoliche è rimasto sostanzialmente invariato nel corso degli anni (+0,6%), per raggiungere il 79,1% nel 2003.

Analogamente a quanto rilevato a livello nazionale, i consumatori di oltre 18 anni, sia maschi che femmine, evidenziano, in tutte le classi di età e in tutti gli anni analizzati, tassi di prevalenza omogenei nelle diverse classi di età e superiori a quelli nazionali.

In Veneto, l'incremento maggiore si registra nella classe degli adolescenti: +17% nei maschi e +32,6% nelle femmine (Tabella 2).

## Il consumo di bevande alcoliche nella popolazione generale

**Tabella 2 – Frequenze e variazione percentuali per sesso, classi di età – Anni 1998-2003**

VENETO			Anno						Δ % 1998/ 2003
			1998	1999	2000	2001	2002	2003	
Maschi	14-17 adolescenti	STIMA	45.331	37.122	59.417	47.152	58.823	54.317	17,0
		%	52,9	50,2	61,2	51,7	64,9	61,9	
	18-24 giovani	STIMA	174.712	169.532	146.560	146.722	148.472	152.774	3,6
		%	88,4	85,5	88,7	89,8	90,6	91,6	
	25-44 giovani adulti	STIMA	679.838	664.235	678.377	692.830	672.545	705.336	0,4
		%	92,8	89,6	90,4	91,5	88,9	93,2	
	45-64 adulti	STIMA	519.072	517.787	522.136	533.207	527.877	537.922	0,7
%		92,1	91,1	90,9	91,7	90,9	92,7		
65-74 giovani anziani	STIMA	167.314	156.515	179.847	173.446	177.970	192.250	-2,5	
	%	90,5	89,5	94,0	90,7	89,0	88,2		
75+ anziani	STIMA	98.263	121.169	98.219	107.394	105.490	91.611	5,0	
	%	84,4	91,8	80,0	82,5	86,9	88,6		
<b>TOTALE MASCHI</b>		STIMA	<b>1.684.530</b>	<b>1.666.360</b>	<b>1.684.556</b>	<b>1.700.751</b>	<b>1.691.177</b>	<b>1.734.210</b>	<b>1,2</b>
		%	<b>89,5</b>	<b>88,2</b>	<b>88,6</b>	<b>88,9</b>	<b>88,4</b>	<b>90,6</b>	
Femmine	14-17 adolescenti	STIMA	25.436	41.991	40.768	38.249	28.077	45.411	32,6
		%	35,6	51,6	46,0	54,1	33,6	47,2	
	18-24 giovani	STIMA	130.508	129.206	103.732	119.274	114.710	115.200	19,5
		%	64,5	71,3	63,0	68,3	70,8	77,1	
	25-44 giovani adulti	STIMA	495.945	496.236	535.217	491.976	485.749	504.079	-1,0
		%	71,0	70,3	75,1	68,6	67,7	70,3	
	45-64 adulti	STIMA	417.522	405.976	415.237	423.795	424.393	404.580	-4,8
%		72,9	70,5	71,7	72,8	72,8	69,4		
65-74 giovani anziani	STIMA	157.851	166.899	161.831	157.568	164.405	180.527	-2,4	
	%	67,8	65,7	65,3	66,2	61,8	66,2		
75+ anziani	STIMA	139.261	124.628	136.359	162.444	133.368	126.108	0,5	
	%	62,6	61,0	62,6	69,1	64,4	62,9		
<b>TOTALE FEMMINE</b>		STIMA	<b>1.366.523</b>	<b>1.364.936</b>	<b>1.393.144</b>	<b>1.393.306</b>	<b>1.350.702</b>	<b>1.375.905</b>	<b>-0,3</b>
		%	<b>68,3</b>	<b>68,2</b>	<b>69,3</b>	<b>69,0</b>	<b>66,9</b>	<b>68,1</b>	
<b>TOTALE</b>		STIMA	<b>3.051.053</b>	<b>3.031.296</b>	<b>3.077.700</b>	<b>3.094.057</b>	<b>3.041.879</b>	<b>3.110.115</b>	<b>0,6</b>
		%	<b>78,6</b>	<b>77,9</b>	<b>78,7</b>	<b>78,7</b>	<b>77,4</b>	<b>79,1</b>	

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

Nel considerare la popolazione di adolescenti al di sotto dell'età legale per la somministrazione di bevande alcoliche, a livello nazionale si registra un leggero decremento (-0,7%), di pari rilevanza nei maschi e nelle femmine. Analizzando le singole età, la maggior variabilità percentuale si registra tra i 14enni, che decrescono nei maschi del 20,7% e nelle femmine di circa il 15%. Aumentano i bevitori di 15 e 16 anni, sia maschi che femmine (Tabella 3).

## Il consumo di bevande alcoliche nella popolazione generale

**Tabella 3 – Frequenze e variazione percentuali per sesso dei consumatori al di sotto dell'età legale – Anni 1998-2003**

ITALIA			Anno						Δ % 1998/ 2003
			1998	1999	2000	2001	2002	2003	
Maschi	14 anni	STIMA	111.869	123.094	135.133	141.787	136.713	79.304	-20,7
		%	34,3	39,3	46,1	43,3	43,5	27,2	
	15 anni	STIMA	138.758	139.431	170.918	154.545	136.361	165.664	5,7
		%	42,3	51,8	50,7	52,1	42,6	44,7	
	16 anni	STIMA	211.020	176.320	193.102	201.470	178.326	217.516	2,5
		%	61,0	58,8	61,2	59,1	56,7	62,5	
	<b>TOTALE MASCHI</b>	STIMA	<b>461.647</b>	<b>438.845</b>	<b>499.153</b>	<b>497.802</b>	<b>451.400</b>	<b>462484</b>	<b>-0,9</b>
		%	<b>46,2</b>	<b>49,7</b>	<b>52,8</b>	<b>51,6</b>	<b>47,6</b>	<b>45,8</b>	
Femmine	14 anni	STIMA	84.985	82.304	94.443	97.881	77.540	84.831	-14,8
		%	31,8	28,7	31,4	34,7	28,0	27,1	
	15 anni	STIMA	100.031	122.063	120.936	130.235	61.530	101.737	6,3
		%	33,3	37,9	42,8	40,7	22,2	35,4	
	16 anni	STIMA	130.648	133.056	146.353	140.348	133.000	126.084	8,7
		%	41,3	45,0	42,3	49,6	42,0	44,9	
	<b>TOTALE FEMMINE</b>	STIMA	<b>315.664</b>	<b>337.423</b>	<b>361.732</b>	<b>368.464</b>	<b>272.070</b>	<b>312652</b>	<b>-0,8</b>
		%	<b>35,7</b>	<b>37,3</b>	<b>38,9</b>	<b>41,6</b>	<b>31,2</b>	<b>35,4</b>	
<b>TOTALE</b>		STIMA	<b>777.311</b>	<b>776.268</b>	<b>860.885</b>	<b>866.266</b>	<b>723.470</b>	<b>775.136</b>	<b>-0,7</b>
		%	<b>41,3</b>	<b>43,5</b>	<b>45,9</b>	<b>46,8</b>	<b>39,8</b>	<b>41,0</b>	

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

In Veneto, la prevalenza dei bevitori al di sotto dell'età legale, dal 1998 al 2003, è aumentata del 10% sia nei maschi che nelle femmine evidenziando valori superiori a quelli nazionali in entrambi i generi, in tutte le età e in tutti gli anni considerati.

Tra gli adolescenti maschi si registra un incremento di circa il 90% tra i 15enni e del 37% tra i 16enni, mentre nelle adolescenti gli incrementi percentuali si evidenziano tra le 14enni (+53,2%) e le 15enni (+circa il 70%).

Le prevalenze calcolate consentono di stimare che, in Veneto nel corso dell'anno 2003 i consumatori di bevande alcoliche al di sotto dell'età legale sono stati 62.339 soggetti (Italia=775.135 soggetti), con un aumento di circa 13.000 adolescenti dal 1998 al 2003 (in media 2.000 soggetti all'anno) (Tabella 4).

**Tabella 4 – Frequenze e variazione percentuali per sesso dei consumatori al di sotto dell'età legale – Anni 1998-2003**

VENETO			Anno						Δ % 1998/ 2003
			1998	1998	1998	1998	1998	1998	
Maschi	14 anni	STIMA	6.982	4.211	10.820	7.575	10.024	6.518	-34,3
		%	54,5	25,7	51,0	33,5	50,9	35,8	
	15 anni	STIMA	5.540	8.706	15.229	12.725	3.839	14.150	89,7
		%	23,3	43,6	51,7	46,9	29,9	44,2	
16 anni	STIMA	16.977	10.614	17.241	11.532	19.988	13.269	37,0	
	%	66,4	52,1	65,0	49,1	67,1	91,0		
TOTALE MASCHI	STIMA	<b>29.499</b>	<b>23.531</b>	<b>43.290</b>	<b>31.832</b>	<b>33.851</b>	<b>33.937</b>	<b>10,3</b>	
	%	<b>47,5</b>	<b>41,5</b>	<b>56,1</b>	<b>43,5</b>	<b>54,3</b>	<b>52,4</b>		
Femmine	14 anni	STIMA	2.308	6.003	5.929	2.248	4.684	4.460	53,2
		%	14,1	24,2	27,6	14,7	21,5	21,6	
	15 anni	STIMA	7.150	11.102	9.870	11.831	3.174	15.580	69,9
		%	35,9	53,5	48,9	63,3	15,0	61,0	
16 anni	STIMA	10.595	13.753	9.546	12.524	17.264	8.362	-39,0	
	%	56,6	73,3	39,6	63,8	49,5	34,5		
TOTALE FEMMINE	STIMA	<b>20.053</b>	<b>30.858</b>	<b>25.345</b>	<b>26.603</b>	<b>25.122</b>	<b>28.402</b>	<b>10,4</b>	
	%	<b>36,5</b>	<b>48,0</b>	<b>38,5</b>	<b>49,6</b>	<b>32,3</b>	<b>40,3</b>		
TOTALE	STIMA	<b>49.552</b>	<b>54.389</b>	<b>68.635</b>	<b>58.435</b>	<b>58.973</b>	<b>62.339</b>	<b>9,0</b>	
	%	<b>42,3</b>	<b>45,0</b>	<b>48,0</b>	<b>46,1</b>	<b>42,1</b>	<b>46,1</b>		

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

### **LE TENDENZE DI CONSUMO DELLE DIVERSE BEVANDE ALCOLICHE**

Sulla base del calcolo delle prevalenze è possibile stimare la frequenza assoluta e relativa dei consumatori di bevande alcoliche e calcolarne le variazioni negli anni considerati.

Le analisi effettuate a livello nazionale, rilevano che nel collettivo maschile i maggiori incrementi si registrano nelle prevalenze dei consumatori di aperitivi alcolici, amari e superalcolici.

Tra le donne, invece, gli incrementi maggiori si registrano tra le consumatrici di aperitivi alcolici (+22,7%) e di superalcolici (+8,9%), ma anche di alcolici fuori dei pasti (+14,4%).

Tra i "forti bevitori" di vino e di birra, coloro cioè che ne consumano oltre ½ litro al giorno, si registrano notevoli decrementi percentuali (-18,2% per entrambe le bevande alcoliche) sia tra i maschi che tra le femmine.

Complessivamente nell'anno 2003, il numero dei forti bevitori di vino è stato stimato in poco più di 2.230.000 soggetti, con un decremento dal 1998 di circa 466.000 soggetti (Tabella 5).

In Veneto si rileva che dal 1998 al 2003 è aumentato il numero dei consumatori maschi di superalcolici (+8,1%), birra (+4,4%), amari (+1,8%) e in particolar modo di aperitivi alcolici (+16%).

Tra le donne, invece, gli incrementi percentuali si registrano tra le consumatrici di aperitivi alcolici (circa +20%), di superalcolici (+4,7%) e di birra (+2,2%).

Si registra, altresì, un decremento pari al 16,5% delle consumatrici di amari.

Seguendo l'andamento nazionale, anche in Veneto il numero dei forti bevitori di vino e birra decresce, sia tra i maschi che tra le femmine.

I consumatori di oltre ½ litro di vino al giorno sono diminuiti del 18,5% dal 1998 al 2003 con un decremento di circa 45.000 soggetti.

Di contro, in entrambi i generi si registra un aumento dei consumatori di alcolici fuori dei pasti (+12,6%) in particolar modo tra le donne (M=+9,3% vs F=+21,7%).

La frequenza stimata dei consumatori di bevande alcoliche fuori dei pasti nel 2003 risulta di 1.511.000 soggetti, con un aumento di circa 189.000 soggetti. Si potrebbe ipotizzare che tale incremento sia direttamente correlato all'aumento dei consumatori di aperitivi alcolici (+235.000 soggetti dal 1998 al 2003) (Tabella 6).

Per quanto riguarda i consumatori di bevande alcoliche al di sotto dell'età legale, a livello nazionale si verifica un incremento del 46,1% e del 50% degli adolescenti che bevono aperitivi alcolici e fuori dei pasti per effetto soprattutto dell'incremento registrato tra le ragazze.

Aumentano anche i consumatori delle bevande a più alta gradazione alcolica: per i superalcolici l'aumento è pari a circa il 29% e per gli amari del 4,3%.

In Veneto, tra gli adolescenti al di sotto dei 16 anni si assiste ad un notevole incremento percentuale dei consumatori di tutte le bevande alcoliche, ad eccezione dei bevitori di amari. Gli incrementi maggiori si rilevano nei consumatori di aperitivi alcolici (+62,6%) e di superalcolici (+122,8%), per effetto soprattutto dell'incremento registrato tra le adolescenti.

A differenza di quanto rilevato a livello nazionale, in Veneto si registra un aumento anche dei giovani consumatori di vino e di birra, in questo caso, per effetto dei maschi (Tabella 8).

Le elaborazioni effettuate a livello di genere e di singole classi di età, sia nella popolazione generale sia in quella al di sotto dell'età legale, sono riportate in allegato.

**Tabella 5 – Stima della frequenza assoluta e relativa e dei consumatori di bevande alcoliche in ITALIA e variazione (%) osservata nelle prevalenze nel periodo 1998-2003**

<b>ITALIA - 1998</b>		<b>VINO</b>	<b>VINO OLTRE ½ LT AL GIORNO</b>	<b>BIRRA</b>	<b>BIRRA OLTRE ½ LT AL GIORNO</b>	<b>APERITIVI ALCOLICI</b>	<b>AMARI</b>	<b>SUPER ALCOLICI</b>	<b>ALCOLICI FUORI PASTO</b>
<b>Maschi</b>	STIMA	16.729.317	2.317.153	14.820.380	479.759	8.904.608	10.158.466	8.670.300	9.345.845
	%	70,3	9,7	62,3	2,0	37,4	42,7	36,5	39,3
<b>Femmine</b>	STIMA	11.348.653	378.689	8.458.898	72.518	3.930.929	4.205.591	3.161.925	3.196.587
	%	44,4	1,5	33,1	0,3	15,4	16,4	12,4	12,5
<b>Totale</b>	STIMA	28.077.970	2.695.842	23.279.278	552.277	12.835.537	14.364.057	11.832.225	12.542.432
	%	56,9	5,5	47,2	1,1	26,0	29,1	24,0	25,1
<b>ITALIA - 2003</b>		<b>VINO</b>	<b>VINO OLTRE ½ LT AL GIORNO</b>	<b>BIRRA</b>	<b>BIRRA OLTRE ½ LT AL GIORNO</b>	<b>APERITIVI ALCOLICI</b>	<b>AMARI</b>	<b>SUPER ALCOLICI</b>	<b>ALCOLICI FUORI PASTO</b>
<b>Maschi</b>	STIMA	17.078.928	1.942.421	15.736.449	404.158	10.496.558	10.696.116	9.337.616	9.115.945
	%	71,2	8,1	65,6	1,7	43,8	44,6	38,9	38,0
<b>Femmine</b>	STIMA	10.706.470	287.637	8.537.006	56.480	4.856.439	4.046.953	3.481.591	3.686.104
	%	41,6	1,1	33,2	0,2	18,9	15,7	13,5	14,3
<b>Totale</b>	STIMA	27.785.398	2.230.058	24.273.455	460.638	15.352.997	14.743.069	12.819.207	12.802.049
	%	55,9	4,5	48,8	0,9	30,9	29,7	25,8	25,8
<b>Δ% 1998/2003</b>		<b>VINO</b>	<b>VINO OLTRE ½ LT AL GIORNO</b>	<b>BIRRA</b>	<b>BIRRA OLTRE ½ LT AL GIORNO</b>	<b>APERITIVI ALCOLICI</b>	<b>AMARI</b>	<b>SUPER ALCOLICI</b>	<b>ALCOLICI FUORI PASTO</b>
<b>Maschi</b>	Δ %	1,3	-16,5	5,3	-15,0	17,1	4,4	6,6	-3,3
<b>Femmine</b>	Δ %	-6,3	-26,7	0,3	-33,3	22,7	-4,3	8,9	14,4
<b>Totale</b>	Δ %	-1,8	-18,2	3,4	-18,2	18,8	2,1	7,5	2,8

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

**Tabella 6 – Stima della frequenza assoluta e relativa e dei consumatori di bevande alcoliche in VENETO e variazione (%) osservata nelle prevalenze nel periodo 1998-2003**

VENETO - 1998		VINO	VINO OLTRE ½ LT AL GIORNO	BIRRA	BIRRA OLTRE ½ LT AL GIORNO	APERITIVI ALCOLICI	AMARI	SUPER ALCOLICI	ALCOLICI FUORI PASTO
<b>Maschi</b>	STIMA	1.413.412	216.441	1.228.311	29.412	822.032	822.559	817.008	953.816
	%	75,1	11,5	65,3	1,6	43,7	43,7	43,4	50,7
<b>Femmine</b>	STIMA	1.052.362	37.402	730.412	5.414	414.205	423.222	343.345	368.790
	%	52,6	1,9	36,5	0,3	20,7	21,2	17,2	18,4
<b>Totale</b>	STIMA	2.465.774	253.843	1.958.723	34.826	1.236.237	1.245.781	1.160.353	1.322.606
	%	63,5	6,5	50,5	0,9	31,9	32,1	29,9	34,1
VENETO - 2003		VINO	VINO OLTRE ½ LT AL GIORNO	BIRRA	BIRRA OLTRE ½ LT AL GIORNO	APERITIVI ALCOLICI	AMARI	SUPER ALCOLICI	ALCOLICI FUORI PASTO
<b>Maschi</b>	STIMA	1.474.040	196.072	1.304.188	28.660	970.935	852.209	897.707	1.059.687
	%	77,0	10,2	68,2	1,5	50,7	44,5	46,9	55,4
<b>Femmine</b>	STIMA	1.029.620	12.896	752.495	1.282	500.507	357.739	364.002	451.402
	%	51,0	0,6	37,3	0,1	24,8	17,7	18,0	22,4
<b>Totale</b>	STIMA	2.503.660	208.968	2.056.683	29.942	1.471.442	1.209.948	1.261.709	1.511.089
	%	63,7	5,3	52,3	0,8	37,4	30,8	32,1	38,4
Δ% 1998/2003		VINO	VINO OLTRE ½ LT AL GIORNO	BIRRA	BIRRA OLTRE ½ LT AL GIORNO	APERITIVI ALCOLICI	AMARI	SUPER ALCOLICI	ALCOLICI FUORI PASTO
<b>Maschi</b>	Δ %	2,5	-11,3	4,4	-6,3	16,0	1,8	8,1	9,3
<b>Femmine</b>	Δ %	-3,0	-68,4	2,2	-66,7	19,8	-16,5	4,7	21,7
<b>Totale</b>	Δ %	0,3	-18,5	3,6	-11,1	17,2	-4,0	7,4	12,6

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

**Tabella 7 – Stima della frequenza assoluta e relativa e dei consumatori AL DI SOTTO DELL'ETA' LEGALE di bevande alcoliche in ITALIA e variazione (%) osservata nelle prevalenze nel periodo 1998-2003**

<b>ITALIA - 1998</b>		<b>VINO</b>	<b>VINO OLTRE ½ LT AL GIORNO</b>	<b>BIRRA</b>	<b>BIRRA OLTRE ½ LT AL GIORNO</b>	<b>APERITIVI ALCOLICI</b>	<b>AMARI</b>	<b>SUPER ALCOLICI</b>	<b>ALCOLICI FUORI PASTO</b>
<b>Maschi</b>	STIMA	194.059	2.308	345.204	7.874	146.717	92.758	93.659	127.276
	%	19,4	0,2	34,5	0,8	14,7	9,3	9,4	12,7
<b>Femmine</b>	STIMA	101.707	840	215.115	1.698	94.496	38.430	52.656	76.718
	%	11,5	0,1	24,3	0,2	10,7	4,3	6,0	8,7
<b>Totale</b>	STIMA	295.766	3.148	560.319	9.572	241.213	131.188	146.315	203.995
	%	15,7	0,2	29,7	0,5	12,8	7,0	7,8	10,8
<b>ITALIA - 2003</b>		<b>VINO</b>	<b>VINO OLTRE ½ LT AL GIORNO</b>	<b>BIRRA</b>	<b>BIRRA OLTRE ½ LT AL GIORNO</b>	<b>APERITIVI ALCOLICI</b>	<b>AMARI</b>	<b>SUPER ALCOLICI</b>	<b>ALCOLICI FUORI PASTO</b>
<b>Maschi</b>	STIMA	188.172	365	324.401	3.380	212.771	97.792	121.673	183.249
	%	18,6	0,04	32,1	0,3	21,1	9,7	12,1	18,1
<b>Femmine</b>	STIMA	92.518	---	177.528	---	141.047	49.932	62.198	122.326
	%	10,5	---	20,1	---	16,0	5,7	7,1	13,9
<b>Totale</b>	STIMA	280.690	365	501.929	3.380	353.818	147.724	183.871	305.575
	%	14,8	0,02	26,5	0,2	18,7	7,8	9,7	16,2
<b>Δ% 1998/2003</b>		<b>VINO</b>	<b>VINO OLTRE ½ LT AL GIORNO</b>	<b>BIRRA</b>	<b>BIRRA OLTRE ½ LT AL GIORNO</b>	<b>APERITIVI ALCOLICI</b>	<b>AMARI</b>	<b>SUPER ALCOLICI</b>	<b>ALCOLICI FUORI PASTO</b>
<b>Maschi</b>	Δ %	-4,1	-80,0	-7,0	-62,5	43,5	4,3	28,7	42,5
<b>Femmine</b>	Δ %	-8,7	-100,0	-17,3	-100,0	49,5	32,6	18,3	59,8
<b>Totale</b>	Δ %	-5,7	-90,0	-10,8	-60,0	+46,1	+11,4	+24,4	+50,0

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

**Tabella 8 – Stima della frequenza assoluta e relativa e dei consumatori AL DI SOTTO DELL'ETA' LEGALE di bevande alcoliche in VENETO e variazione (%) osservata nelle prevalenze nel periodo 1998-2003**

VENETO - 1998		VINO	VINO OLTRE ½ LT AL GIORNO	BIRRA	BIRRA OLTRE ½ LT AL GIORNO	APERITIVI ALCOLICI	AMARI	SUPER ALCOLICI	ALCOLICI FUORI PASTO
<b>Maschi</b>	STIMA	11.620	1.046	16.333	1.324	15.328	7.017	7.696	9.650
	%	18,7	1,7	26,3	2,1	24,7	11,3	12,4	15,5
<b>Femmine</b>	STIMA	6.937	---	11.921	---	6.563	5.560	4.104	5.228
	%	12,6	---	21,7	---	11,9	10,1	7,5	9,5
<b>Totale</b>	STIMA	18.557	1.046	28.254	1.324	21.891	12.577	11.800	14.878
	%	15,8	0,9	24,1	1,1	18,7	10,7	10,1	12,7
VENETO - 2003		VINO	VINO OLTRE ½ LT AL GIORNO	BIRRA	BIRRA OLTRE ½ LT AL GIORNO	APERITIVI ALCOLICI	AMARI	SUPER ALCOLICI	ALCOLICI FUORI PASTO
<b>Maschi</b>	STIMA	20.218	---	25.224	---	20.449	8.228	14.585	17.610
	%	31,2	---	38,9	---	31,6	12,7	22,5	27,2
<b>Femmine</b>	STIMA	6.981	---	19.248	---	20.649	1.405	7.060	20.648
	%	9,9	---	27,3	---	29,3	2,0	10,0	29,3
<b>Totale</b>	STIMA	27.199	---	44.472	---	41.098	9.633	21.645	38.258
	%	20,1	---	32,9	---	30,4	7,1	16,0	28,3
Δ% 1998/2003		VINO	VINO OLTRE ½ LT AL GIORNO	BIRRA	BIRRA OLTRE ½ LT AL GIORNO	APERITIVI ALCOLICI	AMARI	SUPER ALCOLICI	ALCOLICI FUORI PASTO
<b>Maschi</b>	Δ %	66,8	-100,0	47,9	-100,0	27,9	12,4	81,5	75,5
<b>Femmine</b>	Δ %	-21,4	---	25,8	---	146,2	-80,2	33,3	208,4
<b>Totale</b>	Δ %	27,2	-100,0	36,5	-100,0	62,6	-33,6	58,4	122,8

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

### **ANALISI DESCRITTIVA DEI CONSUMATORI DI BEVANDE ALCOLICHE**

Così come richiesto dal Ministero della Salute, per l'analisi dei consumatori di bevande alcoliche nella popolazione generale, come già analizzato per gli anni 2000 e 2001<sup>2</sup>, sono state condotte analisi descrittive "ad hoc" sui dati relativi all'Indagine Multiscopo sulle Famiglie - Aspetti della vita quotidiana - anno 2002. Rispetto l'anno 2003, non è stato possibile effettuare le medesime analisi in quanto i dati relativi all'Indagine Multiscopo sulle Famiglie (al 30/10/2005) non sono stati ancora pubblicati.

Nella Regione Veneto, l'indagine campionaria ha coinvolto un totale di 3.279 soggetti che, moltiplicati per il coefficiente di riporto all'universo, equivalgono a 4.506.136 soggetti (in Italia i soggetti intervistati sono stati 55.294, equivalenti a 20.927 famiglie, che opportunamente pesati, equivalgono a 57.450.997 soggetti).

Nella parte che segue si riportano sinteticamente i principali dati emersi, mentre in Allegato si riportano le tabelle di dati secondo il genere, le classi di età, la condizione lavorativa e il titolo di studio.

#### ***I consumatori di VINO***

In Italia il consumo di vino almeno una volta l'anno ha coinvolto nell'anno 2002 il 57,4% delle persone di 14 anni e più, facendone registrare una lieve diminuzione rispetto al 2001 (59,6%).

Nel Veneto la quota di soggetti di 14 anni e più che ha consumato vino almeno una volta l'anno, similmente a quanto rilevato nel corso del 2001, ha raggiunto il 63,9%. In particolare:

- il maggior numero di bevitori si riscontra tra gli uomini (76,6% vs 53,8%), ed in particolar modo tra gli over 45 (oltre l'80%);
- rispetto i più giovani, oltre il 51% dei 18-24enni, per la maggior parte maschi (76,2% vs 31,9%) consuma vino, in particolar modo occasionalmente/raramente;
- il consumo di oltre 1/2 litro di vino al giorno, indicatore di un consumo eccessivo, coinvolge il 5,4% dei veneti, in particolar modo gli uomini (9,6% vs 1,6%) e i soggetti di 55-64 anni (12%);
- il consumo abituale (1 o 2 bicchieri al giorno) coinvolge circa il 30% dei veneti, in particolar modo gli uomini (38,3% vs 21,9%) e gli adulti di 60 anni ed oltre (oltre 43%);
- se si considera il consumo occasionale, invece, si rileva che è particolarmente diffuso tra le donne (25,3% vs 29%), tra i giovani di 18-19 anni (37,1%) e i giovani adulti di 25-34 anni (37,6%).

Rispetto i dati nazionali, in Veneto la quota dei bevitori di vino, risulta superiore in entrambi i generi e in tutte le classi di età (Allegato Tabella 61).

---

<sup>2 2</sup> Il rapporto "Monitoraggio dei dati sull'abuso di alcol e problemi alcol-correlati nella Regione Veneto - Anni 2001 - 2002 è scaricabile dai siti: [www.venetosociale.org](http://www.venetosociale.org), sezione Dipendenze-Documenti, e [www.veneto.dronet.org](http://www.veneto.dronet.org), sezione Epidemiologia

## Il consumo di bevande alcoliche nella popolazione generale

Età in classi	Consumo		Più di 1 lt al giorno	Tra 1 e 1/2 lt al giorno	Oltre 1/2 litro al giorno		1-2 bicchieri al giorno		Più raramente	
	VENETO	ITALIA	VENETO	VENETO	VENETO	ITALIA	VENETO	ITALIA	VENETO	ITALIA
<b>Maschi</b>	76,6	71,6	0,9	8,7	9,6	9,0	38,3	36,3	25,1	22,9
<b>Femmine</b>	53,8	44,1	0,2	1,4	1,6	1,8	21,9	17,2	26,5	22,1
<b>Totale</b>	<b>63,9</b>	<b>57,4</b>	<b>0,6</b>	<b>4,9</b>	<b>5,4</b>	<b>5,3</b>	<b>29,5</b>	<b>26,4</b>	<b>25,5</b>	<b>22,5</b>

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

Nel considerare la variabile "condizione professionale", si rileva che il maggior numero di consumatori di vino, di entrambi i generi, si colloca tra i "Ritirati dal lavoro" (76%). In questa categoria professionale si ritrova anche il maggior numero di consumatori eccessivi di vino (Allegato Tabella 62).

L'analisi effettuata sulla base del "titolo di studio conseguito", rileva che il maggior numero di forti bevitori di vino (oltre 1/2 litro al giorno), sia uomini che donne, risulta in possesso della licenza elementare (Allegato Tabella 63).

### I consumatori di BIRRA

Dall'indagine Multiscopo condotta nel Veneto nell'anno 2002 si evidenzia che:

- il 51% dei soggetti intervistati dichiara di aver consumato birra almeno una volta nell'anno, in particolar modo gli uomini (66,2% vs 36,7) e le persone di età inferiore ai 54 anni;
- il 56,6% dei giovanissimi di età inferiore ai 17 anni e il 63% dei 18-19enni, per la maggior parte maschi, ha consumato birra soprattutto in modo occasionale;
- la modalità di consumo prevalente è quella occasionale/stagionale (rispettivamente 33,5% e 12,6% della popolazione);
- il consumo quotidiano di birra coinvolge il 4,8% dei veneti (M=8% vs F=1,9%) di tutte le età, compresi i giovanissimi di età inferiore ai 17 anni (2,3%). L'1% dei veneti, quasi tutti maschi di 20-44 anni, consuma oltre 1/2 litro di birra al giorno (Allegato Tabella 64).

Età in classi	Consumo		Più di 1 lt al giorno	Tra 1 e 1/2 lt al giorno	1-2 bicchieri al giorno	Consuma birra tutti i giorni		Più raramente		Solo Stagionalmente	
	VENETO	ITALIA	VENETO	VENETO	VENETO	VENETO	ITALIA	VENETO	ITALIA	VENETO	ITALIA
<b>Maschi</b>	66,2	62,0	0,1	1,6	6,3	8,0	9,1	43,0	34,7	15,2	18,1
<b>Femmine</b>	36,7	31,7	0,2	0,3	1,4	1,9	1,8	24,6	19,0	10,1	10,9
<b>Totale</b>	<b>51,0</b>	<b>46,3</b>	<b>0,1</b>	<b>0,9</b>	<b>3,8</b>	<b>4,8</b>	<b>5,3</b>	<b>33,5</b>	<b>26,6</b>	<b>12,6</b>	<b>14,4</b>

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

Dalle inferenze statistiche effettuate considerando la variabile "condizione lavorativa", emerge che il 65% degli occupati veneti ha consumato birra almeno una volta in 12 mesi. Per circa il 58% di questi si è trattato di un consumo occasionale/stagionale. In questa stessa categoria si ritrova anche la maggior

quota percentuale di consumatori abituali di birra (7,3%), in particolar modo tra gli operai e i lavoratori in proprio (Allegato Tabella 65).

Sulla base del titolo di studio, emerge che il 63,1% dei veneti che hanno conseguito un diploma superiore consuma birra. Per quanto riguarda il consumo abituale di birra (quotidiano), la quota maggiore si ritrova tra gli uomini che hanno conseguito la licenza media inferiore (10,5%) in misura simile a quella nazionale (Allegato Tabella 66).

### ***I consumatori di APERITIVI ALCOLICI***

Rispetto gli aperitivi alcolici, in Veneto si rileva che:

- il 33,4% dei soggetti intervistati dichiara di consumare aperitivi alcolici in particolar modo gli uomini (46,1% vs 21,4%) e i giovani di 18-24 anni, sia maschi che femmine;
- è proprio tra i più giovani che si registrano le quote percentuali più elevate di consumatori regolari (consumo settimanale) di aperitivi alcolici;
- se si considera la modalità di consumo, si rileva che per quasi il 58,3% dei bevitori veneti di aperitivi alcolici, in particolare per le donne (72,5% vs 51,3%), si tratta di un consumo eccezionale;

Il confronto con i dati nazionali evidenzia che nel Veneto la quota media di consumatori di aperitivi alcolici è superiore a quella nazionale (33,4% vs 28%), sia tra gli uomini che tra le donne, come anche tra le persone di età compresa tra i 14 e i 44 anni (Allegato Tabella 67).

Età in classi	Consumo		Consumo quotidiano VENETO	Qualche bicchiere a settimana VENETO	Più raramente VENETO	Eccezionalmente a)	
	VENETO	ITALIA				VENETO	ITALIA
<b>Maschi</b>	46,1	40,0	1,8	7,5	13,1	51,3	55,5
<b>Femmine</b>	21,4	16,8	0,1	1,6	4,2	72,5	70,0
<b>Totale</b>	<b>33,4</b>	<b>28,0</b>	0,9	4,5	8,5	<b>58,3</b>	<b>60,0</b>

a) = per 100 consumatori della stessa bevanda

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

Le elaborazioni effettuate sulla base della variabile "Condizione lavorativa" rilevano che nel Veneto:

- il 45,1% degli occupati ha consumato aperitivi alcolici e per oltre la metà degli stessi si è trattato di un consumo eccezionale;
- il 53,1% degli studenti veneti, in particolare maschi (63,4% vs 43%) consuma aperitivi alcolici e per circa il 10% di questi si tratta di un consumo settimanale.

Il confronto con i dati nazionali evidenzia che la quota media di studenti veneti che consuma aperitivi alcolici è superiore a quella nazionale (53,1% vs 33,8%) sia tra i maschi che tra le femmine (Allegato Tabella 68).

L'analisi dei bevitori di aperitivi alcolici effettuata sulla base del titolo di studio conseguito rileva che circa la metà dei veneti in possesso di un titolo di studio oltre la licenza media inferiore consumano aperitivi alcolici, superando la media nazionale, anche se per oltre la metà di questi ne consuma eccezionalmente (Allegato Tabella 69).

### ***I consumatori di AMARI***

Rispetto gli amari, nel Veneto si rileva che:

- il 29,8% dei soggetti intervistati dichiara di consumare amari, in particolar modo gli uomini (42,2% vs 18,1%);
- oltre il 40% dei giovani e dei giovani adulti di 18-34 ha consumato amari;
- tra i giovani di 20-24 anni si ritrova la quota percentuale più elevata di consumatori regolari di amari (consumo settimanale);
- nel complesso, per il 56,3% dei bevitori di amari, la modalità di consumo prevalente è quella eccezionale/occasionale (Allegato Tabella 70).

Età in classi	Consumo		Qualche bicchiere a settimana VENETO	Più raramente VENETO	Eccezionalmente a)	
	VENETO	ITALIA			VENETO	ITALIA
<b>Maschi</b>	42,2	43,2	8,1	10,4	56,3	54,5
<b>Femmine</b>	18,1	16,2	2,2	3,1	70,6	73,4
<b>Totale</b>	<b>29,8</b>	<b>29,2</b>	<b>5,1</b>	<b>6,6</b>	<b>60,8</b>	<b>59,9</b>

a) = per 100 consumatori della stessa bevanda  
Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

Le elaborazioni effettuate considerando la condizione lavorativa evidenziano:

- la quota maggiore di bevitori veneti di amari si riscontra tra gli occupati (39,7%) e tra i disoccupati (38,1%) (Allegato Tabella 71).

Circa un terzo dei veneti con un titolo di studio medio-alto (diploma quinquennale e laurea) consuma amari (Allegato Tabella 72).

### ***I consumatori di LIQUORI***

Rispetto i liquori, nel Veneto si rileva che:

- il 30,1% dei soggetti intervistati dichiara di consumare liquori con valori superiori alla media nazionale;
- le maggiori prevalenza si ritrovano nel collettivo maschile (42,8% vs 18,1%);
- il 64,1% dei bevitori di liquori consuma eccezionalmente, in particolar modo le donne (59,7% vs 73,9%);
- più della metà degli uomini di età compresa tra i 19 e i 34 anni ha consumato liquori e per circa la metà di questi si tratta di un consumo eccezionale;
- circa il 20% dei giovanissimi di 14-17 anni consuma liquori in un anno;
- il 2% dei giovanissimi di 17 anni consuma almeno qualche bicchiere di superalcolici a settimana, mentre per circa il 73% dei giovani bevitori di alcolici si tratta di un consumo eccezionale con valori superiori alla media nazionale (Allegato Tabella 73).

Età in classi	Consumo		Qualche bicchiere a settimana VENETO	Più raramente VENETO	Eccezionalmente a)	
	VENETO	ITALIA			VENETO	ITALIA
<b>Maschi</b>	42,8	37,0	7,7	9,5	59,7	61,1
<b>Femmine</b>	18,1	12,1	0,9	3,9	73,9	75,1
<b>Totale</b>	<b>30,1</b>	<b>24,1</b>	<b>4,2</b>	<b>6,6</b>	<b>64,1</b>	<b>64,7</b>

a) = per 100 consumatori della stessa bevanda  
Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

L'analisi effettuata sulla base della condizione lavorativa, evidenzia che la quota percentuale maggiore di bevitori di liquori si riscontra tra gli occupati (circa 39%), in particolare tra la categoria dei dirigenti/imprenditori e liberi professionisti. Anche per quanto riguarda i bevitori di liquori, si deve sottolineare che per circa il 64% di questi si tratta di un consumo raro/eccezionale, superando le corrispondenti medie nazionali (Allegato Tabella 74).

L'analisi effettuata sulla base del titolo di studio conseguito evidenzia, sia negli uomini che nelle donne, che la quota dei bevitori di liquori aumenta all'aumentare del titolo di studio conseguito.

Si rileva, inoltre, che circa il 64% dei bevitori di liquori, in particolare donne, la modalità di consumo prevalente è quella eccezionale (Allegato Tabella 75).

### ***I consumatori di BEVANDE ALCOLICHE FUORI PASTO***

Rispetto il consumo delle bevande alcoliche fuori pasto:

- circa il 36,3% della popolazione veneta di 14 anni ed oltre, in percentuale superiore a quella nazionale, consuma bevande alcoliche fuori pasto, in particolar modo gli uomini (53,1% vs 20,4%);
- per il 63,4% dei bevitori veneti si tratta di un comportamento eccezionale, in particolar modo per le donne (58% vs 77,2%). Tale quota di bevitori registra valori inferiori a quelli rilevati a livello nazionale (64,6% vs 78,4%);
- coerentemente con quanto già riportato per il consumo di aperitivi alcolici, si rileva che la maggior quota di bevitori di alcolici fuori dei pasti si riscontra tra i giovani di 18-24 anni, in particolar modo maschi (Allegato Tabella 760).

Età in classi	Consumo		Qualche volta alla settimana	Consumo di alcolici fuori pasto meno di una volta a settimana <sup>a)</sup>	
	VENETO	ITALIA		VENETO	ITALIA
<b>Maschi</b>	53,1	35,1	18,6	58,0	64,6
<b>Femmine</b>	20,4	12,1	4,2	77,2	78,4
<b>Totale</b>	<b>36,3</b>	<b>23,2</b>	<b>11,2</b>	<b>63,6</b>	<b>68,4</b>

a) = per 100 persone che bevono alcolici fuori dei pasti

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

L'analisi effettuata sulla base della condizione lavorativa, evidenzia che tra gli studenti (48,5%) e tra gli occupati (44,7%) si registrano le quote percentuali più elevate di bevitori di alcolici fuori dei pasti.

Per oltre la metà dei bevitori di tutte le categorie lavorative si tratta di un consumo eccezionale anche se in misura inferiore a quella registrata a livello nazionale (Allegato Tabella 77).

L'analisi effettuata sulla base del titolo di studio conseguito evidenzia che i consumatori di bevande fuori dei pasti, sia uomini che donne, si distribuiscono uniformemente nelle diverse categorie di livello scolastico conseguito (Allegato Tabella 78).



## **CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE IN STUDENTI E LAVORATORI**

---



## IL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE NEGLI STUDENTI E NEI LAVORATORI DEL VENETO

### IL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE NELLA POPOLAZIONE STUDENTESCA

Per approfondire il consumo di bevande alcoliche nella popolazione giovanile, si propone nell'ambito del presente rapporto quanto emerso dall'indagine ESPAD (The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) sulla popolazione studentesca, condotta annualmente nel Veneto a seguito della realizzazione del Progetto Regionale "Stima di prevalenza ed incidenza dell'uso ed abuso di alcol e droghe illecite" condotto dal CNR di Pisa – Istituto di Fisiologia Clinica.

L'indagine ESPAD, congiuntamente all'indagine IPSAD (Italian Population Survey on Alcohol and Drugs), condotta nella popolazione generale di 15-54 anni, permettono di monitorare il fenomeno del consumo di sostanze psicoattive a livello regionale e soprattutto di elaborare stime di prevalenza a livello delle realtà territoriali di Aziende ULSS regionali.

In Italia, nell'anno 2003, la numerosità del campione selezionato è stata di 27.392 studenti di 15-19 anni, suddivisi nelle diverse tipologie scolastiche; nel Veneto l'indagine ha coinvolto 3.646 studenti delle scuole medie superiori (1.829 maschi e 1.817 femmine).

Di seguito si riportano le elaborazioni dei dati ESPAD Veneto 2003, confrontate con i dati nazionali e quelli riferiti agli anni precedenti, relativamente alle parti sull'età di inizio al consumo di bevande alcoliche, la percezione del rischio associato al consumo e il consumo nella vita e negli ultimi 12 mesi.


#### ***La percezione del rischio associato al consumo di bevande alcoliche***

il 62% degli studenti veneti, in particolare i più giovani e tra questi le studentesse, percepisce rischioso bere un paio di bicchieri di alcolici al giorno.

La quota di studenti che percepisce rischioso bere alcolici aumenta notevolmente, passando a circa 88% se il consumo riguarda 5 o più bicchieri di alcolici ogni giorno. Anche in questo caso le percentuali maggiori di rispondenti si riscontrano tra gli studenti fino a 17 anni e tra le studentesse.

Il consumo nel fine settimana di 4/5 bicchieri di alcolici è percepito come rischioso dal 78% degli studenti, in particolar modo dai 17enni di entrambi i generi (Grafico 1).

**Grafico 1 – Percentuale di consumatori per genere ed età che percepiscono RISCHIOSO assumere bevande alcoliche, Italia e Veneto –2003**



Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche

Complessivamente, le quote di studenti veneti che percepiscono rischioso bere bevande alcoliche, in particolare il bere quotidiano eccessivo e nel fine settimana, risultano superiori a quelle nazionali in particolare se si considerano i giovani di 17 anni.

Nel corso degli anni, la quota di studenti veneti che percepisce rischioso assumere bevande alcoliche è aumentato gradualmente (Tabella 9).

**Tabella 9 - Distribuzione percentuale di studenti che riferiscono di percepire il rischio correlato al consumo di sostanze, Italia e Veneto – 2001-2003**

	Bere 1 o 2 bicchieri al giorno		Bere 4 o 5 bicchieri quasi ogni giorno		Bere 5 bicchieri o più ogni giorno	
	Italia	Veneto	Italia	Veneto	Italia	Veneto
Anno 2001		49,1		83,9		49,1
Anno 2002	49,7	48,9	82,5	83,4	49,7	48,9
Anno 2003	61,8	61,5	87,2	88,2	61,8	61,5

Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche

***L'età di iniziazione al consumo delle bevande alcoliche***

Il primo bicchiere di vino è stato bevuto da oltre un terzo degli studenti veneti intorno agli 11-12 anni, la prima birra, invece, per oltre il 50% degli studenti veneti è stata assaggiata intorno ai 12-14 anni. Gli studenti che hanno iniziato a bere liquori intorno i 14-15 anni risultano circa il 41%, mentre per il 48,3% la prima ubriacatura si è verificata intorno ai 14-16 anni.

La quota di studenti veneti che ha cominciato ad assumere bevande alcoliche al di sotto dell'età legale, come anche ad ubriacarsi, risulta leggermente superiore alla media nazionale (Tabella 10).


**Tabella 10 – Percentuale di consumatori per età di iniziazione, Italia e Veneto – 2003**

	Bere birra		Bere vino		Bere liquori		Ubriacarsi	
	Italia	Veneto	Italia	Veneto	Italia	Veneto	Italia	Veneto
11 anni	18,7	14,2	22,9	22,5	6,6	4,7	2,0	1,3
12 anni	15,0	15,5	12,1	13,9	7,2	7,3	2,5	2,2
13 anni	15,9	16,6	12,6	14,1	12,0	13,7	5,8	5,9
14 anni	17,6	18,7	13,1	13,8	19,5	23,0	14,4	16,0
15 anni	9,4	9,1	7,7	8,0	15,1	17,9	13,7	15,4
16 anni	6,8	7,3	7,1	7,0	13,3	13,3	17,2	16,9
<b>TOTALE</b> <b>(al di sotto dell'età legale)</b>	<b>83,4</b>	<b>81,4</b>	<b>75,5</b>	<b>79,3</b>	<b>73,7</b>	<b>79,9</b>	<b>55,6</b>	<b>57,7</b>

Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche

La quota di studenti che ha iniziato ad assumere le bevande alcoliche dagli 11 ai 14 anni risulta maggiore tra i maschi piuttosto che tra le femmine, mentre i maschi e le femmine che hanno iniziato a bere e/o ad ubriacarsi a 15-16 anni risultano in percentuali del tutto simili (Grafico 2).

Grafico 2 – Percentuale di consumatori per età di iniziazione, Veneto anno 2003



Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche

**il consumo delle bevande alcoliche**

Complessivamente, oltre il 93% degli studenti veneti di 15-19 anni ha sperimentato il consumo di bevande alcoliche, con quote percentuali leggermente superiori a quelle nazionali. Anche per quanto riguarda l'esperienza dell'ubriacatura, gli studenti veneti riportano valori percentuali superiori a quelli nazionali, con circa il 58% che dichiara di essersi ubriacato almeno una volta (Tabella 11-a).

Per quanto riguarda il consumo e le ubriacature nell'ultimo anno, si evidenziano tassi di prevalenza annuali tra gli studenti veneti pari rispettivamente all'88,6% e 45,2%, valori che risultano superiori alle corrispondenti medie nazionali. Il consumo annuale tra la popolazione studentesca rileva, nel corso del triennio esaminato, un andamento costante (Tabella 11-b).

In entrambi le variabili tra gli studenti veneti si registrano valori superiori a quelli registrati tra i coetanei italiani.

La sostanziale invariabilità dei tassi di prevalenza riferiti al consumo nella vita e nell'ultimo anno, permette di evidenziare che generalmente il consumo alcolico non si riferisce ad un'episodica fase di sperimentazione, ma tende a trasformarsi in un comportamento consolidato.

**Tabella 11 - Consumo di bevande alcoliche, Italia e Veneto – 2001-2003**

**a) Nella vita**

	Bere bevande alcoliche		Ubriacarsi	
	Italia	Veneto	Italia	Veneto
Anno 2002	90,7	93,0	57,1	57,9
Anno 2003	90,8	93,2	56,3	57,8

**b) Negli ultimi 12 mesi**

	Bere bevande alcoliche		Ubriacarsi	
	Italia	Veneto	Italia	Veneto
Anno 2002	85,6	89,0	43,3	45,2
Anno 2003	84,4	88,6	42,1	45,2

Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche

Dal confronto con l'indagine svolta nell'anno 2002, i tassi di prevalenza annuali rimangono sostanzialmente invariati. Nello specifico delle età, si rileva un aumento dei consumatori di 18 anni e dei 19enni che si sono ubriacati, come anche un decremento dei 17enni che hanno adottato il comportamento rischio dell'ubriacatura. Complessivamente si rileva che sia il consumo di alcolici che il comportamento di abuso alcolico aumentano all'aumentare dell'età (Tabella 12).


Nello specifico dell'anno 2003, se si considerano le differenze di genere e di età, la quota di consumatori maschi che assume alcolici e che si ubriaca risulta superiore rispetto a quella delle coetanee.

Tabella 12 – Consumo negli ultimi 12 mesi, Italia e Veneto – 2002-2003

	Anno 2002				Anno 2003			
	Bere alcolici		Ubriacarsi		Bere alcolici		Ubriacarsi	
	Italia	Veneto	Italia	Veneto	Italia	Veneto	Italia	Veneto
15 anni	74,4	76,2	25,8	25,4	73,8	75,3	24,7	39,4
16 anni	82,7	88,1	36,7	39,3	82,6	87,0	36,2	40,8
17 anni	88,7	91,7	39,1	48,5	86,8	91,5	43,1	44,9
18 anni	89,0	93,0	50,7	53,2	90,2	94,9	50,7	54,0
19 anni	91,2	94,5	54,7	57,5	90,0	93,9	53,5	59,4
<b>15-19 anni</b>	<b>85,6</b>	<b>89,0</b>	<b>43,3</b>	<b>45,2</b>	<b>84,8</b>	<b>88,6</b>	<b>42,1</b>	<b>45,2</b>

Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche

Grafico 3 – Distribuzione dei tassi di prevalenza annuali del consumo di bevande alcoliche per sesso ed età – Italia e Veneto – 2003



Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche

## IL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE NEI LAVORATORI

Nell'ambito del progetto Regionale "Stima di prevalenza ed incidenza dell'uso ed abuso di alcol e droghe illecite nella Regione Veneto", è stata condotta l'indagine IPSAD sulla popolazione generale di 15-54 anni che ha l'obiettivo di rilevare il consumo di alcol, tabacco e altre sostanze psicoattive nella popolazione generale.

Di seguito si riportano i dati relativi alle analisi effettuate sul target specifico dei lavoratori rispetto il consumo abituale di bevande alcoliche, suddivisi per classi di età, sesso e provincia di residenza.

Nel Veneto, l'indagine campionaria svolta nell'anno 2003 ha coinvolto 2.264 soggetti, dei quali il 71,3% è rappresentato da soggetti lavoratori (Maschi=51%; Femmine=49%).

### *Il consumo di bevande alcoliche negli ultimi 12 mesi*

Le analisi evidenziano che i tassi di prevalenza annui più elevati si riscontrano tra gli uomini piuttosto che tra le lavoratrici, come anche tra i lavoratori più giovani piuttosto che di classi di età più elevate.

I giovani lavoratori fino a 24 anni, sia uomini che donne, residenti nelle province di Belluno, Padova, Treviso e Venezia, registrano i tassi di prevalenza più elevati. Tra i lavoratori della classe di età successiva (25-34 anni) si distinguono i lavoratori maschi residenti nelle province di Belluno, Padova, Treviso e Venezia e le lavoratrici delle province di Belluno e Treviso.


Infine tra i lavoratori più maturi (45-54 anni) si distinguono gli uomini residenti nelle province di Belluno, Rovigo e Verona e le lavoratrici delle province di Belluno, Rovigo e Venezia (Tabella 13 e Grafico 4).

**Tabella 13 – Tassi di prevalenza stimati relativamente al consumo di bevande alcoliche in 12 mesi secondo il genere e le classi di età**

	BELLUNO	PADOVA	ROVIGO	TREVISO	VENEZIA	VERONA	VICENZA	
<b>MASCHI</b>	15-24 anni	89,7	87,7	60,2	92,9	34,8	42,8	
	25-34 anni	65,8	73,9	51,1	79,9	39,3	37,5	
	35-44 anni	54,8	56,4	44,1	51,7	55,3	44,5	
	45-54 anni	93,2	58,3	77,8	68,2	62,1	68,2	
	<b>Totale</b>	<b>75,9</b>	<b>69,1</b>	<b>58,3</b>	<b>73,2</b>	<b>75,3</b>	<b>51,1</b>	<b>48,3</b>
<b>FEMMINE</b>	15-24 anni	58,6	35,3	13,3	67,6	47,3	33,9	
	25-34 anni	46,4	29,9	24,0	53,8	40,3	28,5	
	35-44 anni	38,7	25,9	28,0	36,1	37,1	23,9	
	45-54 anni	83,1	45,6	66,5	49,3	58,6	41,9	34,3
	<b>Totale</b>	<b>56,7</b>	<b>34,2</b>	<b>32,9</b>	<b>51,7</b>	<b>45,8</b>	<b>34,4</b>	<b>30,2</b>

Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche

**Grafico 4 - Tassi di prevalenza stimati relativamente al consumo di bevande alcoliche negli ultimi 12 mesi secondo il genere e le classi di età, anno 2003**



Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche

### ***Le ubriacature negli ultimi 30 giorni***

Rispetto gli episodi di ubriacatura verificatisi in un mese, si è rilevato che complessivamente i lavoratori maschi delle province di Belluno e Treviso e le lavoratrici della provincia di Belluno si distinguono dal resto dei lavoratori del Veneto per i tassi di prevalenza superiori.

In linea con quanto rilevato riguardo il consumo alcolico, tra i lavoratori maschi di 15-24 anni si registrano i tassi di prevalenza più elevati, in particolare tra i residenti delle province di Belluno, Treviso e Venezia.

Per quanto riguarda i lavoratori uomini di 25-34 anni e 45-54 anni emergono i residenti nella provincia di Treviso.


Rispetto le lavoratrici, invece, per i comportamenti di abuso adottati si distinguono le residenti nella provincia di Belluno, considerando tutte le classi di età (Tabella 14 e Grafico 5).

**Tabella 14 – Tassi di prevalenza stimati relativamente alle ubriacature in 30 giorni secondo il genere e le classi di età, anno 2003**

	BELLUNO	PADOVA	ROVIGO	TREVISO	VENEZIA	VERONA	VICENZA
<b>MASCHI</b>							
15-24 anni	28,1%	19,4%	12,8%	22,2%	22,3%	15,0%	18,9%
25-34 anni	16,1%	14,3%	7,0%	21,1%	17,2%	12,5%	15,2%
35-44 anni	10,7%	9,4%	3,3%	11,3%	9,3%	7,2%	7,8%
45-54 anni	12,3%	8,9%	3,1%	18,0%	6,9%	4,7%	5,0%
<b>Totale</b>	<b>16,8%</b>	<b>13,0%</b>	<b>6,5%</b>	<b>18,1%</b>	<b>13,9%</b>	<b>9,8%</b>	<b>11,7%</b>
<b>FEMMINE</b>							
15-24 anni	18,1%	10,2%	7,3%	7,1%	7,5%	5,1%	5,1%
25-34 anni	10,9%	6,4%	4,4%	2,8%	5,7%	3,3%	3,8%
35-44 anni	4,8%	2,9%	3,0%	1,0%	3,3%	1,5%	2,3%
45-54 anni	6,3%	3,0%	3,1%	1,3%	3,9%	1,2%	2,6%
<b>Totale</b>	<b>10,0%</b>	<b>5,6%</b>	<b>4,4%</b>	<b>3,1%</b>	<b>5,1%</b>	<b>2,8%</b>	<b>3,4%</b>

Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche

**Grafico 5 - Tassi di prevalenza stimati relativamente alle ubriacature in 30 giorni secondo il genere e le classi di età, anno 2003**



Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche



## **LA RETE DEI SERVIZI**

---



## LA RETE DEI SERVIZI PER L'ALCOLOGIA

La rete dei servizi per l'alcolologia nella Regione Veneto consiste principalmente in 21 Dipartimenti per le Dipendenze delle Aziende Unità Locali Socio-Sanitarie (con 38 Servizi per le Tossicodipendenze e l'Alcolologia (SerT), 2 Aziende Ospedaliere Universitarie, 1 Comunità Pubblica Residenziale per alcolodipendenti.

Il sistema pubblico per l'alcolologia si integra con quello del privato-sociale e del volontariato che consiste in 33 comunità terapeutiche residenziali e semi-residenziali, 34 Associazioni iscritte all'Albo Regionale, 632 gruppi di auto-mutuo-aiuto (532 Club degli Alcolisti in Trattamento e 100 Alcolisti Anonimi).

### I SERVIZI PUBBLICI

Quasi tutti i servizi pubblici<sup>1</sup> (97,4%), nel corso dell'anno 2003, hanno collaborato con i gruppi di auto-mutuo-aiuto CAT, il 76,3% con i gruppi AA e circa il 16% con altri gruppi del volontariato-sociale specifici del settore.

Circa il 66% dei servizi ha collaborato con cooperative sociali specifiche per l'inserimento lavorativo degli alcolodipendenti, il 52,6% con comunità terapeutiche residenziali/semiresidenziali e il 18,4% con cooperative sociali per la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi.

Le attività di collaborazione con gli enti privati (case di cura convenzionati o altro) sono state realizzate dal 10,5% dei servizi pubblici.

Ogni servizio rispondente ha collaborato mediamente con circa 18 gruppi CAT, 5 AA, 3 altri gruppi di auto-aiuto, 3 comunità terapeutiche residenziali/semiresidenziali e cooperative sociali per l'inserimento lavorativo.

Le attività di collaborazione attivate con gli enti privati sono state mediamente 1,8 per servizio rispondente (Tabella 15).

Rispetto l'anno 2002, si rileva un aumento nel numero medio di attività svolte in collaborazione con i gruppi CAT (17,6% vs 14,2%) e con gli Enti del Privato-Sociale (Comunità terapeutiche semi/residenziali: 1,8% vs 2,8%; Cooperative sociali per la gestione dei servizi sociosanitari ed educativi: 1,4% vs 2,1%).

---

<sup>1</sup> Nel 2003 il numero di servizi rispondenti è stato di 38 servizi: 35 SerT e 2 Aziende Ospedaliere (l'Azienda Ospedaliera di Padova ha rilevato 2 Servizi di Alcolologia)

**Tabella 15 – Le collaborazioni tra servizi pubblici rilevati ed Associazioni/Enti privato-sociale – anno 2003**

Associazioni ed Enti	Servizi pubblici rilevati che hanno collaborato		Numero medio di collaborazioni
	Val. Ass	Val %	
<b>GRUPPI DI AUTO AIUTO</b>			
- CAT	37	97,4	17,6
- AA	29	76,3	4,6
- Altri Gruppi di auto-aiuto	6	15,8	2,8
<b>ENTI PRIVATO-SOCIALE</b>			
- Comunità terapeutiche semi/residenziali	20	52,6	2,8
- Cooperative sociali per la gestione dei servizi sociosanitari ed educativi	7	18,4	2,1
- Cooperative sociali per l'inserimento lavorativo	25	65,8	2,8
- Altro	6	15,8	3,0
<b>ENTI PRIVATI</b>			
- Case di cura convenzionate	4	10,5	1,8
- Case di cura private	---	---	---
- Altro	2	5,3	1,5

Elaborazione dei dati Ministeriale forniti dalla Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali – Ufficio Prevenzione Devianze

***Le attività e le funzioni svolte dai servizi pubblici***

Dalla rilevazione ministeriale sulle attività e le funzioni svolte (ALC 07), emerge che la quasi totalità dei servizi pubblici ha svolto attività di accoglienza e prevenzione, ha definito e attuato programmi terapeutico-riabilitativi.

Anche le attività di coordinamento con i medici di famiglia, i servizi ospedalieri, quelli privati e sociali presenti nel territorio di competenza sono stati svolti da oltre il 90% dei servizi pubblici.

Risulta inferiore il numero di servizi che hanno svolto attività/funzioni di coordinamento con altri servizi pubblici (78,4%) e di rilevazione epidemiologica (73%). Nelle attività di formazione sono stati coinvolti l'86,5% dei servizi rilevati (Tabella 16).

Rispetto l'anno 2002, si rileva un aumento percentuale del numero di servizi che hanno svolto attività di prevenzione (97,3% vs 87,5%), di coordinamento con altri servizi pubblici (78,4% vs 75%) e con i medici di base (97,3% vs 92,5%).

**Tabella 16 – I servizi pubblici che hanno svolto le funzioni indicate dal Ministero, anno 2003**

Tipologie di funzioni ed attività	Val. Ass.	Val. %
- Di prevenzione	37	97,3
- Di accoglienza	38	100,0
- Definizione di programmi terapeutico-riabilitativi	37	97,3
- Attuazione di programmi terapeutico-riabilitativi	37	97,3
- Coordinamento con altri servizi pubblici	30	78,4
- Coordinamento con i medici di base	37	97,3
- Coordinamento con servizi privati	35	94,6
- Coordinamento con servizi ospedalieri	36	97,3
- Coordinamento con servizi sociali pubblici	34	91,9
- Coordinamento delle attività di rilevazione epidemiologica	27	73,0
- Formazione del personale	32	86,5
- Altro	6	16,2


Elaborazione dei dati Ministeriali forniti dalla Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali – Ufficio Prevenzione Devianze

**La dotazione organica**

Dalla rilevazione ministeriale della dotazione organica (ALC 02) riferita all'anno 2003, si rilevano 368 unità totali (a tempo pieno e parziale); di queste il 76,1% è parzialmente addetto. Dalla distribuzione del personale secondo il ruolo e il tipo di rapporto (esclusivo o parziale), emerge che il 42,4% del personale totale appartiene all'area medico-sanitaria e il 45,1% all'area psico-sociale (Grafico 6). Dalla distribuzione del personale secondo il ruolo e il tipo di rapporto (esclusivo o parziale), come nell'anno 2002, risulta più elevata la percentuale di medici ed infermieri professionali impiegati con un contratto parziale, rispetto le altre figure professionali.


Nel corso dell'anno 2003, tra gli educatori professionali e gli assistenti sociali si registrano le percentuali più elevate di addetti a tempo pieno, rispettivamente il 36,8% e il 34% (Grafico 7). Rispetto l'anno 2002, si osserva un aumento di 2,5 punti percentuali nel numero di "Altri operatori" (8,2% vs 5,7%), e un decremento, invece, del numero di infermieri professionali pari a circa 2 punti percentuali (22,3% vs 24,2%).

**Grafico 6 - Distribuzione percentuale dotazione organica totale, anno 2003**



Elaborazione dei dati Ministeriale forniti dalla Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali – Ufficio Prevenzione Devianze

**Grafico 7 - Distribuzione assoluta dotazione organica totale secondo il ruolo e il tipo di rapporto, anno 2003**



Elaborazione dei dati Ministeriale forniti dalla Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali – Ufficio Prevenzione Devianze

A livello regionale, il numero di utenti in carico per ciascun operatore è passato da 45,9 del 2002 a 38,3. Il range di valori che descrive il rapporto operatori/domanda varia da un minimo di un operatore ogni circa 11 utenti, rilevato nell'Azienda ULSS22-Bussolengo, ad un massimo di un operatore ogni 94,3 utenti, presente nell'Azienda ULSS19-Adria (Tabella 17).

**Tabella 17 - Rapporto utenti ed operatori, anno 2003**

Aziende ULSS	Numero utenti in carico	Numero operatori	Rapporto Operatori <sup>2</sup> /Domanda
1 - Belluno	549	14	39,2
2 - Feltre	271	4	67,8
3 - Bassano del Grappa	362	9	40,2
4 - Thiene	232	4	58,0
5 - Arzignano	414	11,5	36,0
6 - Vicenza	300	11	27,3
7 - Pieve Di Soligo	404	8	50,5
8 - Asolo	582	21	27,7
9 - Treviso	576	12	48,0
10 - San Donà di Piave	364	20	18,2
12 - Veneziana	128	6,5	19,7
13 - Mirano	569	19	29,9
14 - Chioggia	270	8,5	31,8
15 - Cittadella	728	11,5	63,3
16 - Padova	470	11,5	40,9
17 - Este Monselice	397	12,5	31,8
18 - Rovigo	729	8,5	85,8
19 - Adria	283	3	94,3
20 - Verona	325	6	54,2
21 - Legnago	195	6	32,5
22 - Bussolengo	80	7,5	10,7
<b>Regione VENETO</b>	<b>8.228</b>	<b>215</b>	<b>38,3</b>

Elaborazione dei dati Ministeriale forniti dalla Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali – Ufficio Prevenzione Devianze

### LA RETE DEL VOLONTARIATO

Dalla rilevazione annuale per il Ministero della Salute (ALC 07), emerge che nel corso dell'anno 2003, i servizi pubblici delle Aziende ULSS hanno collaborato complessivamente con 641 gruppi di auto-mutuo-aiuto: 525 CAT, 105 AA, 11 altri gruppi.

L'indice di copertura demografica media regionale equivale a 1 gruppo ogni circa 4.900 residenti di 15-64 anni (vs 1 gruppo ogni 4.707 abitanti di 15-64 anni nel 2002), con una distribuzione dei gruppi estremamente disomogenea nel territorio regionale. L'indice di copertura, infatti, varia da 1 gruppo ogni 1.123 abitanti nell'Az. ULSS1-Belluno, a 1 ogni 15.273, nell'Az. ULSS12 Veneziana (Tabella 18).

Gli utenti inseriti nei gruppi di auto-mutuo-aiuto (ALC 06), nel corso dell'anno 2003, sono stati 3.103, con un decremento rispetto l'anno precedente pari al 5,3%. L'utenza inserita nei gruppi di auto-mutuo-aiuto equivale al 29,5% dell'utenza totale, con percentuali comprese tra il 5,5% dell'Az. Ospedaliera di Padova e il 74,5% dell'Az. ULSS di Padova (Tabella 19).

<sup>2</sup> gli operatori che si occupano parzialmente di alcologia sono stati considerati come 0,5 unità di personale.

**Tabella 18 – Distribuzione gruppi di auto-mutuo-aiuto ed indice di copertura demografica, Anno 2003**

Az. ULSS	GRUPPI DI AUTO-MUTUO AIUTO				Indice di copertura demografica	
	CAT	AA	ALTRO	Totali	su popolazione di 15-64 anni	su popolazione totale
1 - Belluno	74	2	0	76	1.123	1.697
2 - Feltre	15	0	0	15	3.616	5.501
3 - Bassano del Grappa	12	7	4	23	4.981	7.377
4 - Thiene	22	5	0	27	4.473	6.637
5 - Arzignano	25	6	0	31	3.763	5.518
6 - Vicenza	31	12	0	43	4.729	6.963
7 - Pieve Di Soligo	36	3	0	39	3.583	5.363
8 - Asolo	41	6	0	47	3.391	4.957
9 - Treviso	19	4	0	23	11.341	16.626
10 - San Donà di Piave	37	1	0	38	3.640	5.332
12 - Veneziana	8	5	0	13	15.273	23.380
13 - Mirano	6	11	1	18	9.578	13.653
14 - Chioggia	12	2	0	14	6.469	9.313
15 - Cittadella	20	10	1	31	5.096	7.435
16 - Padova	41	0	0	41	6.587	9.718
17 - Este Monselice	12	0	0	12	10.065	14.967
18 - Rovigo	22	2	0	24	4.770	7.143
19 - Adria	15	1	0	16	3.139	4.685
20 - Verona	18	3	1	22	13.591	20.357
21 - Legnago	15	7	4	26	3.737	5.551
22 - Bussolengo	44	18	0	62	2.841	4.158
<b>VENETO</b>	<b>525</b>	<b>105</b>	<b>11</b>	<b>641</b>	<b>4.899</b>	<b>7.243</b>

Elaborazione dei dati Ministeriale forniti dalla Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali – Ufficio Prevenzione Devianze

**Tabella 19 – Distribuzione utenti in carico ed inseriti nei gruppi di auto-mutuo-aiuto. Anno 2003**

Aziende ULSS ed Ospedaliere	Totale utenti in carico	Utenti inseriti in gruppi di Auto-Aiuto	% utenti inseriti nei gruppi
1 - Belluno	549	348	63,4
2 - Feltre	271	60	22,1
3 - Bassano del Grappa	362	158	43,6
4 - Thiene	232	100	43,1
5 - Arzignano	414	81	19,6
6 - Vicenza	300	87	29,0
7 - Pieve Di Soligo	404	152	37,6
8 - Asolo	582	98	16,8
9 - Treviso	576	55	9,5
10 - San Donà di Piave	364	95	26,1
12 Veneziana	128	14	10,9
13 - Mirano	569	260	45,7
14 - Chioggia	270	134	49,6
15 - Cittadella	728	163	22,4
16 - Padova	470	350	74,5
17 - Este Monselice	397	92	23,2
18 - Rovigo	729	78	10,7
19 - Adria	283	89	31,4
20 - Verona	325	156	48,0
21 - Legnago	195	62	31,8
22 - Bussolengo	80	26	32,5
Az. Ospedaliera PD	1.724	95	5,5
Az. Ospedaliera VR	579	350	60,4
<b>Regione VENETO</b>	<b>10.531</b>	<b>3.103</b>	<b>29,5</b>

Elaborazione dei dati Ministeriale forniti dalla Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali – Ufficio Prevenzione Devianze



## **ANALISI DELLA DOMANDA**

---



## ANALISI DELLA DOMANDA SECONDO LE RILEVAZIONI DEL MINISTERO DELLA SALUTE

### ANALISI A LIVELLO REGIONALE

Dalle schede del Ministero della Salute, compilate nell'anno 2003 da 35 Servizi Pubblici per le Tossicodipendenze e l'Alcolologia delle Aziende ULSS e dalle due Aziende Ospedaliere di Padova e Verona, si rileva che gli utenti in carico sono stati complessivamente 10.531 (pari al 20,6% dell'utenza nazionale (51.186)<sup>1</sup>), con un incremento del 7,9% rispetto l'anno 2002.

L'utenza maschile rappresenta il 75% dell'utenza totale, con un rapporto tra maschi e femmine pari a circa 3 a 1, in linea con quello nazionale<sup>1</sup> (3,1/1).

L'età media degli utenti veneti risulta di poco superiore ai 46 anni, leggermente più elevata per l'utenza femminile rispetto quella maschile (46,1 vs 46,9).

La classe di età più rappresentata è 40-49 anni, e il 54% dell'utenza totale ha un'età compresa tra i 40 e i 59 anni, con una percentuale maggiore tra l'utenza femminile rispetto a quella maschile (52,3% vs 58,9%).

I soggetti di età inferiore ai 29 anni rappresentano circa il 9% dell'utenza totale (Italia<sup>1</sup>: 9,9%), con una quota percentuale superiore tra i maschi piuttosto che tra le femmine (9,6% vs 6,1%).

**Tabella 20 – Distribuzione assoluta e percentuale utenti totali, 2003**

	M		F		T	
<b>Soggetti in trattamento</b>	<b>7.898</b>		<b>2.633</b>		<b>10.531</b>	
<b>Distribuzione per sesso</b>	75,0%		25,0%		100%	
<b>Età media</b>	46,1 anni		46,9 anni		46,3 anni	
<b>Distribuzione per età</b>	<b>Freq. Ass.</b>	<b>Freq. %</b>	<b>Freq. Ass.</b>	<b>Freq. %</b>	<b>Freq. Ass.</b>	<b>Freq. %</b>
<b>≤19</b>	32	0,4	8	0,3	40	0,4
<b>20-29</b>	730	9,2	152	5,8	882	8,4
<b>30-39</b>	1.532	19,4	456	17,3	1.988	18,9
<b>40-49</b>	2.099	26,6	848	32,2	2.947	28,0
<b>50-59</b>	2.030	25,7	704	26,7	2.734	26,0
<b>≥ 60</b>	1.475	18,7	465	17,7	1.940	18,4

Elaborazione dei dati Ministeriale forniti dalla Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali – Ufficio Prevenzione Devianze

La maggior parte dei casi (68%) è rappresentata da utenti rientrati o già in carico dagli anni precedenti di cui il 73,6% è costituita da utenza maschile.

<sup>1</sup> Ministero della Salute – Dipartimento della prevenzione e della Comunicazione – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – Relazione del Ministero della Salute al Parlamento sugli interventi realizzati ai sensi della legge 30.3.2001 n. 125 "Legge quadro in materia di alcol e problemi alcolcorrelati" – Dati relativi all'anno 2003 – Roma, 30 dicembre 2004.

L'età media dell'utenza già in carico è di 47,2 anni e per circa il 57% si tratta di utenti di età compresa tra i 40 e i 59 anni: nel collettivo femminile tale classe di età raggiunge il 60,5% vs il 55,4% riscontrato nel collettivo maschile (Tabella 21).

**Tabella 21 – Distribuzione percentuale Utenti Già in Carico, 2003**

	VENETO						ITALIA	
	M		F		T		M	F
<b>Soggetti in trattamento</b>	<b>5.268</b>		<b>1.889</b>		<b>7.157</b>		<b>23.635</b>	<b>8.271</b>
<b>Distribuzione per sesso</b>	73,6%		26,4%		100%		74,1%	25,9%
<b>Età media</b>	47,3 anni		47,0 anni		47,2 anni		45,7 anni	47,9 anni
<b>Distribuzione per età</b>	<b>Freq. Ass.</b>	<b>Freq. %</b>	<b>Freq. Ass.</b>	<b>Freq. %</b>	<b>Freq. Ass.</b>	<b>Freq. %</b>	<b>Freq. %</b>	<b>Freq. %</b>
<b>≤19</b>	14	0,3	5	0,3	19	0,3	0,3	0,2
<b>20-29</b>	336	6,4	96	5,1	432	6,0	7,7	4,6
<b>30-39</b>	933	17,7	330	17,5	1.263	17,6	23,8	19,5
<b>40-49</b>	1.432	27,2	633	33,5	2.065	28,9	29,8	29,4
<b>50-59</b>	1.486	28,2	510	27,0	1.996	27,9	25,1	29,7
<b>≥ 60</b>	1.067	20,3	315	16,7	1.382	19,3	13,4	16,6

Elaborazione dei dati Ministeriale forniti dalla Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali – Ufficio Prevenzione Devianze; Ministero della Salute

L'età media dei nuovi utenti è di poco superiore ai 44 anni e il 47,6% ha un'età compresa tra i 30 e i 49 anni con una percentuale leggermente superiore tra gli uomini (48,2% vs 45,8).

Il 13,9% dei nuovi ingressi, in linea con il dato nazionale (14,3%), ha un'età inferiore a 29 anni, rappresentati per la maggior parte da utenza maschile (15,7% vs 7,9%).

**Tabella 22 – Distribuzione percentuale Nuovi Utenti, 2003**

	VENETO						ITALIA	
	M		F		T		M	F
<b>Soggetti in trattamento</b>	<b>2.630</b>		<b>744</b>		<b>3.374</b>		<b>14.985</b>	<b>4.295</b>
<b>Distribuzione per sesso</b>	77,9%		22,1%		100%		77,7%	22,3%
<b>Età media</b>	43,5 anni		46,9 anni		44,3 anni		43,0 anni	45,9 anni
<b>Distribuzione per età</b>	<b>Freq. Ass.</b>	<b>Freq. %</b>	<b>Freq. Ass.</b>	<b>Freq. %</b>	<b>Freq. Ass.</b>	<b>Freq. %</b>	<b>Freq. %</b>	<b>Freq. %</b>
<b>≤19</b>	18	0,7	3	0,4	21	0,6	1,1	1,1
<b>20-29</b>	394	15,0	56	7,5	450	13,3	14,5	8,5
<b>30-39</b>	599	22,8	126	16,9	725	21,5	26,3	22,1
<b>40-49</b>	667	25,4	215	28,9	882	26,1	26,6	29,5
<b>50-59</b>	544	20,7	194	26,1	738	21,9	19,4	21,6
<b>≥ 60</b>	408	15,5	150	20,2	558	16,5	12,1	17,3

Elaborazione dei dati Ministeriale forniti dalla Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali – Ufficio Prevenzione Devianze; Ministero della Salute

Il tasso di prevalenza regionale, cioè il numero di soggetti in carico ai servizi pubblici ogni 1.000 residenti nella regione Veneto di età compresa tra i 15 e i 64 anni, risulta pari a 2,6.

Per quanto riguarda i nuovi ingressi, il relativo tasso regionale risulta pari a 0,9 ogni 1.000 abitanti di 15-64 anni.

Per oltre il 70% degli utenti veneti il vino rappresenta la bevanda alcolica di uso prevalente, superando di 12,4 punti percentuali la media nazionale (57,9%).

Le altre bevande alcoliche di uso prevalente sono, nell'ordine, la birra (16,9%) e i superalcolici (6,5%), percentuali che rispetto la media nazionale risultano inferiori rispettivamente di 4,3 e 5,9 punti percentuali (Tabella 23).

Rispetto all'anno precedente il consumo di superalcolici è rimasto invariato, il consumo di vino risulta leggermente diminuito, mentre è incrementato l'uso di birra, aperitivi ed amari.

**Tabella 23 – Distribuzione percentuale utenti secondo bevanda alcolica prevalentemente consumata, 2003**

	VENETO				ITALIA		
	MASCHI	FEMMINE	TOTALE	Δ 2003/ 2002	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
<b>Superalcolici</b>	6,7	5,8	6,5	0%	12,6	11,7	12,4
<b>Aperitivi/Amari</b>	4,7	6,4	5,1	6,3%	4,6	5,4	4,8
<b>Vini</b>	70,3	70,3	70,3	-1,1%	57,5	59,3	57,9
<b>Birra</b>	17,5	14,9	16,9	5,0%	21,9	18,5	21,2
<b>Altri</b>	0,7	2,5	1,2	-20,0%	3,4	5,1	3,8

Elaborazione dei dati Ministeriale forniti dalla Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali – Ufficio Prevenzione Devianze; Ministero della Salute

Il 37,3% e il 32,5% degli utenti veneti ha seguito trattamenti rispettivamente di tipo psicoterapeutico e/o di sostegno psicologico (counselling e psicoterapia individuale e/o di gruppo) e di tipo medico-farmacologico in regime ambulatoriale o di ricovero ospedaliero, per la maggior parte dovuto a "sindrome di dipendenza alcolica" (vs. media nazionale pari rispettivamente a 36,2% e 36,6%). Il 15,6% dell'utenza è stato inserito in gruppi di auto-mutuo-aiuto e l'1,7% in comunità terapeutiche di tipo residenziale o semi-residenziale, il 10,6% ha seguito trattamenti di tipo socio-riabilitativo (vs. medie nazionali pari rispettivamente a 11,4%, 2,3% e 12,7%) (Tabella 24-Utenti).

Il 38% dei trattamenti erogati sono di natura psicologico-terapeutica (counselling e psicoterapia individuale e/o familiare) e il 26,3% di natura medico-farmacologico in regime ambulatoriale e/o ospedaliero (Tabella 24-Trattamenti).

**Tabella 24 – Distribuzione percentuale degli utenti e dei trattamenti, 2003**


	UTENTI		TRATTAMENTI
	VENETO	ITALIA	VENETO
Trattamento medico-farmacologico ambulatoriale	24,0	28,5	18,0
Trattamento psicoterapeutico individuale	6,2	7,3	4,5
Trattamento psicoterapeutico di gruppo o familiare	6,5	4,5	11,3
Counselling all'utente o alla famiglia	24,6	24,4	22,2
Inserimento gruppi di auto/mutuo aiuto	15,6	11,4	24,1
Trattamento socio-riabilitativo	10,6	12,7	9,1
Inserimento in Comunità residenziale o semiresidenziale	1,7	2,3	1,1
Ricovero ospedaliero o DH per sindrome di dipend. alcolica	6,6	3,4	7,3
Ricovero ospedaliero o DH per altre patologie alcolcorrelate	1,9	1,5	1,0
Ricovero in casa di cura privata-convenzionata per sindrome di dipendenza alcolica	0,4	1,3	0,2
Ricovero ricovero in casa di cura privata-convenzionata o DH per altre patologie alcolcorrelate	0,1	0,3	0,03
Altro	1,9	1,6	1,0

Elaborazione dei dati Ministeriale forniti dalla Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali – Ufficio Prevenzione Devianze; Ministero della Salute

### ANALISI A LIVELLO DI AZIENDE ULSS ED OSPEDALIERA

L'utenza veneta si distribuisce in modo disomogeneo sul territorio, con un range di valori compresi tra 16,4% e 0,8%, registrati rispettivamente nell'Az. Ospedaliera di Padova e nell'Az. ULSS22-Bussolengo (Grafico 8).

**Grafico 8 – Distribuzione percentuale dell'utenza totale tra le diverse Az. ULSS, 2003**




Elaborazione dei dati Ministeriale forniti dalla Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali – Ufficio Prevenzione Devianze

Dai tassi di prevalenza, calcolati sulla popolazione di 15-64 anni residente al 31/12/2003 sul territorio di ciascuna Azienda ULSS, emerge una notevole variabilità della distribuzione dell'utenza alcolodipendente sul territorio regionale, con un range di valori compreso tra 0,5 e 6,4, registrati rispettivamente nell'Az. ULSS22-Bussolengo e nelle Az. ULSS1-Belluno e 18-Rovigo.

A livello regionale il tasso di prevalenza è pari a 2,6, cioè poco meno di 3 utenti trattati nelle Aziende ULSS per alcolodipendenza e/o problemi alcol-correlati ogni 1.000 abitanti di 15-64 anni (Grafico 9).

**Grafico 9 – Distribuzione tassi di prevalenza x 1.000 abitanti di 15-64 anni, 2003**



Elaborazione dei dati Ministeriale forniti dalla Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali – Ufficio Prevenzione Devianze

Anche il calcolo del rischio relativo (cioè la probabilità di sviluppare una certa patologia o comportamento a rischio rispetto un elemento di confronto) evidenzia gradi di problematicità diversa nella regione Veneto: i territori più critici rispetto al resto della Regione per lo sviluppo di una dipendenza alcolica è più che doppio nelle Az. ULSS18-Rovigo e 1-Belluno (Tabella 25).

**Tabella 25 – Tassi di prevalenza e rischio relativo per Az. ULSS, 2003**

Aziende ULSS	Utenza Totale	Popolazione 15-64 anni al 31/12/2003	Tasso di prevalenza x 1.000	Rischio relativo
1 - Belluno	549	85.314	6,4	2,6
2 - Feltre	271	54.247	5,0	1,9
3 - Bassano del Grappa	362	114.570	3,2	1,2
4 - Thiene	232	120.772	1,9	0,7
5 - Arzignano	414	116.657	3,5	1,4
6 - Vicenza	300	203.354	1,5	0,5
7 - Pieve Di Soligo	404	139.749	2,9	1,1
8 - Asolo	582	159.359	3,7	1,4
9 - Treviso	576	260.840	2,2	0,8
10 - San Donà di Piave	364	138.319	2,6	1,0
12 - Veneziana	128	198.549	0,6	0,2
13 - Mirano	569	172.399	3,3	1,3
14 - Chioggia	270	90.562	3,0	1,1
15 - Cittadella	728	157.982	4,6	1,8
16 - Padova	470	270.048	1,7	0,6
17 - Este Monselice	397	120.776	3,3	1,3
18 - Rovigo	729	114.475	6,4	2,6
19 - Adria	283	50.230	5,6	2,2
20 - Verona	325	299.003	1,1	0,4
21 - Legnago	195	97.154	2,0	0,8
22 - Bussolengo	80	176.150	0,5	0,2
<b>Regione VENETO</b>	<b>8.228</b>	<b>3.140.509</b>	<b>2,6</b>	

Elaborazione dei dati Ministeriale forniti dalla Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali – Ufficio Prevenzione Devianze

In tutte le Aziende, la maggior parte dell'utenza è di sesso maschile con un range di valori compreso tra 61,3% e 85,2%, presenti rispettivamente nell'Az. ULSS16-Padova e 19-Adria, con un conseguente rapporto M/F rispettivamente di 1,6 e 5,7.

**Tabella 26 – Distribuzione assoluta utenza in carico secondo il sesso e variazione percentuale rispetto l'anno 2002**

Aziende ULSS ed Ospedaliere	Anno 2003				Rapporto Maschi/Femmine	Δ % anno 2003-2002
	Maschi	Femmine	Utenti Totale	% utenza maschile		
1 - Belluno	381	168	549	69,4	2,3	6,0
2 - Feltre	202	69	271	74,5	2,9	8,0
3 - Bassano del Grappa	294	68	362	81,2	4,3	-4,2
4 - Thiene	172	60	232	74,1	2,9	16,6
5 - Arzignano	341	73	414	82,4	4,7	5,6
6 - Vicenza	219	81	300	73,0	2,7	12,4
7 - Pieve Di Soligo	315	89	404	78,0	3,5	24,3
8 - Asolo	459	123	582	78,9	3,7	20,5
9 - Treviso	438	138	576	76,0	3,2	0,0
10 - San Donà di Piave	278	86	364	76,4	3,2	-22,4
12 Veneziana	96	32	128	75,0	3,0	16,4
13 - Mirano	414	155	569	72,8	2,7	36,5
14 - Chioggia	213	57	270	78,9	3,7	9,3
15 - Cittadella	559	169	728	76,8	3,3	9,8
16 - Padova	288	182	470	61,3	1,6	34,7
17 - Este Monselice	321	76	397	80,9	4,2	17,5
18 - Rovigo	616	113	729	84,5	5,5	9,0
19 - Adria	241	42	283	85,2	5,7	43,7
20 - Verona	262	63	325	80,6	4,2	-56,3
21 - Legnago	157	38	195	80,5	4,1	18,2
22 - Bussolengo	63	17	80	78,8	3,7	12,7
Az. Ospedaliera PD	1.150	574	1.724	66,7	2,0	17,0
Az. Ospedaliera VR	419	160	579	72,4	2,6	-2,2
<b>Regione VENETO</b>	<b>7.898</b>	<b>2.633</b>	<b>10.531</b>	<b>75,0</b>	<b>3,0</b>	<b>6,4</b>

Elaborazione dei dati Ministeriale forniti dalla Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali – Ufficio Prevenzione Devianze

Oltre la metà dell'utenza totale, nella maggior parte delle Aziende, ad eccezione delle Az. ULSS1-Belluno e 12 Veneziana nelle quali le percentuali maggiori vengono raggiunte dalla nuova utenza, è rappresentata da utenza già in carico o rientrata (Tabella 27).

L'età media dell'utenza totale oscilla da un minimo di 37,5 anni ad un massimo di 49,6 anni, registrate rispettivamente tra gli utenti delle Aziende ULSS16-Padova e 14-Chioggia.

L'utenza in carico all'Az. ULSS16-Padova risulta essere la più giovane per quanto riguarda sia l'utenza già in carico sia quella nuova. Di contro, gli utenti con età media più elevata si ritrovano nelle Az. ULSS14-Chioggia, se si considerano gli utenti già in carico e 2-Feltre, per quanto riguarda i nuovi utenti (Tabella 28).

**Tabella 27 – Distribuzione assoluta e percentuale utenza, 2003**

	UTENTI GIA' IN CARICO			NUOVI UTENTI	
	Totale	% Utenti Totale	Rapporto M/F	Totale	Rapporto M/F
1 - Belluno	236	43,0	2,4	313	2,2
2 - Feltre	167	61,6	2,9	104	3,0
3 - Bassano del Grappa	268	74,0	4,7	94	3,5
4 - Thiene	119	51,3	2,7	113	3,0
5 - Arzignano	300	72,5	4,4	114	5,7
6 - Vicenza	193	64,3	2,2	107	4,1
7 - Pieve Di Soligo	269	66,6	3,0	135	5,1
8 - Asolo	302	51,9	4,0	280	3,4
9 - Treviso	338	58,7	2,9	238	3,6
10 - San Donà di Piave	230	63,2	2,7	134	4,6
12 - Veneziana	56	43,8	3,3	72	2,8
13 - Mirano	407	71,5	2,6	162	3,0
14 - Chioggia	180	66,7	3,4	90	4,6
15 - Cittadella	492	67,6	3,1	236	3,8
16 - Padova	323	68,7	1,4	147	2,0
17 - Este Monselice	272	68,5	4,1	125	4,4
18 - Rovigo	503	69,0	4,6	226	8,8
19 - Adria	194	68,6	4,4	89	13,8
20 - Verona	237	72,9	4,2	88	4,2
21 - Legnago	123	63,1	5,8	72	2,6
22 - Bussolengo	40	50,0	4,7	40	3,0
Az. Ospedaliera PD	1.555	90,2	2,0	169	2,1
Az. Ospedaliera VR	353	61,0	2,1	226	4,0
<b>Regione VENETO</b>	<b>7.157</b>	<b>68,0</b>	<b>2,8</b>	<b>3.374</b>	<b>3,5</b>

Elaborazione dei dati Ministeriale forniti dalla Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali – Ufficio Prevenzione Devianze

**Tabella 28 – Distribuzione età media utenti, 2003**

Aziende ULSS ed Ospedaliere	Utenti Totale	Utenti Già in Carico	Utenti Nuovi
1 - Belluno	47,6	50,0	45,9
2 - Feltre	48,6	48,7	48,3
3 - Bassano del Grappa	47,0	47,9	44,3
4 - Thiene	45,6	45,1	46,2
5 - Arzignano	46,8	48,0	43,7
6 - Vicenza	45,5	47,4	42,2
7 - Pieve Di Soligo	48,1	49,9	44,6
8 - Asolo	47,0	48,0	45,8
9 - Treviso	48,3	49,0	47,2
10 - San Donà di Piave	47,3	48,7	45,0
12 - Veneziana	45,4	44,9	45,9
13 - Mirano	49,1	49,2	48,8
14 - Chioggia	49,6	51,5	45,8
15 - Cittadella	48,1	50,2	43,7
16 - Padova	38,1	37,5	39,6
17 - Este Monselice	47,7	49,5	43,7
18 - Rovigo	43,4	46,3	36,9
19 - Adria	44,4	46,4	40,1
20 - Verona	49,1	50,2	46,0
21 - Legnago	45,6	45,8	45,1
22 - Bussolengo	43,6	44,3	43,0
Az. Ospedaliera PD	45,7	45,9	44,1
Az. Ospedaliera VR	44,0	44,5	43,1
<b>Regione VENETO</b>	<b>46,3</b>	<b>47,2</b>	<b>44,3</b>

Elaborazione dei dati Ministeriale forniti dalla Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali – Ufficio Prevenzione Devianze

Nella maggior parte delle Aziende, l'utenza femminile, sia già in carico sia nuova, risulta di età media superiore a quella maschile (Tabella 29).

**Tabella 29 – Distribuzione età media utenti, 2003**

Az, ULSS ed Ospedaliere	Utenti totale		Utenti Già in Carico		Nuovi utenti	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
1 - Belluno	47,4	48,3	50,2	49,5	45,2	47,5
2 - Feltre	48,0	50,1	47,7	51,7	48,6	47,5
3 - Bassano del Grappa	46,8	47,6	47,9	48,0	43,5	46,8
4 - Thiene	44,5	48,9	44,1	47,7	44,9	50,2
5 - Arzignano	46,2	49,5	47,6	49,7	42,7	49,0
6 - Vicenza	44,9	47,4	47,5	47,2	40,8	48,0
7 - Pieve Di Soligo	47,6	50,1	49,5	51,2	44,1	46,8
8 - Asolo	46,8	47,4	48,2	47,3	45,3	47,5
9 - Treviso	47,8	49,9	48,5	50,7	46,8	48,7
10 - San Donà di Piave	46,8	49,0	48,3	49,7	44,5	47,3
12 - Veneziana	45,5	45,3	44,7	45,7	46,2	45,1
13 - Mirano	48,9	49,4	49,2	49,2	48,4	50,0
14 - Chioggia	49,3	50,7	51,7	50,7	44,8	50,7
15 - Cittadella	47,9	48,8	50,5	49,3	42,7	47,4
16 - Padova	37,7	38,8	37,7	37,1	37,7	43,3
17 - Este Monselice	46,8	51,5	48,8	52,6	42,4	49,0
18 - Rovigo	42,8	46,5	46,0	48,1	36,4	40,6
19 - Adria	43,4	50,6	45,3	51,1	39,6	48,0
20 - Verona	49,1	49,2	50,2	50,6	46,1	45,5
21 - Legnago	44,9	48,4	45,2	49,9	44,4	47,1
22 - Bussolengo	43,7	43,4	44,3	44,5	43,1	42,6
Az. Ospedaliera PD	46,3	44,5	46,5	44,5	44,1	44,1
Az. Ospedaliera VR	43,5	45,1	44,5	44,6	42,3	46,1
<b>Regione VENETO</b>	<b>46,1</b>	<b>46,9</b>	<b>47,3</b>	<b>47,0</b>	<b>43,5</b>	<b>46,9</b>

Elaborazione dei dati Ministeriale forniti dalla Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali – Ufficio Prevenzione Devianze

Ad eccezione delle Az. ULSS16-Padova, 18-Rovigo e 22-Bussolengo, nelle quali la classe di età modale è 30-39 anni, nelle altre Aziende la classe di età maggiormente rappresentativa oscilla tra 40-49 anni e 50-59 anni (Tabella 30).

Tra l'utenza sia maschile sia femminile di tutte le Aziende, la bevanda alcolica di uso prevalente risulta il vino (Tabella 31, 32). Da sottolineare che il numero di utenti secondo la variabile bevanda alcolica non coincide con quello rilevato secondo le classi di età (ALC 01): i valori percentuali presenti nella Tabella 31 sono stati calcolati sui valori assoluti riportati nella scheda ALC 03.

**Tabella 30 – Distribuzione UTENTI per classi di età, 2003**

<b>Aziende ULSS ed Ospedaliere</b>	<b>≤19</b>	<b>20-29</b>	<b>30-39</b>	<b>40-49</b>	<b>50-59</b>	<b>≥60</b>	<b>TOTALI</b>
1 - Belluno	0,0	4,6	17,1	30,4	30,1	17,9	<b>549</b>
2 - Feltre	0,4	4,4	14,0	28,4	31,4	21,4	<b>271</b>
3 - Bassano del Grappa	0,0	9,1	14,9	29,6	26,0	20,4	<b>362</b>
4 - Thiene	0,4	8,6	18,5	33,2	22,8	16,4	<b>232</b>
5 - Arzignano	0,0	6,8	19,8	27,8	26,3	19,3	<b>414</b>
6 - Vicenza	0,0	5,3	25,3	31,3	22,7	15,3	<b>300</b>
7 - Pieve Di Soligo	0,2	5,0	16,3	27,5	29,0	22,0	<b>404</b>
8 - Asolo	1,0	7,4	18,0	25,4	26,5	21,6	<b>582</b>
9 - Treviso	0,5	5,7	16,5	23,6	29,2	24,5	<b>576</b>
10 - San Donà di Piave	0,3	7,1	16,8	27,2	27,7	20,9	<b>364</b>
12 - Veneziana	0,0	2,3	22,7	43,0	23,4	8,6	<b>128</b>
13 - Mirano	0,0	4,4	15,1	26,2	26,5	27,8	<b>569</b>
14 - Chioggia	0,0	5,2	10,7	26,7	30,7	26,7	<b>270</b>
15 - Cittadella	0,3	7,7	14,6	25,5	25,3	26,6	<b>728</b>
16 - Padova	3,2	22,1	24,5	37,9	10,9	1,5	<b>470</b>
17 - Este Monselice	0,5	6,3	18,4	23,9	27,2	23,7	<b>397</b>
18 - Rovigo	0,4	17,4	21,7	23,0	20,9	16,6	<b>729</b>
19 - Adria	1,8	13,8	19,8	24,7	19,4	20,5	<b>283</b>
20 - Verona	0,0	4,9	13,8	25,5	30,5	25,2	<b>325</b>
21 - Legnago	0,0	8,2	19,5	32,3	27,7	12,3	<b>195</b>
22 - Bussolengo	0,0	15,0	21,3	30,0	17,5	16,3	<b>80</b>
Az. Ospedaliera PD	0,0	7,1	22,5	28,8	29,2	12,5	<b>1.724</b>
Az. Ospedaliera VR	0,0	11,6	23,1	30,6	23,5	11,2	<b>579</b>
<b>Regione VENETO</b>	<b>0,4</b>	<b>8,4</b>	<b>18,9</b>	<b>28,0</b>	<b>26,0</b>	<b>18,4</b>	<b>10.531</b>

Elaborazione dei dati Ministeriale forniti dalla Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali – Ufficio Prevenzione Devianze

**Tabella 31 – Distribuzione utenti secondo la bevanda d’uso prevalente, 2003**

<b>Aziende ULSS ed Ospedaliere</b>	<b>Super alcolici</b>	<b>Aperitivi/ Amari</b>	<b>Vini</b>	<b>Birra</b>	<b>Altro</b>	<b>TOTALI</b>
1 - Belluno	10,7	3,8	65,4	20,0	0,0	<b>549</b>
2 - Feltre	4,8	0,0	80,4	14,8	0,0	<b>271</b>
3 - Bassano del Grappa	6,2	16,6	57,1	20,1	0,0	<b>259</b>
4 - Thiene	2,6	2,2	75,9	19,4	0,0	<b>232</b>
5 - Arzignano	1,8	0,5	61,4	22,3	14,1	<b>220</b>
6 - Vicenza	2,3	0,0	77,7	19,3	0,7	<b>300</b>
7 - Pieve Di Soligo	14,9	3,5	68,6	13,1	0,0	<b>404</b>
8 - Asolo	3,1	0,0	77,0	19,9	0,0	<b>256</b>
9 - Treviso	4,8	7,9	61,6	25,6	0,0	<b>558</b>
10 - San Donà di Piave	6,3	0,6	87,1	6,1	0,0	<b>363</b>
12 - Veneziana	7,0	1,6	86,7	3,1	1,6	<b>128</b>
13 - Mirano	9,2	13,3	50,4	21,3	5,8	<b>705</b>
14 - Chioggia	2,6	6,7	75,2	15,2	0,4	<b>270</b>
15 - Cittadella	8,8	3,5	72,8	14,9	0,0	<b>773</b>
16 - Padova	0,9	0,0	96,6	2,6	0,0	<b>470</b>
17 - Este Monselice	9,6	5,3	62,2	22,9	0,0	<b>397</b>
18 - Rovigo	1,8	6,6	77,4	14,2	0,0	<b>730</b>
19 - Adria	---	---	---	---	---	<b>---</b>
20 - Verona	3,1	0,9	82,8	13,2	0,0	<b>325</b>
21 - Legnago	2,1	0,5	73,8	23,6	0,0	<b>195</b>
22 - Bussolengo	7,5	5,0	61,3	26,3	0,0	<b>80</b>
Az. Ospedaliera PD	18,0	15,6	45,2	21,2	0,0	<b>250</b>
Az. Ospedaliera VR	11,1	9,7	54,9	17,7	6,6	<b>226</b>
<b>Regione VENETO</b>	<b>6,5</b>	<b>5,1</b>	<b>70,3</b>	<b>16,9</b>	<b>1,2</b>	<b>7.961</b>

Elaborazione dei dati Ministeriale forniti dalla Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali – Ufficio Prevenzione Devianze

**Tabella 32 – Distribuzione utenti secondo il genere e la bevanda d'uso prevalente, 2003**

Aziende ULSS ed Ospedaliere	MASCHI					TOTALI
	Super alcolici	Aperitivi/ Amari	Vini	Birra	Altro	
1 - Belluno	8,9	3,7	64,2	23,2	0,0	<b>405</b>
2 - Feltre	5,0	0,0	78,7	16,3	0,0	<b>202</b>
3 - Bassano del Grappa	6,0	9,0	64,5	20,5	0,0	<b>200</b>
4 - Thiene	2,9	1,7	76,7	18,6	0,0	<b>172</b>
5 - Arzignano	1,1	0,6	59,8	22,3	16,2	<b>179</b>
6 - Vicenza	1,7	0,0	77,1	20,3	0,8	<b>236</b>
7 - Pieve Di Soligo	17,5	2,9	64,8	14,9	0,0	<b>315</b>
8 - Asolo	3,0	0,0	77,4	19,6	0,0	<b>199</b>
9 - Treviso	5,1	8,6	62,1	24,2	0,0	<b>451</b>
10 - San Donà di Piave	5,4	0,7	87,4	6,5	0,0	<b>277</b>
12 - Veneziana	6,3	1,0	89,6	2,1	1,0	<b>96</b>
13 - Mirano	9,6	15,0	52,6	22,8	0,0	<b>479</b>
14 - Chioggia	3,3	8,5	71,4	16,4	0,5	<b>213</b>
15 - Cittadella	10,4	3,2	72,1	14,3	0,0	<b>594</b>
16 - Padova	0,7	0,0	96,9	2,4	0,0	<b>288</b>
17 - Este Monselice	10,0	5,0	59,9	25,1	0,0	<b>299</b>
18 - Rovigo	2,0	6,5	76,9	14,7	0,0	<b>614</b>
19 - Adria	---	---	---	---	---	<b>---</b>
20 - Verona	2,7	1,1	84,0	12,2	0,0	<b>263</b>
21 - Legnago	2,5	0,6	71,3	25,5	0,0	<b>157</b>
22 - Bussolengo	7,9	6,3	58,7	27,0	0,0	<b>63</b>
Az. Ospedaliera PD	22,4	6,1	51,5	20,0	0,0	<b>165</b>
Az. Ospedaliera VR	10,9	8,7	56,8	17,5	6,0	<b>183</b>
<b>Regione VENETO</b>	<b>6,7</b>	<b>4,7</b>	<b>70,3</b>	<b>17,5</b>	<b>0,7</b>	<b>6.050</b>
	<b>FEMMINE</b>					
1 - Belluno	16,0	4,2	68,8	11,1	0,0	<b>144</b>
2 - Feltre	4,3	0,0	85,5	10,1	0,0	<b>69</b>
3 - Bassano del Grappa	6,8	42,4	32,2	18,6	0,0	<b>59</b>
4 - Thiene	1,7	3,3	73,3	21,7	0,0	<b>60</b>
5 - Arzignano	4,9	0,0	68,3	22,0	4,9	<b>41</b>
6 - Vicenza	4,7	0,0	79,7	15,6	0,0	<b>64</b>
7 - Pieve Di Soligo	5,6	5,6	82,0	6,7	0,0	<b>89</b>
8 - Asolo	3,5	0,0	75,4	21,1	0,0	<b>57</b>
9 - Treviso	3,7	4,7	59,8	31,8	0,0	<b>107</b>
10 - San Donà di Piave	9,3	0,0	86,0	4,7	0,0	<b>86</b>
12 - Veneziana	9,4	3,1	78,1	6,3	3,1	<b>32</b>
13 - Mirano	8,4	9,7	45,6	18,1	18,1	<b>226</b>
14 - Chioggia	0,0	0,0	89,5	10,5	0,0	<b>57</b>
15 - Cittadella	3,4	4,5	75,4	16,8	0,0	<b>179</b>
16 - Padova	1,1	0,0	96,2	2,7	0,0	<b>182</b>
17 - Este Monselice	8,2	6,1	69,4	16,3	0,0	<b>98</b>
18 - Rovigo	0,9	6,9	80,2	12,1	0,0	<b>116</b>
19 - Adria	---	---	---	---	---	<b>---</b>
20 - Verona	4,8	0,0	77,4	17,7	0,0	<b>62</b>
21 - Legnago	0,0	0,0	84,2	15,8	0,0	<b>38</b>
22 - Bussolengo	5,9	0,0	70,6	23,5	0,0	<b>17</b>
Az. Ospedaliera PD	9,4	34,1	32,9	23,5	0,0	<b>85</b>
Az. Ospedaliera VR	11,6	14,0	46,5	18,6	9,3	<b>43</b>
<b>Regione VENETO</b>	<b>5,8</b>	<b>6,4</b>	<b>70,3</b>	<b>14,9</b>	<b>2,5</b>	<b>1.911</b>

Elaborazione dei dati Ministeriale forniti dalla Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali – Ufficio Prevenzione Devianze

Considerando i singoli trattamenti, all'interno di ogni gruppo, si osserva una forte variabilità tra le diverse Az. ULSS.

Si nota l' Az. ULSS17-Monselice per l'elevata percentuale di trattamenti medico-farmacologici erogati in regime ambulatoriale e l' Az. ULSS9-Treviso per i ricoveri, ospedalieri o in case di cura convenzionate, praticati per sindrome da dipendenza alcolica o per patologie alcol-correlate.

Anche le Az. ULSS2-Feltre e 22-Bussolengo si differenziano per l'elevata percentuale di trattamenti di sostegno psicologico e psicoterapeutico individuale e/o di gruppo erogati agli utenti in carico.

L'Azienda Ospedaliera di Padova si distingue nettamente dalle altre Aziende per l'elevata percentuale di inserimenti di utenti in gruppi di auto-mutuo aiuto, mentre il trattamento socio-riabilitativo presenta la percentuale più alta in corrispondenza dell' Az. ULSS5 - Arzignano.

Infine, nell'Azienda ULSS8-Asolo il 22,4% dei trattamenti riguarda gli inserimenti in Comunità Terapeutiche residenziali o semi-residenziali, mentre la media regionale è pari all'1,2% (Tabella 33).

**Tabella 33 – Distribuzione trattamenti, 2003**

Az. ULSS ed Ospedaliera	Medico farmacologico in regime ambulatoriale	Ricovero	Sostegno terapeutico individuale e/o di gruppo + counselling	Inserimento gruppi di auto/mutuo aiuto	Trattamento socio-riabilitativo	Inserimento in CT residuo semires	TOTALI
1 - Belluno	17,3	12,5	43,0	14,6	12,2	0,5	<b>2.388</b>
2 - Feltre	13,7	4,8	75,6	2,8	2,4	0,7	<b>1.447</b>
3 - Bassano del Grappa	17,8	4,3	34,0	14,9	28,3	0,7	<b>1.058</b>
4 - Thiene	34,0	19,0	15,7	16,8	12,4	2,1	<b>606</b>
5 - Arzignano	21,6	1,4	41,4	1,8	33,5	0,2	<b>4.467</b>
6 - Vicenza	13,8	6,3	50,5	19,4	5,0	5,0	<b>479</b>
7 - Pieve Di Soligo	17,0	7,6	42,4	31,1	0,0	1,8	<b>488</b>
8 - Asolo	21,7	0,0	19,4	32,8	3,7	22,4	<b>299</b>
9 - Treviso	13,3	35,2	42,6	1,4	7,5	0,1	<b>4.036</b>
10 - San Donà di Piave	36,8	1,6	46,4	11,3	2,5	1,3	<b>864</b>
12 - Veneziana	23,1	2,6	45,6	4,6	21,2	2,9	<b>307</b>
13 - Mirano	31,4	3,9	43,6	17,0	3,2	0,9	<b>1.629</b>
14 - Chioggia	31,1	0,6	44,6	21,6	0,5	1,6	<b>621</b>
15 - Cittadella	18,2	3,0	49,4	25,2	3,3	0,9	<b>2.440</b>
16 - Padova	18,1	1,0	54,4	13,5	10,8	2,2	<b>2.591</b>
17 - Este Monselice	52,7	0,2	25,3	14,6	4,9	2,2	<b>628</b>
18 - Rovigo	24,8	1,5	51,4	20,1	0,0	2,2	<b>407</b>
19 - Adria	14,6	0,4	64,2	17,5	1,7	1,6	<b>707</b>
20 - Verona	19,1	4,3	11,3	33,2	30,6	1,5	<b>470</b>
21 - Legnago	18,5	7,1	39,1	11,0	22,4	1,8	<b>562</b>
22 - Bussolengo	10,2	1,7	71,3	6,2	7,8	2,8	<b>422</b>
Az. Ospedaliera PD	9,5	1,1	20,8	67,4	1,3	0,0	<b>6.668</b>
Az. Ospedaliera VR	19,5	9,4	30,2	35,3	3,5	2,0	<b>5.941</b>
<b>Regione VENETO</b>	<b>18,4</b>	<b>7,5</b>	<b>38,9</b>	<b>24,7</b>	<b>9,3</b>	<b>1,2</b>	<b>39.525</b>

Elaborazione dei dati Ministeriale forniti dalla Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali – Ufficio Prevenzione Devianze



**RICOVERI OSPEDALIERI PER PATOLOGIE  
ALCOL-CORRELATE**

---



### I RICOVERI OSPEDALIERI PER PATOLOGIE ALCOL-CORRELATE

In questa parte del rapporto, si riportano le analisi relative ai ricoveri avvenuti nel corso dell'anno 2003 nelle strutture ospedaliere della Regione Veneto e registrati nelle schede di dimissione ospedaliera con diagnosi (principali e/o concomitanti) attribuibili al consumo di alcol.

Le diagnosi di ricovero considerate per l'analisi, secondo le indicazioni del Ministero della Salute, sono sia quelle totalmente legate al consumo di alcol che quelle ad eziologia multifattoriale (Tabella 34). Le schede di dimissione

**Tabella 34 – Diagnosi attribuibili al consumo di alcol**

<b>a) Diagnosi di ricovero totalmente attribuibili all'alcol</b>	<b>Codici ICD-9 CM</b>
Psicosi da alcol	291
Sindrome di dipendenza da alcol	303
Abuso di alcol senza dipendenza	305.0
Polineuropatia alcolica	357.5
Cardiomiopatia alcolica	425.5
Gastrite alcolica	535.3
Alcolemia elevata	790.3
Effetti tossici da alcol etilico	980.0

---

<b>b) Diagnosi di ricovero ad etiologia multifattoriale per le quali esistono solide evidenze di un rapporto di causalità con l'alcol</b>	
Tumori maligni del cavo orale e faringe	140-149
Tumori maligni dell'esofago	150
Tumori maligni del fegato e dei dotti biliari	155
Tumori maligni della laringe	161
Ipertensione essenziale	401
Steatosi, epatite e cirrosi alcolica	571.0-3
Altre malattie epatiche croniche o cirrosi senza menzione di alcol	571.5-6, 8-9
Coma epatico ed ipertensione portale	572.2-3

Nelle strutture ospedaliere del Veneto, nell'anno 2003, sono avvenuti 79.440 ricoveri alcol-correlati, con un decremento, rispetto l'anno 2002, del 12,6% (vs 89.485)<sup>1</sup>. I ricoveri alcol-correlati hanno rappresentato l'8,3% del totale regionale dei ricoveri ospedalieri avvenuti per tutte le cause nel corso dell'anno 2003.

Su 79.440 ricoveri è possibile identificare 60.902 soggetti, con un rapporto tra numero di ricoveri e numero di soggetti pari a 1,3.

---

<sup>1</sup> Il rapporto "Monitoraggio dei dati sull'abuso di alcol e problemi alcol-correlati nella Regione Veneto – Anni 2001 - 2002 è scaricabile dai siti: [www.venetosociale.org](http://www.venetosociale.org), sezione Dipendenze-Documenti, e [www.veneto.dronet.org](http://www.veneto.dronet.org), sezione Epidemiologia

### **LE DIMISSIONI OSPEDALIERE CON DIAGNOSI PRINCIPALE ATTRIBUIBILE AL CONSUMO DI ALCOL**

I ricoveri per i quali è stata riportata come diagnosi principale una di quelle sopra elencate (Tab.34-a)), sono stati 16.763, ovvero il 21% del totale dei ricoveri alcol-correlati, con un decremento, rispetto l'anno 2002, del 5,6% (vs 17.763).

I ricoveri con diagnosi principale totalmente attribuibile al consumo di alcol sono stati 2.802 (pari al 16,7% dei ricoveri con diagnosi principale alcol-correlata), il 75,8% dei quali dovuto a "Sindrome di dipendenza alcolica" (Ricoveri maschili=76,6%; Ricoveri a soggetti femminili=74,1%).

Per quanto riguarda le schede con diagnosi ad eziologia multifattoriale, il 34,5% dei ricoveri fa riferimento a "Steatosi, epatite e cirrosi alcolica", in pazienti sia maschi (32,7%) che femmine (38,3%). Tra queste ultime, inoltre, il 25,6% dei ricoveri è attribuibile a "Ipertensione essenziale" (n=1.153), mentre nei pazienti maschi il 22,9% dei ricoveri è dovuto a "Tumori maligni del fegato e dei dotti biliari" (n=2.169).

Il rapporto tra i ricoveri effettuati a pazienti maschi e femmine è pari a 2,1 se si considerano i ricoveri complessivi, mentre risulta pari a 2,4 se si considera solo il sottogruppo di diagnosi direttamente correlate all'uso di alcol.

Sono 6.302 le schede che riportano in diagnosi principale l'indicazione di una patologia di tipo tumorale, il 79% delle quali riferite a soggetti di genere maschile.

Il 59,8% e il 52,2% dei ricoveri con diagnosi totalmente attribuibile al consumo di alcol è stato effettuato a pazienti di 15-34 anni rispettivamente maschi e femmine.

Il 92,3% e il 92,4% delle SDO riferite a ricoveri effettuati a soggetti rispettivamente maschi e femmine di oltre 54 anni sono attribuibili a diagnosi ad eziologia multifattoriale (Tabella 35).

### **LE DIMISSIONI OSPEDALIERE CON DIAGNOSI PRINCIPALE O SECONDARIA ATTRIBUIBILE AL CONSUMO DI ALCOL**

I ricoveri con diagnosi principale e secondaria alcol-correlata sono stati 79.440.

La diagnosi "Sindrome di dipendenza da alcol" è, anche in questo caso, quella maggiormente rappresentativa, pari al 70,3% dei ricoveri alcol correlati totalmente attribuibili all'uso di alcol (Ricoveri maschili=71,4%; Ricoveri femminili=70,3%).

La distribuzione delle diagnosi nelle schede considerate evidenzia una quota consistente, pari al 67,4% del totale, di ricoveri per "Ipertensione essenziale" (n=53.560), equamente suddivisa tra maschi e femmine.

Altra diagnosi frequente è "Steatosi, epatite e cirrosi alcolica", con 3.468 eventi di ricovero riferiti a femmine e 6.370 riferiti a maschi, per un totale di 9.836 ricoveri (12,4% del totale). Patologie tumorali sono presenti in 9.517 schede, pari al 12% del totale e con un rapporto interno schede maschili/schede femminili uguale a 3,8.

Il rapporto tra le schede totali riferite a maschi e le schede riferite a femmine è di 1,2; sul totale dei ricoveri quindi la quota riferita alle femmine non è proporzionalmente molto inferiore alla quota maschile come poteva apparire considerando solo i ricoveri con diagnosi principale alcol correlata.

Anche nel considerare i ricoveri con diagnosi principale o secondaria attribuibile al consumo di alcol, si rileva che le diagnosi totalmente attribuibili all'alcol sono relative principalmente a ricoveri di soggetti in fascia di età 15-34 anni, mentre le diagnosi ad eziologia multifattoriale sono più presenti nei ricoveri di soggetti di oltre 54 anni (Tabella 36).

**Tabella 35 - Distribuzione percentuale ed assoluta dei ricoveri "alcol-correlati" per tipologia di diagnosi principale, classi di età e genere, 2003**

	MASCHI					FEMMINE				
	≤ 14 anni %	15-34 anni %	35-54 anni %	≥55 anni %	TOTALE (n)	≤ 14 anni %	15-34 anni %	35-54 anni %	≥55 anni %	TOTALE (n)
<b>Diagnosi di ricovero totalmente attribuibili all'alcol (totale assoluto)</b>	<b>11,2</b>	<b>59,8</b>	<b>35,7</b>	<b>7,7</b>	<b>1.977</b>	<b>16,7</b>	<b>52,2</b>	<b>36,5</b>	<b>7,6</b>	<b>825</b>
Psicosi da alcol	-	4,8	3,7	1,2	<b>224</b>	-	4,4	3,3	0,8	<b>76</b>
Sindrome di dipendenza da alcol	-	46,7	28,1	5,6	<b>1.514</b>	-	35,4	28,2	5,6	<b>611</b>
Abuso di alcol senza dipendenza	7,5	8,0	3,2	0,5	<b>178</b>	16,7	11,3	3,7	0,7	<b>99</b>
Polineuropatia alcolica	-	0,3	0,5	0,2	<b>31</b>	-	-	1,1	0,1	<b>19</b>
Cardiomiopatia alcolica	-	-	0,1	0,1	<b>11</b>	-	-	-	0,0	<b>1</b>
Gastrite alcolica	-	-	0,1	0,1	<b>13</b>	-	1,1	0,1	0,4	<b>17</b>
Alcolemia elevata	-	-	0,0	0,0	<b>2</b>	-	-	-	0,0	<b>1</b>
Effetti tossici da alcol etilico	3,7	-	-	0,0	<b>4</b>	-	-	0,1	-	<b>1</b>
<b>Diagnosi di ricovero ad etiologia multifattoriale per le quali esistono solide evidenze di un rapporto di causalità con l'alcol (totale assoluto)</b>	<b>88,9</b>	<b>40,2</b>	<b>64,3</b>	<b>92,3</b>	<b>9.464</b>	<b>83,3</b>	<b>47,8</b>	<b>63,5</b>	<b>92,4</b>	<b>4.497</b>
Tumori maligni del cavo orale e faringe	3,7	3,0	9,3	12,5	<b>1.287</b>	8,3	7,4	5,8	7,7	<b>388</b>
Tumori maligni dell' esofago	-	0,2	2,3	6,5	<b>589</b>	-	0,5	1,7	3,8	<b>172</b>
Tumori maligni del fegato e dei dotti biliari	40,7	2,2	5,5	25,0	<b>2.169</b>	-	6,5	3,1	16,1	<b>682</b>
Tumori maligni della laringe	3,7	-	4,4	10,2	<b>933</b>	-	-	1,5	1,6	<b>82</b>
Iperensione essenziale	22,2	19,1	10,6	5,7	<b>867</b>	25,0	21,7	21,8	21,6	<b>1.153</b>
Steatosi, epatite e cirrosi alcolica	7,5	14,1	28,6	27,3	<b>3.097</b>	4,2	8,3	26,1	35,6	<b>1.723</b>
Coma epatico ed ipertensione portale	-	0,2	0,5	0,3	<b>41</b>	-	-	1,1	0,7	<b>41</b>
Altre malattie epatiche croniche o cirrosi senza menzione di alcol	11,1	1,3	3,1	4,8	<b>481</b>	45,8	3,4	2,4	5,3	<b>256</b>
<b>TOTALE (valore assoluto)</b>	<b>27</b>	<b>460</b>	<b>3.062</b>	<b>7.892</b>	<b>11.441</b>	<b>24</b>	<b>203</b>	<b>1.131</b>	<b>3.964</b>	<b>5.322</b>

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati della Regione Veneto – Direzione Risorse Socio-Sanitarie – Servizio sistema informativo socio-sanitario e tecnologie informatiche

**Tabella 36 - Distribuzione percentuale ed assoluta dei ricoveri "alcol-correlati" per tipologia di diagnosi principale o secondaria, classi di età e genere, 2003**

	MASCHI					FEMMINE				
	≤ 14 anni %	15-34 anni %	35-54 anni %	≥55 anni %	TOTALE (n)	≤ 14 anni %	15-34 anni %	35-54 anni %	≥55 anni %	TOTALE (n)
<b>Diagnosi di ricovero totalmente attribuibili all'alcol (totale assoluto)</b>	<b>3,9</b>	<b>52,8</b>	<b>22,3</b>	<b>3,6</b>	<b>3.278</b>	<b>10,0</b>	<b>42,7</b>	<b>19,0</b>	<b>1,7</b>	<b>1.331</b>
Psicosi da alcol	-	3,4	2,1	0,3	<b>337</b>	-	2,9	1,3	0,2	<b>110</b>
Sindrome di dipendenza da alcol	-	37,1	16,7	2,1	<b>2.341</b>	-	24,3	14,0	1,1	<b>900</b>
Abuso di alcol senza dipendenza	2,6	11,5	2,9	0,3	<b>409</b>	10,0	13,8	3,0	0,2	<b>230</b>
Polineuropatia alcolica	-	0,2	0,4	0,2	<b>87</b>	-	-	0,5	0,1	<b>32</b>
Cardiomiopatia alcolica	-	-	0,1	0,1	<b>56</b>	-	-	-	0,0	<b>2</b>
Gastrite alcolica	-	0,1	0,1	0,1	<b>34</b>	-	1,2	0,1	0,1	<b>52</b>
Alcolemia elevata	-	0,2	0,0	0,0	<b>6</b>	-	-	-	0,0	<b>1</b>
Effetti tossici da alcol etilico	1,3	0,3	0,0	0,0	<b>8</b>	-	0,5	0,1	-	<b>4</b>
<b>Diagnosi di ricovero ad etiologia multifattoriale per le quali esistono solide evidenze di un rapporto di causalità con l'alcol (totale assoluto)</b>	<b>96,1</b>	<b>47,2</b>	<b>77,7</b>	<b>96,4</b>	<b>40.953</b>	<b>90,0</b>	<b>57,3</b>	<b>81,0</b>	<b>98,3</b>	<b>33.248</b>
Tumori maligni del cavo orale e faringe	23,3	2,6	7,7	4,6	<b>2.278</b>	7,5	3,6	3,7	1,5	<b>608</b>
Tumori maligni dell' esofago	-	0,5	2,2	2,7	<b>1.141</b>	-	0,2	1,4	0,8	<b>309</b>
Tumori maligni del fegato e dei dotti biliari	31,2	1,4	3,2	7,2	<b>2.888</b>	5,0	4,8	2,0	2,7	<b>937</b>
Tumori maligni della laringe	1,3	-	2,3	3,0	<b>1.238</b>	-	-	0,7	0,3	<b>1.18</b>
Ipertensione essenziale	23,4	27,1	39,8	64,2	<b>26.265</b>	35,0	38,9	56,2	82,3	<b>27.295</b>
Steatosi, epatite e cirrosi alcolica	5,2	13,6	20,3	13,2	<b>6.370</b>	5,0	6,7	15,1	9,3	<b>3.468</b>
Coma epatico ed ipertensione portale	-	0,2	0,4	0,1	<b>80</b>	-	-	0,5	0,2	<b>77</b>
Altre malattie epatiche croniche o cirrosi senza menzione di alcol	11,7	1,8	1,8	1,4	<b>693</b>	37,5	3,1	1,6	1,1	<b>436</b>
<b>TOTALE (valore assoluto)</b>	<b>77</b>	<b>885</b>	<b>7.412</b>	<b>35.857</b>	<b>44.231</b>	<b>40</b>	<b>419</b>	<b>3.309</b>	<b>31.441</b>	<b>35.209</b>

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche Elaborazione su dati della Regione Veneto – Direzione Risorse Socio-Sanitarie – Servizio sistema informativo socio-sanitario e tecnologie informatiche

## I ricoveri ospedalieri per patologie alcol-correlate

L'analisi dei ricoveri "alcol-correlati" sulla base dell'Azienda ULSS di ricovero rileva che le quote percentuali più elevate di ospedalizzazioni, si registrano nell'Az. ULSS9-Treviso (10,4%), seguita dall'Az. Ospedaliera di Verona (8,7%) e dall'Azienda ULSS 12 Veneziana (8,2%).

Nelle Aziende ULSS16-Padova, 9-Treviso e 1-Belluno si effettua il maggior numero di ricoveri con diagnosi totalmente attribuibili al consumo di alcol (Tabella 37).

**Tabella 37 - Distribuzione percentuale dei ricoveri "alcol-correlati" per Az. ULSS o Az. Ospedaliera di ricovero. Anno 2003**

Az. ULSS ed Az. Ospedaliere	Ricoveri con diagnosi totalmente attribuibili		Ricoveri con diagnosi multifattoriale		TOTALE	
	n.	%	n.	%	n.	%
1 - Belluno	368	8,0	1.769	2,4	2.137	2,7
2 - Feltre	139	3,0	1.232	1,6	1.371	1,7
3 - Bassano Del Grappa	107	2,3	1.535	2,1	1.642	2,1
4 - Thiene	122	2,6	981	1,3	1.103	1,4
5 - Arzignano	137	3,0	1.778	2,4	1.915	2,4
6 - Vicenza	344	7,5	4.626	6,2	4.970	6,3
7 - Pieve Di Soligo	178	3,9	3.638	4,9	3.816	4,8
8 - Asolo	146	3,2	3.549	4,7	3.695	4,7
9 - Treviso	397	8,6	7.882	10,5	8.279	10,4
10 - San Donà Di Piave	107	2,3	2.974	4,0	3.081	3,9
12 Veneziana	356	7,7	6.121	8,2	6.477	8,2
13 - Mirano	262	5,7	3.880	5,2	4.142	5,2
14 - Chioggia	91	2,0	1.823	2,4	1.914	2,4
15 - Cittadella	175	3,8	3.958	5,3	4.133	5,2
16 - Padova	453	9,8	2.415	3,2	2.868	3,6
17 - Este - Monselice	85	1,8	3.013	4,0	3.098	3,9
18 - Rovigo	91	2,0	3.944	5,3	4.035	5,1
19 - Adria	21	0,5	1.988	2,7	2.009	2,5
20 - Verona	181	3,9	1.524	2,0	1.705	2,1
21 - Legnago	64	1,4	2.737	3,7	2.801	3,5
22 - Bussolengo	302	6,6	3.043	4,1	3.345	4,2
Az. Ospedaliera Padova	235	5,1	3.773	5,0	4.008	5,0
Az. Ospedaliera. Verona	248	5,4	6.648	8,9	6.896	8,7
<b>REGIONE VENETO</b>	<b>4.609</b>	<b>100,0</b>	<b>74.831</b>	<b>100,0</b>	<b>79.440</b>	<b>100,0</b>

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati della Regione Veneto – Direzione Risorse Socio-Sanitarie – Servizio sistema informativo socio-sanitario e tecnologie informatiche

Sulla base dell'Az. di residenza del soggetto ricoverato, si evidenzia che il 6,2% dei ricoveri alcol-correlati è stato effettuato a pazienti residenti in altre regioni italiane. Per quanto riguarda i pazienti residenti nella Regione Veneto, i tassi di ospedalizzazione più elevati si rilevano nelle Az. ULSS19-Adria e 12 Veneziana, con rispettivamente 27,5 e circa 22 ricoveri alcol-correlati ogni 1.000 residenti (Tabella 38).

## I ricoveri ospedalieri per patologie alcol-correlate

**Tabella 38 - Distribuzione percentuale dei ricoveri "alcol-correlati" per Az. ULSS di residenza del paziente e tassi di ospedalizzazione per 1.000 residenti. Anno 2003**

Az. ULSS ed Az. Ospedaliere	Ricoveri con diagnosi totalmente attribuibili		Ricoveri con diagnosi multifattoriale		TOTALE		Tassi di ospedalizzazione per 1.000 residenti
	n.	%	n.	%	n.	%	
1 - Belluno	209	5,1	1.619	2,3	1.828	2,5	14,2
2 - Feltre	123	3,0	1.171	1,7	1.294	1,7	15,7
3 - Bassano Del Grappa	133	3,2	1.806	2,6	1.939	2,6	11,4
4 - Thiene	138	3,4	1.307	1,9	1.445	1,9	8,1
5 - Arzignano	162	3,9	2.125	3,0	2.287	3,1	13,4
6 - Vicenza	324	7,9	4.189	5,9	4.513	6,1	15,1
7 - Pieve Di Soligo	169	4,1	3.212	4,6	3.381	4,5	16,2
8 - Asolo	159	3,9	3.569	5,1	3.728	5,0	16,0
9 - Treviso	366	8,9	6.979	9,9	7.345	9,9	19,2
10 - San Donà Di Piave	116	2,8	3.074	4,4	3.190	4,3	15,7
12 Veneziana	378	9,2	6.284	8,9	6.662	8,9	21,9
13 - Mirano	273	6,6	4.063	5,8	4.336	5,8	17,6
14 - Chioggia	108	2,6	2.159	3,1	2.267	3,0	17,4
15 - Cittadella	191	4,7	3.700	5,3	3.891	5,2	16,9
16 - Padova	360	8,8	4.464	6,3	4.824	6,5	12,1
17 - Este Monselice	96	2,3	3.379	4,8	3.475	4,7	19,3
18 - Rovigo	96	2,3	3.385	4,8	3.481	4,7	20,3
19 - Adria	18	0,4	2.044	2,9	2.062	2,8	27,5
20 - Verona	393	9,6	6.676	9,5	7.069	9,5	15,8
21 - Legnago	65	1,6	2.405	3,4	2.470	3,3	17,1
22 - Bussolengo	230	5,6	2.826	4,0	3.056	4,1	11,9
<b>REGIONE VENETO</b>	<b>4.107</b>	<b>100,0</b>	<b>70.436</b>	<b>100,0</b>	<b>74.543</b>	<b>100,0</b>	<b>16,1</b>

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati della Regione Veneto – Direzione Risorse Socio-Sanitarie – Servizio sistema informativo socio-sanitario e tecnologie informatiche

### LA MOBILITÀ DEI RICOVERI OSPEDALIERI PER PATOLOGIE ALCOL-CORRELATE

A completamento della parte precedentemente descritta, sono state analizzate le schede di dimissione ospedaliera, con le diagnosi alcol-correlate sopra presentate, relative a soggetti residenti nel Veneto e ricoverati in strutture presenti in altre Regioni italiane. Nel corso del triennio 2001-2003, il numero dei ricoveri per patologie alcol-correlate in strutture fuori della regione Veneto, poco più di 3.000 annui, rimane sostanzialmente invariato.

Anche per quanto riguarda i ricoveri avvenuti in altre Regioni, nel corso dell'anno 2003, la maggior parte dei ricoveri con diagnosi principale o secondaria totalmente attribuibile al consumo alcolico, è stata per "Sindrome di dipendenza da alcol" (70,6%). Nel corso del triennio analizzato, si rileva una diminuzione, pari all'11%, dei ricoveri extra-regionali per tale diagnosi.

Nel considerare la mobilità per diagnosi ad eziologia multifattoriale, la maggior parte dei ricoveri avviene per "Ipertensione essenziale". L'aumento percentuale più rilevante nel corso del triennio 2001-03 si riscontra nei ricoveri per "Tumori maligni della laringe" e "Tumori maligni del fegato e dei dotti biliari" (rispettivamente +27,1% e 9,6%) (Tabella 39).

**Tabella 39 - Distribuzione dei ricoveri "alcol-correlati" per tipologia di diagnosi principale o secondaria e differenza percentuale anni 2000- 2003**

	ANNO			Δ % 2001- 2003
	2001	2002	2003	
<b>Diagnosi di ricovero totalmente attribuibili all'alcol (totale assoluto)</b>	<b>155</b>	<b>123</b>	<b>126</b>	<b>-18,7</b>
Psicosi da alcol	15	5	5	-66,7
Sindrome di dipendenza da alcol	105	84	89	-15,2
Abuso di alcol senza dipendenza	27	30	30	11,1
Polineuropatia alcolica	4	0	1	-75,0
Cardiomiopatia alcolica	1	1	0	-100,0
Gastrite alcolica	2	0	1	-50,0
Effetti tossici da alcol etilico	1	3	0	-100,0
<b>Diagnosi di ricovero ad eziologia multifattoriale per le quali esistono solide evidenze di un rapporto di causalità con l'alcol (totale assoluto)</b>	<b>2.916</b>	<b>3.036</b>	<b>2.931</b>	<b>0,5</b>
Tumori maligni del cavo orale e faringe	212	175	176	-17,0
Tumori maligni dell' esofago	77	54	40	-48,1
Tumori maligni del fegato e dei dotti biliari	146	209	160	9,6
Tumori maligni della laringe	48	63	61	27,1
Ipertensione essenziale	2.140	2.241	2.201	2,9
Steatosi, epatite e cirrosi alcolica	258	258	267	3,5
Altre malattie epatiche croniche o cirrosi senza menzione di alcol	6	14	6	0,0
Coma epatico ed ipertensione portale	29	22	20	-31,0
<b>TOTALE (valore assoluto)</b>	<b>3.071</b>	<b>3.159</b>	<b>3.057</b>	<b>-0,5</b>

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati della Regione Veneto – Direzione Risorse Socio-Sanitarie – Servizio sistema informativo socio-sanitario e tecnologie informatiche

## I ricoveri ospedalieri per patologie alcol-correlate

La maggior parte dei ricoveri extra-regionali è avvenuto nelle strutture ospedaliere delle regioni limitrofe: Friuli-Venezia-Giulia, Lombardia, Emilia-Romagna, Trentino-Alto-Adige (Tabella 40).

**Tabella 40 - Distribuzione assoluta e percentuale dei ricoveri per regione di ricovero e differenza percentuale anni 2001-2003**

	2001		ANNO 2002		2003	
	n.	%	n.	%	n.	%
Piemonte	79	2,6	86	2,7	63	2,1
Valle d'Aosta	4	0,1	0	0,0	3	0,1
Lombardia	798	26,0	806	25,5	722	23,6
Trentino-Alto Adige	320	10,4	310	9,8	379	12,4
Friuli-Venezia Giulia	938	30,5	920	29,1	852	27,9
Liguria	28	0,9	33	1,0	32	1,0
Emilia Romagna	608	19,8	641	20,3	664	21,7
Toscana	67	2,2	91	2,9	89	2,9
Umbria	14	0,5	11	0,3	15	0,5
Marche	37	1,2	26	0,8	19	0,6
Lazio	70	2,3	114	3,6	85	2,8
Abruzzo	18	0,6	19	0,6	12	0,4
Molise	2	0,1	1	0,0	1	0,0
Campania	22	0,7	19	0,6	26	0,9
Puglia	33	1,1	31	1,0	32	1,0
Basilicata	1	0,0	2	0,1	2	0,1
Calabria	10	0,3	4	0,1	12	0,4
Sicilia	12	0,4	32	1,0	29	0,9
Sardegna	10	0,3	13	0,4	20	0,7
<b>ALTRE REGIONI</b>	<b>3.071</b>		<b>3.159</b>		<b>3.057</b>	

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati della Regione Veneto – Direzione Risorse Socio-Sanitarie – Servizio sistema informativo socio-sanitario e tecnologie informatiche

Dall'analisi dei ricoveri in mobilità sulla base dell'Az. ULSS di residenza del paziente, si rileva che la maggior parte appartiene all'Az. ULSS10-San Donà di Piave e 18-Rovigo (Tabella 41).

## I ricoveri ospedalieri per patologie alcol-correlate

**Tabella 41 - Distribuzione assoluta e percentuale dei ricoveri "alcol-correlati" per Az. di residenza del paziente. Anni 2001-2003**

	ANNO					
	2001		2002		2003	
	n.	%	n.	%	n.	%
1 - Belluno	159	5,2	160	5,1	170	5,6
2 - Feltre	36	1,2	47	1,5	69	2,3
3 - Bassano Del Grappa	105	3,4	108	3,4	86	2,8
4 - Thiene	76	2,5	68	2,2	63	2,1
5 - Arzignano	59	1,9	44	1,4	44	1,4
6 - Vicenza	141	4,6	155	4,9	137	4,5
7 - Pieve Di Soligo	184	6,0	180	5,7	177	5,8
8 - Asolo	53	1,7	76	2,4	103	3,4
9 - Treviso	184	6,0	209	6,6	205	6,7
10 - San Donà Di Piave	483	15,7	440	13,9	409	13,4
12 Veneziana	188	6,1	164	5,2	191	6,2
13 - Mirano	42	1,4	52	1,6	67	2,2
14 - Chioggia	40	1,3	50	1,6	33	1,1
15 - Cittadella	36	1,2	38	1,2	38	1,2
16 - Padova	153	5,0	146	4,6	168	5,5
17 - Este Monselice	44	1,4	85	2,7	48	1,6
18 - Rovigo	410	13,4	420	13,3	403	13,2
19 - Adria	86	2,8	95	3,0	68	2,2
20 - Verona	270	8,8	240	7,6	223	7,3
21 - Legnago	101	3,3	113	3,6	99	3,2
22 - Bussolengo	220	7,2	269	8,5	256	8,4
<b>REGIONE VENETO</b>	<b>3.071</b>		<b>3.159</b>		<b>3.057</b>	

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati della Regione Veneto – Direzione Risorse Socio-Sanitarie – Servizio sistema informativo socio-sanitario e tecnologie informatiche

### LE DIMISSIONI OSPEDALIERE E I SOGGETTI RICOVERATI CON DIAGNOSI DIRETTAMENTE ATTRIBUIBILI AL CONSUMO DI ALCOL

Allo scopo di approfondire ulteriormente le patologie direttamente correlate al consumo di bevande alcoliche, si riportano le analisi riferite ai ricoveri che riportano una delle diagnosi riportate in Tabella 42 (le stesse indicate nell'anno 2004 dal Ministero della Salute) nel motivo principale di ricovero o in uno dei cinque concomitanti. I ricoveri così selezionati si riducono quindi a 14.447, risultando comunque più direttamente connesse al consumo di bevande alcoliche.

**Tabella 42 - Categorie di diagnosi correlate all'uso di droghe ed alcol**

<b>Categoria di diagnosi correlata all'uso di ALCOL</b>	<b>Codice ICD-9 CM (anno 1997)</b>
Psicosi da alcol	291
Sindrome di dipendenza da alcol	303
Abuso di alcol senza dipendenza	305.0
Polineuropatia alcolica	357.5
Cardiomiopatia alcolica	425.5
Gastrite alcolica	535.3
Steatosi, epatite, cirrosi alcolica	571.0-3, 5
Alcolemia elevata	790.3
Effetti tossici dell'alcol etilico	980.0

La distribuzione percentuale delle diagnosi alcol-correlate riportate nelle schede di dimissione ospedaliera dal 2000 al 2003, evidenzia che la maggior parte dei ricoveri è associata a patologie a carico del fegato e direttamente attribuibili al consumo di alcolici ("Steatosi, epatite e cirrosi alcoliche"), con valori percentuali mai inferiori al 68% nel corso degli anni analizzati (Tabella 43).

**Tabella 43 - Distribuzione dei ricoveri "alcol-correlati" per tipologia di diagnosi, valori assoluti e percentuali. Anni 2001-2003**

<b>Diagnosi principale o concomitante di ricovero</b>	<b>2000 %</b>	<b>2001 %</b>	<b>2002 %</b>	<b>2003 %</b>
Psicosi da alcol	3,4	3,3	3,3	3,1
Sindrome di dipendenza da alcol	21,6	20,9	21,2	22,4
Abuso di alcol senza dipendenza	3,9	3,6	3,5	4,4
Polineuropatia alcolica	1,7	2,0	2,0	0,8
Cardiomiopatia alcolica	0,6	0,7	0,6	0,4
Gastrite alcolica	0,6	0,6	0,6	0,6
Alcolemia elevata	0,0	0,0	0,0	0,0
Effetti tossici da alcol etilico	0,1	0,1	0,0	0,1
Steatosi, epatite e cirrosi alcolica	68,1	68,8	68,7	68,1
<b>Numero totale di diagnosi riportate (n)</b>	<b>20.949</b>	<b>21.246</b>	<b>19.454</b>	<b>14.447</b>

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati della Regione Veneto – Direzione Risorse Socio-Sanitarie – Servizio sistema informativo socio-sanitario e tecnologie informatiche

## I ricoveri ospedalieri per patologie alcol-correlate

Come già rilevato negli anni precedenti, le quote percentuali più elevate di ospedalizzazioni per motivi alcol-correlati si registrano nelle Az. ULSS12 Veneziana e 9-Treviso con valori che rimangono sostanzialmente stabili nel corso del triennio (Tabella 44).

**Tabella 44 - Distribuzione dei ricoveri "alcol-correlati" per Az. ULSS o Az. Ospedaliera di ricovero, valori percentuali. Anni 2000-2003**

Az. ULSS ed Az. Ospedaliera	2000 %	2001 %	2002 %	2003 %
1 - Belluno	4,6	4,7	4,6	4,9
2 - Feltre	3,0	3,1	3,0	2,2
3 - Bassano Del Grappa	2,2	2,5	2,5	2,7
4 - Thiene	2,7	2,7	2,1	2,2
5 - Arzignano	3,4	3,3	2,9	2,7
6 - Vicenza	7,0	6,4	6,8	6,5
7 - Pieve Di Soligo	3,8	4,1	4,0	4,8
8 - Asolo	3,9	3,9	3,8	3,6
9 - Treviso	8,4	8,2	8,9	8,9
10 - San Donà Di Piave	3,3	2,7	3,4	3,6
12 Veneziana	10,2	10,1	9,5	9,2
13 - Mirano	5,5	5,3	5,5	5,4
14 - Chioggia	3,1	3,0	3,1	3,0
15 - Cittadella	3,4	3,2	3,0	3,2
16 - Padova	3,8	4,4	4,5	5,0
17 - Este Monselice	2,7	2,9	3,3	3,6
18 - Rovigo	3,2	3,0	3,1	3,0
19 - Adria	0,9	1,2	1,1	1,2
20 - Verona	2,6	2,6	2,8	3,1
21 - Legnago	2,0	2,0	2,4	2,5
22 - Bussolengo	5,7	5,4	6,1	5,8
Az. Osped. Padova	8,3	7,5	6,4	6,1
Az. Osped. Verona	6,4	7,6	7,2	6,8

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati della Regione Veneto – Direzione Risorse Socio-Sanitarie – Servizio sistema informativo socio-sanitario e tecnologie informatiche

Il 90% dei ricoveri risulta in regime ordinario, il restante 10% in regime diurno.

Il 57,5% delle ospedalizzazioni alcolcorrelate è stato di tipo urgente, mentre il 36,5% programmato.

I reparti maggiormente coinvolti nell'affrontare le problematiche alcolcorrelate riguardano Medicina Generale (47,3%), Chirurgia Generale (12,6%), Gastroenterologia (9,3%) e Psichiatria (8,0%).

Le analisi condotte considerando i **soggetti** ricoverati, rilevano che i 14.447 ricoveri si riferiscono a 9.454 pazienti, con un rapporto ricoveri/pazienti uguale a 1,5.

Il 67,5% dei pazienti ricoverati è di sesso maschile, con un'età media pari a 57,4 anni, di circa cinque anni inferiore a quelle delle pazienti ricoverate per le medesime patologie (62,5 anni).

Anche in questo caso il raggruppamento diagnostico più presente è quello relativo a "Steatosi, epatite e cirrosi alcolica", con il 64% del totale dei soggetti ricoverati

## I ricoveri ospedalieri per patologie alcol-correlate

(3.946 maschi e 2.103 femmine), seguito dal 25,3% dei soggetti ricoverati per "Sindrome da dipendenza da alcol".

Il 78,6% dei pazienti di 55 anni ed oltre è ricoverato per "Steatosi, epatite e cirrosi alcolica", mentre per il 56,5% dei giovani di 15-34 anni la causa del ricovero risulta "Sindrome di dipendenza da alcol" (Tabella 45).

**Tabella 45 - Distribuzione percentuale ed assoluta dei ricoveri "alcol-correlati" per tipologia di diagnosi principale o secondaria, classi di età e genere. Anno 2003**


	MASCHI				TOTALE (n)
	≤ 14 anni %	15-34 anni %	35-54 anni %	≥55 anni %	
Psicosi da alcol	0,0	5,5	4,8	3,3	<b>251</b>
Sindrome di dipendenza da alcol	0,0	58,0	41,2	15,8	<b>1.741</b>
Abuso di alcol senza dipendenza	28,6	17,4	6,8	1,9	<b>298</b>
Polineuropatia alcolica	0,0	0,2	1,0	1,2	<b>68</b>
Cardiomiopatia alcolica	0,0	0,0	0,3	0,8	<b>39</b>
Gastrite alcolica	0,0	0,2	0,4	0,5	<b>29</b>
Alcolemia elevata	0,0	0,4	0,0	0,1	<b>6</b>
Effetti tossici da alcol etilico	14,3	0,4	0,1	0,0	<b>7</b>
Steatosi, epatite e cirrosi alcolica	57,1	17,8	45,3	76,5	<b>3.946</b>
<b>TOTALE (n)</b>	<b>7</b>	<b>455</b>	<b>2.139</b>	<b>3.784</b>	<b>6.385</b>
	FEMMINE				
Psicosi da alcol	0,0	4,2	3,9	1,8	<b>75</b>
Sindrome di dipendenza da alcol	0,0	51,7	44,5	11,0	<b>653</b>
Abuso di alcol senza dipendenza	66,7	25,2	9,1	2,4	<b>161</b>
Polineuropatia alcolica	0,0	0,0	1,6	0,5	<b>23</b>
Cardiomiopatia alcolica	0,0	0,0	0,0	0,0	<b>1</b>
Gastrite alcolica	0,0	3,5	0,3	2,0	<b>49</b>
Alcolemia elevata	0,0	0,0	0,0	0,0	<b>1</b>
Effetti tossici da alcol etilico	0,0	1,4	0,1	0,0	<b>3</b>
Steatosi, epatite e cirrosi alcolica	33,3	14,0	40,5	82,3	<b>2.103</b>
<b>TOTALE (n)</b>	<b>6</b>	<b>143</b>	<b>770</b>	<b>2.150</b>	<b>3.069</b>

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati della Regione Veneto – Direzione Risorse Socio-Sanitarie – Servizio sistema informativo socio-sanitario e tecnologie informatiche

Dalla distribuzione dei soggetti ricoverati per classi di età, non si evidenziano variazioni di rilievo nel corso degli anni analizzati.

Risulta, altresì, interessante evidenziare le differenze a livello di genere: le quote più ridotte si rilevano tra i soggetti di età inferiore ai 40 anni, sia nei maschi (13%) che nelle femmine (8,8%). Per i soggetti di età compresa tra i 40 e i 59 anni si distinguono i maschi, con il 39,3% dei soggetti ricoverati (vs. 31% delle femmine), mentre tra i soggetti di 60 anni ed oltre si distinguono le donne (M=35,7%; F=49,3%) (Grafico 10).

**Grafico 10 - Distribuzione percentuale per classi di età e sesso dei soggetti ricoverati con diagnosi alcolcorrelata. Anni 2000-2003**



Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati della Regione Veneto – Direzione Risorse Socio-Sanitarie – Servizio sistema informativo socio-sanitario e tecnologie informatiche

## I ricoveri ospedalieri per patologie alcol-correlate

L'analisi delle schede di dimissione ospedaliera secondo l'Az. ULSS di residenza del paziente ricoverato, ha evidenziato che il 3,4% dei soggetti risiede in altre regioni italiane.

Le analisi effettuate considerando i pazienti residenti nella Regione Veneto, permettono di calcolare i tassi di ospedalizzazione rispetto sia ai ricoveri (totale n. 14.036) sia ai soggetti ricoverati.

Il tasso regionale di ospedalizzazione riferito ai ricoveri per patologie alcol-correlate nelle strutture regionali, nell'anno 2003 è uguale a 302,3 ricoveri ogni 100.000 residenti. Il range di valori è compreso tra circa 212 e 540 ricoveri ogni 100.000 residenti, rilevati rispettivamente nelle Az. ULSS16-Padova e 1-Belluno.

Il tasso regionale di ospedalizzazione riferito ai soggetti veneti ricoverati risulta di circa 197 pazienti ogni 100.000 abitanti, con un tasso minimo, pari a circa 127 pazienti ogni 100.000 residenti, rilevato presso l'Az. ULSS19-Adria e un tasso massimo, pari a circa 381 soggetti ogni 100.000 residenti nell'Az. ULSS1- Belluno (Tabella 46).

**Tabella 46 - Distribuzione assoluta e tasso di ospedalizzazione riferito ai ricoveri e ai soggetti ricoverati ogni 100.000 residenti - Anno 2003**

	RICOVERI		SOGGETTI	
	n.	Tasso di ospedalizzazione	n.	Tasso di ospedalizzazione
Belluno	695	538,8	124	381,4
Feltre	325	393,9	492	287,2
Bassano del Grappa	460	271,1	237	187,4
Thiene	405	226,0	318	173,0
Arzignano	494	288,8	310	193,5
Vicenza	946	316,0	331	201,4
Pieve di Soligo	691	330,4	603	229,5
Asolo	596	255,8	480	165,3
Treviso	1.312	343,1	385	213,9
San Donà di Piave	569	280,8	818	180,7
Venezia	1.427	469,5	366	282,9
Mirano	811	330,0	33	207,5
Chioggia	487	373,5	860	229,3
Cittadella	499	216,5	510	132,3
Padova	844	211,8	299	139,0
Este - Monselice	593	330,2	305	196,5
Rovigo	398	232,2	554	142,9
Adria	167	222,8	353	126,7
Verona	1.280	285,8	245	188,9
Legnago	335	232,1	95	174,6
Bussolengo	702	272,3	846	183,9
<b>REGIONE VENETO</b>	<b>14.036</b>	<b>302,3</b>	<b>9.290</b>	<b>196,7</b>

## **ALLEGATI**

---



---

**IL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE NELLA POPOLAZIONE GENERALE IN ITALIA E IN VENETO – ANNI 1998-2003**

- Tabella 47/a) e b) Stima della frequenza assoluta e relativa dei consumatori di VINO e variazione (%) osservata nelle prevalenze nel periodo 1998-2003 in Italia (a) e in Veneto (b);
- Tabella 48/a) e b) Stima della frequenza assoluta e relativa dei consumatori di OLTRE ½ LITRO DI VINO al giorno e variazione (%) osservata nelle prevalenze nel periodo 1998-2003 in Italia (a) e in Veneto (b);
- Tabella 49/a) e b) Stima della frequenza assoluta e relativa dei consumatori di BIRRA e variazione (%) osservata nelle prevalenze nel periodo 1998-2003 in Italia (a) e in Veneto (b);
- Tabella 50/a) e b) Stima della frequenza assoluta e relativa dei consumatori di OLTRE ½ LITRO DI BIRRA AL GIORNO e variazione (%) osservata nelle prevalenze nel periodo 1998-2003 in Italia (a) e in Veneto (b);
- Tabella 51/a) e b) Stima della frequenza assoluta e relativa dei consumatori di APERITIVI ALCOLICI e variazione (%) osservata nelle prevalenze nel periodo 1998-2003 in Italia (a) e in Veneto (b);
- Tabella 52/a) e b) Stima della frequenza assoluta e relativa dei consumatori di AMARI e variazione (%) osservata nelle prevalenze nel periodo 1998-2003 in Italia (a) e in Veneto (b);
- Tabella 53/a) e b) Stima della frequenza assoluta e relativa dei consumatori di SUPERALCOLICI e variazione (%) osservata nelle prevalenze nel periodo 1998-2003 in Italia (a) e in Veneto (b);
- Tabella 54/a) e b) Stima della frequenza assoluta e relativa dei consumatori di ALCOLICI FUORI PASTO e variazione (%) osservata nelle prevalenze nel periodo 1998-2003 in Italia (a) e in Veneto (b);
- Tabella 55/a) e b) Stima della frequenza assoluta e relativa dei consumatori di VINO AL DI SOTTO DELL'ETA' LEGALE e variazione (%) osservata nelle prevalenze nel periodo 1998-2003 in Italia (a) e in Veneto (b);
- Tabella 56/a) e b) Stima della frequenza assoluta e relativa dei consumatori di BIRRA AL DI SOTTO DELL'ETA' LEGALE e variazione (%) osservata nelle prevalenze nel periodo 1998-2003 in Italia (a) e in Veneto (b);

- Tabella 57/a) e b) Stima della frequenza assoluta e relativa dei consumatori di APERITIVI ALCOLICI AL DI SOTTO DELL'ETA' LEGALE e variazione (%) osservata nelle prevalenze nel periodo 1998-2003 in Italia (a) e in Veneto (b);
- Tabella 58/a) e b) Stima della frequenza assoluta e relativa dei consumatori di AMARI AL DI SOTTO DELL'ETA' LEGALE e variazione (%) osservata nelle prevalenze nel periodo 1998-2003 in Italia (a) e in Veneto (b);
- Tabella 59/a) e b) Stima della frequenza assoluta e relativa dei consumatori di SUPERALCOLICI AL DI SOTTO DELL'ETA' LEGALE e variazione (%) osservata nelle prevalenze nel periodo 1998-2003 in Italia (a) e in Veneto (b);
- Tabella 60/a) e b) Stima della frequenza assoluta relativa e dei consumatori di ALCOLICI FUORI DEI PASTI AL DI SOTTO DELL'ETA' LEGALE e variazione (%) osservata nelle prevalenze nel periodo 1998-2003 in Italia (a) e in Veneto (b)

### **IL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE NELLA POPOLAZIONE GENERALE IN ITALIA E IN VENETO – ANNO 2002**

- Tabella 61 Distribuzione percentuale dei consumatori di VINO di 14 anni e più secondo le classi di età, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto
- Tabella 62 Distribuzione percentuale dei consumatori di VINO di 14 anni e più secondo la condizione lavorativa, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto
- Tabella 63 Distribuzione percentuale dei consumatori di VINO di 14 anni e più secondo il titolo di studio conseguito, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto
- Tabella 64 Distribuzione percentuale dei consumatori di BIRRA di 14 anni e più secondo le classi di età, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto
- Tabella 65 Distribuzione percentuale dei consumatori di BIRRA di 14 anni e più secondo la condizione lavorativa, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto
- Tabella 66 Distribuzione percentuale dei consumatori di BIRRA di 14 anni e più secondo il titolo di studio conseguito, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto
- Tabella 67 Distribuzione percentuale dei consumatori di APERITIVI ALCOLICI di 14 anni e più secondo le classi di età, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto

---

Tabella 68	Distribuzione percentuale dei consumatori di APERITIVI ALCOLICI di 14 anni e più secondo la condizione lavorativa, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto
Tabella 69	Distribuzione percentuale dei consumatori di APERITIVI ALCOLICI di 14 anni e più secondo il titolo di studio conseguito, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto
Tabella 70	Distribuzione percentuale dei consumatori di AMARI di 14 anni e più secondo le classi di età, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto
Tabella 71	Distribuzione percentuale dei consumatori di AMARI di 14 anni e più secondo la condizione lavorativa, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto
Tabella 72	Distribuzione percentuale dei consumatori di AMARI di 14 anni e più secondo il titolo di studio conseguito, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto
Tabella 73	Distribuzione percentuale dei consumatori di LIQUORI di 14 anni e più secondo le classi di età, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto
Tabella 74	Distribuzione percentuale dei consumatori di LIQUORI di 14 anni e più secondo la condizione lavorativa, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto
Tabella 75	Distribuzione percentuale dei consumatori di LIQUORI di 14 anni e più secondo il titolo di studio conseguito, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto
Tabella 76	Distribuzione percentuale dei consumatori di ALCOLICI FUORI DEI PASTI di 14 anni e più secondo le classi di età, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto
Tabella 77	Distribuzione percentuale dei consumatori di ALCOLICI FUORI DEI PASTI di 14 anni e più secondo la condizione lavorativa, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto
Tabella 78	Distribuzione percentuale dei consumatori di ALCOLICI FUORI DEI PASTI di 14 anni e più secondo il titolo di studio conseguito, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto

**Tabella 47 /a) e b) - Stima della frequenza assoluta e relativa dei consumatori di VINO in ITALIA (a) e in VENETO (b) e variazione (%) osservata nelle prevalenze nel periodo 1998-2003**

a) ITALIA		Anno						Δ % 1998/ 2003	
		1998	1999	2000	2001	2002	2003		
Maschi	14-17 adolescenti	STIMA	283.927	270.740	302.748	291.435	287.834	274.299	-2,4
		%	21,1	22,9	24,0	23,3	22,7	20,6	
	18-24 giovani	STIMA	1.246.162	1.270.254	1.208.481	1.267.105	1.113.763	1.091.576	1,0
		%	48,4	48,7	50,1	54,8	48,5	48,9	
	25-44 giovani adulti	STIMA	6.352.907	6.263.096	6.416.387	6.710.329	6.472.685	6.441.556	-0,7
		%	72,2	70,6	71,8	74,7	72,1	71,7	
	45-64 adulti	STIMA	5.699.352	5.652.806	5.729.491	5.921.938	5.879.142	5.882.987	1,3
%		81,6	80,6	81,1	83,2	82,6	82,7		
65-74 giovani anziani	STIMA	2.067.891	2.065.667	2.075.395	2.281.114	2.183.205	2.114.480	1,0	
	%	79,0	78,6	78,6	83,4	81,9	79,8		
75+ anziani	STIMA	1.079.079	1.080.363	1.117.344	1.226.083	1.237.517	1.274.030	3,5	
	%	73,8	71,3	70,5	77,4	75,0	76,4		
<b>TOTALE MASCHI</b>	STIMA	16.729.317	16.602.926	16.849.846	17.698.004	17.174.145	17.078.927	1,3	
	%	70,3	69,7	70,5	73,8	71,6	71,2		
Femmine	14-17 adolescenti	STIMA	163.905	186.227	167.961	182.803	135.172	146.711	-8,0
		%	13,7	15,3	13,7	15,6	11,9	12,6	
	18-24 giovani	STIMA	738.761	740.666	685.519	731.961	634.872	626.410	-3,2
		%	28,5	30,4	29,7	32,4	27,7	27,6	
	25-44 giovani adulti	STIMA	3.872.130	3.941.661	4.004.227	4.062.866	3.894.167	3.611.453	-8,3
		%	44,6	45,1	45,5	46,0	44,1	40,9	
	45-64 adulti	STIMA	3.818.267	3.881.159	3.827.574	4.046.564	3.878.024	3.652.847	-5,5
%		52,5	53,3	52,3	55,0	52,7	49,6		
65-74 giovani anziani	STIMA	1.644.355	1.625.522	1.630.549	1.647.669	1.620.918	1.505.980	-4,5	
	%	48,6	50,0	48,9	48,8	49,7	46,4		
75+ anziani	STIMA	1.111.235	1.094.688	1.148.345	1.258.173	1.197.679	1.163.069	-9,6	
	%	44,9	41,1	42,9	46,1	42,1	40,6		
<b>TOTALE FEMMINE</b>	STIMA	11.348.653	11.469.924	11.464.175	11.930.035	11.360.834	10.706.471	-6,3	
	%	44,4	44,8	44,7	46,4	44,1	41,6		
<b>TOTALE</b>	STIMA	<b>28.077.970</b>	<b>28.072.850</b>	<b>28.314.021</b>	<b>29.628.039</b>	<b>28.534.979</b>	<b>27.785.398</b>	<b>-1,8</b>	
	%	<b>56,9</b>	<b>56,8</b>	<b>57,1</b>	<b>59,6</b>	<b>57,4</b>	<b>55,9</b>		

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

b) VENETO		Anno						Δ % 1998/ 2003	
		1998	1999	2000	2001	2002	2003		
Maschi	14-17 adolescenti	STIMA	19.091	17.721	25.937	19.561	30.943	27.968	43,0
		%	22,3	24,0	26,7	21,4	34,1	31,9	
	18-24 giovani	STIMA	108.826	100.488	82.061	100.497	100.351	90.339	-1,5
		%	55,0	50,7	49,6	61,5	61,2	54,2	
	25-44 giovani adulti	STIMA	562.644	512.799	520.986	573.604	549.201	592.291	2,0
		%	76,8	69,2	69,4	75,8	72,6	78,3	
	45-64 adulti	STIMA	475.284	473.002	469.855	480.300	488.384	501.274	2,4
%		84,4	83,2	81,8	82,6	84,1	86,4		
65-74 giovani anziani	STIMA	152.530	148.240	168.891	168.349	170.648	181.635	1,1	
	%	82,5	84,8	88,3	88,0	85,4	83,4		
75+ anziani	STIMA	95.036	115.891	85.769	102.799	101.893	80.533	-4,8	
	%	81,7	87,8	69,8	79,0	83,9	77,8		
<b>TOTALE MASCHI</b>		STIMA	1.413.412	1.368.140	1.353.500	1.445.110	1.441.419	1.474.040	2,5
		%	75,1	72,4	71,2	75,5	75,3	77,0	
Femmine	14-17 adolescenti	STIMA	10.772	12.893	14.784	7.497	8.265	18.751	29,1
		%	15,1	15,8	16,7	10,6	9,9	19,5	
	18-24 giovani	STIMA	68.061	69.408	40.351	65.739	55.858	66.817	32,6
		%	33,7	38,3	24,5	37,6	34,5	44,7	
	25-44 giovani adulti	STIMA	342.692	335.878	345.406	338.282	361.789	343.244	-2,6
		%	49,1	47,6	48,4	47,2	50,4	47,8	
	45-64 adulti	STIMA	359.893	351.465	328.010	352.243	367.440	335.711	-8,6
%		62,9	61,1	56,7	60,5	63,0	57,5		
65-74 giovani anziani	STIMA	144.159	147.223	141.345	141.650	152.155	155.685	-7,8	
	%	61,9	57,9	57,0	59,5	57,2	57,1		
75+ anziani	STIMA	126.784	112.169	121.213	149.702	126.958	109.412	-4,2	
	%	57,0	54,9	55,6	63,7	61,3	54,6		
<b>TOTALE FEMMINE</b>		STIMA	1.052.362	1.029.034	991.109	1.055.113	1.072.465	1.029.620	-3,0
		%	52,6	51,4	49,3	52,3	53,1	51,0	
<b>TOTALE</b>		STIMA	<b>2.465.774</b>	<b>2.397.174</b>	<b>2.344.609</b>	<b>2.500.223</b>	<b>2.513.884</b>	<b>2.503.660</b>	<b>0,3</b>
		%	<b>63,5</b>	<b>61,6</b>	<b>59,9</b>	<b>63,6</b>	<b>63,9</b>	<b>63,7</b>	

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

**Tabella 48 a) e b) – Stima della frequenza assoluta e relativa dei consumatori di *OLTRE ½ LITRO DI VINO* al giorno in ITALIA e variazione (%) osservata nelle prevalenze nel periodo 1998-2003**

a) ITALIA		Anno						Δ % 1998/ 2003	
		1998	1999	2000	2001	2002	2003		
Maschi	14-17 adolescenti	STIMA	7.392	2.869	5.050	4.209	3.969	1.347	-80,0
	%	0,5	0,2	0,4	0,3	0,3	0,1		
	18-24 giovani	STIMA	49.607	39.892	49.280	42.813	36.276	35.420	-15,8
	%	1,9	1,5	2,0	1,9	1,6	1,6		
	25-44 giovani adulti	STIMA	605.776	549.040	618.639	546.118	491.374	441.537	-29,0
	%	6,9	6,2	6,9	6,1	5,5	4,9		
	45-64 adulti	STIMA	1.074.215	1.028.039	1.058.944	1.007.673	990.393	924.012	-15,6
%	15,4	14,7	15,0	14,2	13,9	13,0			
65-74 giovani anziani	STIMA	418.911	421.534	448.752	446.495	422.168	364.351	-13,8	
%	16,0	16,0	17,0	16,3	15,8	13,8			
75+ anziani	STIMA	161.251	176.922	172.986	192.287	213.314	175.754	-4,5	
%	11,0	11,7	10,9	12,1	12,9	10,5			
<b>TOTALE MASCHI</b>	STIMA	2.317.153	2.218.296	2.353.651	2.239.595	2.157.493	1.942.421	-16,5	
%	9,7	9,3	9,8	9,3	9,0	8,1			
Femmine	14-17 adolescenti	STIMA	840	2.550	4.321	1.973	4.202	---	-100,0
	%	0,1	0,2	0,4	0,2	0,4	---		
	18-24 giovani	STIMA	6.289	6.784	12.315	7.017	7.287	6.963	50,0
	%	0,2	0,3	0,5	0,3	0,3	0,3		
	25-44 giovani adulti	STIMA	90.724	85.990	118.202	86.581	116.416	51.155	-40,0
	%	1,0	1,0	1,3	1,0	1,3	0,6		
	45-64 adulti	STIMA	168.401	198.534	224.537	176.672	212.341	119.734	-30,4
%	2,3	2,7	3,1	2,4	2,9	1,6			
65-74 giovani anziani	STIMA	71.400	66.720	102.172	75.558	89.349	74.725	9,5	
%	2,1	2,1	3,1	2,2	2,7	2,3			
75+ anziani	STIMA	41.036	33.290	47.156	46.899	43.996	35.060	-29,4	
%	1,7	1,2	1,8	1,7	1,5	1,2			
<b>TOTALE FEMMINE</b>	STIMA	378.689	393.868	508.704	394.700	473.591	287.637	-26,7	
%	1,5	1,5	2,0	1,5	1,8	1,1			
<b>TOTALE</b>	STIMA	<b>2.695.842</b>	<b>2.612.164</b>	<b>2.862.355</b>	<b>2.634.295</b>	<b>2.631.084</b>	<b>2.230.058</b>	<b>-18,2</b>	
%	<b>5,5</b>	<b>5,3</b>	<b>5,8</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	<b>4,5</b>			

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

b) VENETO			Anno						Δ % 1998/ 2003
			1998	1999	2000	2001	2002	2003	
Maschi	14-17 adolescenti	STIMA	2.092	---	---	---	---	---	-100,0
		%	2,4	---	---	---	---	---	
	18-24 giovani	STIMA	4.910	3.766	2.355	4.330	1.078	2.946	-28,0
		%	2,5	1,9	1,4	2,7	0,7	1,8	
	25-44 giovani adulti	STIMA	54.390	56.142	54.384	42.836	23.458	47.264	-16,2
		%	7,4	7,6	7,2	5,7	3,1	6,2	
	45-64 adulti	STIMA	100.546	124.287	108.863	98.257	99.123	91.724	-11,2
%		17,8	21,9	19,0	16,9	17,1	15,8		
65-74 giovani anziani	STIMA	38.604	54.914	37.649	44.564	27.754	41.570	-8,6	
	%	20,9	31,4	19,7	23,3	13,9	19,1		
75+ anziani	STIMA	15.899	23.077	27.452	12.511	29.747	12.568	-11,7	
	%	13,7	17,5	22,4	9,6	24,5	12,1		
<b>TOTALE MASCHI</b>	STIMA	216.441	262.185	230.705	202.499	181.160	196.073	-11,3	
	%	11,5	13,9	12,1	10,6	9,5	10,2		
Femmine	14-17 adolescenti	STIMA	---	---	---	---	1.760	---	---
		%	---	---	---	---	2,1	---	
	18-24 giovani	STIMA	1.160	---	---	---	---	---	-100,0
		%	0,6	---	---	---	---	---	
	25-44 giovani adulti	STIMA	4.398	13.275	3.084	5.420	1.382	1.713	-66,7
		%	0,6	1,9	0,4	0,8	0,2	0,2	
	45-64 adulti	STIMA	16.463	16.739	24.126	6.835	18.302	7.104	-58,6
%		2,9	2,9	4,2	1,2	3,1	1,2		
65-74 giovani anziani	STIMA	10.208	9.317	8.538	5.355	8.548	2.422	-79,5	
	%	4,4	3,7	3,4	2,2	3,2	0,9		
75+ anziani	STIMA	5.173	4.691	6.934	1.166	2.888	1.657	-65,2	
	%	2,3	2,3	3,2	0,5	1,4	0,8		
<b>TOTALE FEMMINE</b>	STIMA	37.402	44.022	42.682	18.776	32.882	12.896	-68,4	
	%	1,9	2,2	2,1	0,9	1,6	0,6		
<b>TOTALE</b>		STIMA	<b>253.843</b>	<b>306.207</b>	<b>273.387</b>	<b>221.275</b>	<b>214.042</b>	<b>208.969</b>	<b>-18,5</b>
		%	<b>6,5</b>	<b>7,9</b>	<b>7,0</b>	<b>5,6</b>	<b>5,4</b>	<b>5,3</b>	

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

**Tabella 49/a e b) - Stima della frequenza assoluta e relativa dei consumatori di BIRRA e variazione (%) osservata nelle prevalenze nel periodo 1998-2003 in Italia (a) e in Veneto (b)**

a) ITALIA		Anno						Δ % 1998/ 2003	
		1998	1999	2000	2001	2002	2003		
Maschi	14-17 adolescenti	STIMA	536.480	515.112	513.559	501.694	480.173	502.517	-5,3
		%	39,8	43,5	40,7	40,1	37,9	37,7	
	18-24 giovani	STIMA	1.866.097	1.819.879	1.729.473	1.729.583	1.671.837	1.586.439	-2,1
		%	72,5	69,8	71,8	74,8	72,8	71,0	
	25-44 giovani adulti	STIMA	6.657.381	6.581.841	6.721.549	6.885.057	6.705.336	6.873.873	1,1
		%	75,7	74,2	75,2	76,6	74,7	76,5	
	45-64 adulti	STIMA	4.324.262	4.294.889	4.411.688	4.559.695	4.508.281	4.940.594	12,1
		%	61,9	61,3	62,4	64,0	63,4	69,4	
	65-74 giovani anziani	STIMA	1.046.505	1.042.729	1.104.011	1.157.977	1.074.631	1.285.777	21,3
		%	40,0	39,7	41,8	42,3	40,3	48,5	
	75+ anziani	STIMA	389.656	362.458	360.960	445.706	416.402	547.249	23,3
		%	26,6	23,9	22,8	28,1	25,3	32,8	
	<b>TOTALE MASCHI</b>	STIMA	14.820.380	14.616.907	14.841.241	15.279.711	14.856.660	15.736.449	5,3
		%	62,3	61,4	62,1	63,7	62,0	65,6	
Femmine	14-17 adolescenti	STIMA	319.186	332.473	308.442	320.806	254.993	271.471	-12,7
		%	26,7	27,3	25,1	27,3	22,4	23,3	
	18-24 giovani	STIMA	1.102.427	1.078.894	1.021.255	982.727	947.430	887.918	-8,0
		%	42,5	44,3	44,2	43,5	41,3	39,1	
	25-44 giovani adulti	STIMA	4.111.834	4.031.824	4.189.323	4.186.748	3.909.165	3.938.909	-5,9
		%	47,4	46,1	47,6	47,4	44,2	44,6	
	45-64 adulti	STIMA	2.237.107	2.314.723	2.404.566	2.532.683	2.365.452	2.570.361	13,3
		%	30,8	31,8	32,9	34,4	32,1	34,9	
	65-74 giovani anziani	STIMA	484.477	489.319	530.818	483.450	456.994	602.440	30,1
		%	14,3	15,1	15,9	14,3	14,0	18,6	
	75+ anziani	STIMA	203.867	189.695	232.431	265.361	213.182	265.907	13,4
		%	8,2	7,1	8,7	9,7	7,5	9,3	
	<b>TOTALE FEMMINE</b>	STIMA	8.458.898	8.436.929	8.686.836	8.771.776	8.147.215	8.537.006	0,3
		%	33,1	33,0	33,9	34,1	31,7	33,2	
<b>TOTALE</b>	STIMA	<b>23.279.278</b>	<b>23.053.836</b>	<b>23.528.077</b>	<b>24.051.487</b>	<b>23.003.875</b>	<b>24.273.455</b>	<b>3,4</b>	
	%	<b>47,2</b>	<b>46,7</b>	<b>47,5</b>	<b>48,4</b>	<b>46,3</b>	<b>48,8</b>		

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

b) VENETO		Anno						Δ % 1998/ 2003	
		1998	1999	2000	2001	2002	2003		
Maschi	14-17 adolescenti	STIMA	26.959	28.186	41.892	30.380	44.223	40.402	46,5
		%	31,4	38,1	43,2	33,3	48,8	46,0	
	18-24 giovani	STIMA	157.449	143.085	121.948	113.514	133.622	121.121	-8,8
		%	79,6	72,2	73,8	69,5	81,5	72,6	
	25-44 giovani adulti	STIMA	584.139	553.168	557.242	571.007	583.936	592.703	-1,8
		%	79,7	74,6	74,3	75,4	77,2	78,3	
	45-64 adulti	STIMA	348.822	335.525	342.334	347.964	365.804	419.362	16,6
%		61,9	59,1	59,6	59,8	63,0	72,2		
65-74 giovani anziani	STIMA	79.678	66.102	90.968	75.124	79.756	101.728	8,4	
	%	43,1	37,8	47,5	39,3	39,9	46,7		
75+ anziani	STIMA	31.265	29.688	18.659	31.490	25.325	28.872	3,7	
	%	26,9	22,5	15,2	24,2	20,9	27,9		
<b>TOTALE MASCHI</b>		STIMA	1.228.311	1.155.753	1.173.042	1.169.479	1.232.667	1.304.188	4,4
		%	65,3	61,2	61,7	61,1	64,4	68,2	
Femmine	14-17 adolescenti	STIMA	14.471	25.678	15.750	22.903	19.652	31.019	59,1
		%	20,3	31,6	17,8	32,4	23,5	32,3	
	18-24 giovani	STIMA	75.090	80.073	65.875	75.652	74.415	61.758	11,6
		%	37,1	44,2	40,0	43,3	45,9	41,4	
	25-44 giovani adulti	STIMA	367.431	347.757	370.921	348.872	345.553	343.335	-8,9
		%	52,6	49,3	52,0	48,6	48,2	47,9	
	45-64 adulti	STIMA	199.729	195.073	212.687	207.834	212.626	229.439	12,6
%		34,9	33,9	36,7	35,7	36,4	39,3		
65-74 giovani anziani	STIMA	42.027	44.935	30.450	40.566	51.042	65.513	33,3	
	%	18,0	17,7	12,3	17,0	19,2	24,0		
75+ anziani	STIMA	31.664	22.838	21.206	26.294	20.538	21.431	-24,6	
	%	14,2	11,2	9,7	11,2	9,9	10,7		
<b>TOTALE FEMMINE</b>		STIMA	730.412	716.354	716.889	722.121	723.827	752.495	2,2
		%	36,5	35,8	35,6	35,8	35,8	37,3	
<b>TOTALE</b>		STIMA	<b>1.958.723</b>	<b>1.872.107</b>	<b>1.889.931</b>	<b>1.891.600</b>	<b>1.956.494</b>	<b>2.056.683</b>	<b>3,6</b>
		%	<b>50,5</b>	<b>48,1</b>	<b>48,3</b>	<b>48,1</b>	<b>49,8</b>	<b>52,3</b>	

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

**Tabella 50/a e b) - Stima della frequenza assoluta e relativa dei consumatori di *OLTRE ½ LITRO DI BIRRA AL GIORNO* e variazione (%) osservata nelle prevalenze nel periodo 1998-2003 in Italia (a) e in Veneto (b)**

a) ITALIA			Anno						Δ % 1998/ 2003
			1998	1999	2000	2001	2002	2003	
Maschi	14-17 adolescenti	STIMA	13.429	6.154	3.856	6.287	10.428	6.385	-50,0
		%	1,0	0,5	0,3	0,5	0,8	0,5	
	18-24 giovani	STIMA	60.750	58.436	51.711	56.411	53.716	60.190	12,5
		%	2,4	2,2	2,1	2,4	2,3	2,7	
	25-44 giovani adulti	STIMA	252.618	250.214	240.946	231.092	249.483	187.927	-27,6
		%	2,9	2,8	2,7	2,6	2,8	2,1	
	45-64 adulti	STIMA	129.000	113.975	156.689	120.521	130.295	116.203	-11,1
	%	1,8	1,6	2,2	1,7	1,8	1,6		
65-74 giovani anziani	STIMA	17.853	21.185	36.179	26.958	22.251	23.840	28,6	
	%	0,7	0,8	1,4	1,0	0,8	0,9		
75+ anziani	STIMA	6.109	7.722	3.288	4.246	5.339	9.613	50,0	
	%	0,4	0,5	0,2	0,3	0,3	0,6		
<b>TOTALE MASCHI</b>	STIMA	479.759	457.686	492.670	445.516	471.513	404.159	-15,0	
	%	2,0	1,9	2,1	1,9	2,0	1,7		
Femmine	14-17 adolescenti	STIMA	1.698	1.335	2.211	3.252	3.838	581	-50,0
		%	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,05	
	18-24 giovani	STIMA	8.747	9.677	5.554	9.050	2.847	9.387	33,3
		%	0,3	0,4	0,2	0,4	0,1	0,4	
	25-44 giovani adulti	STIMA	35.000	34.377	25.281	27.459	38.011	23.843	-25,0
		%	0,4	0,4	0,3	0,3	0,4	0,3	
	45-64 adulti	STIMA	17.245	27.834	30.700	19.012	31.150	18.746	50,0
	%	0,2	0,4	0,4	0,3	0,4	0,3		
65-74 giovani anziani	STIMA	5.903	1.915	9.064	12.615	6.018	3.620	-50,0	
	%	0,2	0,1	0,3	0,4	0,2	0,1		
75+ anziani	STIMA	3.924	3.915	2.908	3.937	1.227	303	-95,0	
	%	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,01		
<b>TOTALE FEMMINE</b>	STIMA	72.518	79.053	75.718	75.324	83.091	56.479	-33,3	
	%	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2		
<b>TOTALE</b>	STIMA	<b>552.277</b>	<b>536.739</b>	<b>568.388</b>	<b>520.840</b>	<b>554.604</b>	<b>460.638</b>	<b>-18,2</b>	
	%	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,0</b>	<b>1,1</b>	<b>0,9</b>		

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

b) VENETO			Anno						Δ % 1998/ 2003
			1998	1999	2000	2001	2002	2003	
Maschi	14-17 adolescenti	STIMA	2.370	---	729	---	---	---	-100,0
		%	2,8	---	0,8	---	---	---	
	18-24 giovani	STIMA	2.000	8.405	3.676	2.657	4.312	4.181	150,0
		%	1,0	4,2	2,2	1,6	2,6	2,5	
	25-44 giovani adulti	STIMA	17.682	17.005	22.554	18.163	18.939	20.411	12,5
		%	2,4	2,3	3,0	2,4	2,5	2,7	
	45-64 adulti	STIMA	5.213	4.475	8.106	2.229	7.835	4.068	-22,2
%		0,9	0,8	1,4	0,4	1,3	0,7		
65-74 giovani anziani	STIMA	---	1.664	1.839	---	---	---	---	
	%	---	1,0	1,0	---	---	---		
75+ anziani	STIMA	2.148	1.744	---	---	1.234	---	-100,0	
	%	1,8	1,3	---	---	1,0	---		
<b>TOTALE MASCHI</b>		STIMA	29.412	33.293	36.903	23.050	32.319	28.659	-6,3
		%	1,6	1,8	1,9	1,2	1,7	1,5	
Femmine	14-17 adolescenti	STIMA	---	---	---	---	---	---	---
		%	---	---	---	---	---	---	
	18-24 giovani	STIMA	---	---	---	---	---	---	---
		%	---	---	---	---	---	---	
	25-44 giovani adulti	STIMA	2.758	3.260	4.250	4.494	4.261	---	---
		%	0,4	0,5	0,6	0,6	0,6	---	
	45-64 adulti	STIMA	2.453	3.017	2.728	---	4.318	1.282	-50,0
%		0,4	0,5	0,5	---	0,7	0,2		
65-74 giovani anziani	STIMA	203	---	---	---	---	---	-100,0	
	%	0,1	---	---	---	---	---		
75+ anziani	STIMA	---	---	---	---	---	---	---	
	%	---	---	---	---	---	---		
<b>TOTALE FEMMINE</b>		STIMA	5.414	6.278	6.978	4.494	8.579	1.282	-66,7
		%	0,3	0,3	0,3	0,2	0,4	0,1	
<b>TOTALE</b>		STIMA	<b>34.826</b>	<b>39.571</b>	<b>43.881</b>	<b>27.544</b>	<b>40.898</b>	<b>29.941</b>	<b>-11,1</b>
		%	<b>0,9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,1</b>	<b>0,7</b>	<b>1,0</b>	<b>0,8</b>	

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

**Tabella 51/a e b) - Stima della frequenza assoluta e relativa dei consumatori di *APERITIVI ALCOLICI* e variazione (%) osservata nelle prevalenze nel periodo 1998-2003 in Italia (a) e in Veneto (b)**

a) ITALIA		Anno						Δ % 1998/ 2003	
		1998	1999	2000	2001	2002	2003		
Maschi	14-17 adolescenti	STIMA %	257.548 19,1	232.465 19,7	283.131 22,4	281.185 22,4	257.366 20,3	330.910 24,8	30,0
	18-24 giovani	STIMA %	1.166.832 45,3	1.153.907 44,3	1.208.119 50,1	1.227.388 53,1	1.160.003 50,5	1.226.971 54,9	21,2
	25-44 giovani adulti	STIMA %	4.304.945 48,9	4.414.735 49,8	4.553.904 51,0	4.869.247 54,2	4.644.194 51,7	5.078.905 56,6	15,6
	45-64 adulti	STIMA %	2.509.174 35,9	2.753.267 39,3	2.776.677 39,3	2.881.490 40,5	2.764.178 38,8	3.041.023 42,7	18,9
	65-74 giovani anziani	STIMA %	510.019 19,5	569.035 21,6	593.736 22,5	615.279 22,5	592.996 22,2	608.738 23,0	17,9
	75+ anziani	STIMA %	156.090 10,7	175.315 11,6	164.633 10,4	188.288 11,9	177.630 10,8	210.011 12,6	18,0
	<b>TOTALE MASCHI</b>	STIMA %	8.904.608 37,4	9.298.723 39,0	9.580.200 40,1	10.062.877 42,0	9.596.367 40,0	10.496.558 43,8	17,1
Femmine	14-17 adolescenti	STIMA %	150.239 12,6	165.456 13,6	179.128 14,6	188.335 16,1	182.587 16,0	217.600 18,7	48,2
	18-24 giovani	STIMA %	714.408 27,6	687.332 28,2	693.856 30,0	714.034 31,6	706.841 30,8	783.932 34,6	25,4
	25-44 giovani adulti	STIMA %	1.835.505 21,2	1.962.833 22,4	2.120.455 24,1	2.137.563 24,2	2.085.100 23,6	2.344.330 26,5	25,4
	45-64 adulti	STIMA %	999.665 13,8	1.046.623 14,4	1.044.082 14,3	1.173.980 16,0	1.086.920 14,8	1.201.275 16,3	18,7
	65-74 giovani anziani	STIMA %	167.381 5,0	185.638 5,7	191.025 5,7	209.283 6,2	200.414 6,1	230.578 7,1	43,6
	75+ anziani	STIMA %	63.731 2,6	71.535 2,7	78.548 2,9	71.709 2,6	73.714 2,6	78.724 2,8	6,9
	<b>TOTALE FEMMINE</b>	STIMA %	3.930.929 15,4	4.119.416 16,1	4.307.094 16,8	4.494.905 17,5	4.335.576 16,8	4.856.440 18,9	22,7
<b>TOTALE</b>	<b>STIMA</b> %	<b>12.835.537</b> <b>26,0</b>	<b>13.418.139</b> <b>27,2</b>	<b>13.887.294</b> <b>28,0</b>	<b>14.557.782</b> <b>29,3</b>	<b>13.931.943</b> <b>28,0</b>	<b>15.352.998</b> <b>30,9</b>	<b>18,8</b>	

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

b) VENETO		Anno						Δ % 1998/ 2003	
		1998	1999	2000	2001	2002	2003		
Maschi	14-17 adolescenti	STIMA %	27.400 32,0	20.179 27,3	23.711 24,4	21.293 23,3	33.078 36,5	33.816 38,5	20,5
	18-24 giovani	STIMA %	107.944 54,6	117.852 59,4	105.955 64,1	101.302 62,0	115.305 70,3	119.880 71,9	31,7
	25-44 giovani adulti	STIMA %	408.232 55,7	381.043 51,4	401.588 53,5	438.572 57,9	437.969 57,9	495.244 65,4	17,5
	45-64 adulti	STIMA %	223.240 39,6	209.843 36,9	246.798 43,0	231.432 39,8	236.633 40,8	248.004 42,7	7,8
	65-74 giovani anziani	STIMA %	40.350 21,8	44.826 25,6	59.216 30,9	49.823 26,1	33.050 16,5	67.007 30,8	41,0
	75+ anziani	STIMA %	14.866 12,8	22.454 17,0	23.325 19,0	24.394 18,7	11.369 9,4	6.984 6,8	-47,1
	<b>TOTALE MASCHI</b>	STIMA %	822.032 43,7	796.197 42,2	860.593 45,3	866.816 45,3	867.404 45,3	970.935 50,7	16,0
Femmine	14-17 adolescenti	STIMA %	6.750 9,5	22.357 27,5	18.303 20,7	20.600 29,1	16.394 19,6	36.426 37,9	300,5
	18-24 giovani	STIMA %	81.146 40,1	69.609 38,4	66.406 40,3	82.511 47,2	82.486 50,9	79.122 53,0	32,1
	25-44 giovani adulti	STIMA %	190.751 27,3	209.747 29,7	217.917 30,6	207.059 28,9	216.238 30,1	243.134 33,9	24,1
	45-64 adulti	STIMA %	107.165 18,7	88.866 15,4	102.859 17,8	120.585 20,7	83.934 14,4	98.617 16,9	-9,7
	65-74 giovani anziani	STIMA %	16.939 7,3	16.509 6,5	23.734 9,6	22.325 9,4	20.055 7,5	39.044 14,3	97,0
	75+ anziani	STIMA %	11.454 5,1	9.307 4,6	12.763 5,9	4.282 1,8	6.355 3,1	4.164 2,1	-59,7
	<b>TOTALE FEMMINE</b>	STIMA %	414.205 20,7	416.395 20,8	441.983 22,0	457.362 22,7	425.463 21,1	500.507 24,8	19,8
<b>TOTALE</b>	STIMA %	<b>1.236.237</b> <b>31,9</b>	<b>1.212.592</b> <b>31,2</b>	<b>1.302.576</b> <b>33,3</b>	<b>1.324.178</b> <b>33,7</b>	<b>1.292.867</b> <b>32,9</b>	<b>1.471.442</b> <b>37,4</b>	<b>17,2</b>	

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

**Tabella 52/a e b) - Stima della frequenza assoluta e relativa dei consumatori di AMARI e variazione (%) osservata nelle prevalenze nel periodo 1998-2003 in Italia (a) e in Veneto (b)**

a) ITALIA		Anno						Δ % 1998/ 2003	
		1998	1999	2000	2001	2002	2003		
Maschi	14-17 adolescenti	STIMA	158.647	119.688	155.402	153.500	136.783	170.101	8,5
		%	11,8	10,1	12,3	12,3	10,8	12,8	
	18-24 giovani	STIMA	984.863	1.033.516	1.035.873	1.050.002	990.196	936.511	9,6
		%	38,3	39,6	43,0	45,4	43,1	41,9	
	25-44 giovani adulti	STIMA	4.700.624	4.820.546	4.809.858	5.023.662	4.789.330	4.831.113	0,7
		%	53,4	54,3	53,8	55,9	53,3	53,8	
	45-64 adulti	STIMA	3.204.000	3.336.090	3.368.947	3.439.832	3.269.527	3.487.021	6,8
%		45,9	47,6	47,7	48,3	45,9	49,0		
65-74 giovani anziani	STIMA	778.554	805.877	875.236	929.140	847.902	892.743	13,3	
	%	29,8	30,6	33,1	34,0	31,8	33,7		
75+ anziani	STIMA	331.778	275.733	324.211	340.788	328.759	378.627	0,1	
	%	22,7	18,2	20,5	21,5	19,9	22,7		
<b>TOTALE MASCHI</b>	STIMA	10.158.466	10.391.450	10.569.528	10.936.924	10.362.496	10.696.116	4,4	
	%	42,7	43,6	44,2	45,6	43,2	44,6		
Femmine	14-17 adolescenti	STIMA	57.089	58.184	62.182	70.052	64.121	78.688	41,0
		%	4,8	4,8	5,1	6,0	5,6	6,7	
	18-24 giovani	STIMA	412.238	417.700	405.308	405.239	367.357	383.357	6,3
		%	15,9	17,2	17,5	17,9	16,0	16,9	
	25-44 giovani adulti	STIMA	1.921.805	1.984.425	1.965.407	2.001.400	1.894.789	1.788.616	-8,6
		%	22,2	22,7	22,3	22,7	21,4	20,2	
	45-64 adulti	STIMA	1.336.179	1.379.088	1.498.502	1.461.174	1.397.254	1.323.138	-2,2
%		18,4	18,9	20,5	19,9	19,0	18,0		
65-74 giovani anziani	STIMA	355.050	332.197	294.353	336.950	302.804	339.271	-0,4	
	%	10,5	10,2	8,8	10,0	9,3	10,5		
75+ anziani	STIMA	123.230	119.639	155.019	152.620	146.708	133.883	-6,0	
	%	5,0	4,5	5,8	5,6	5,2	4,7		
<b>TOTALE FEMMINE</b>	STIMA	4.205.591	4.291.234	4.380.771	4.427.435	4.173.034	4.046.953	-4,3	
	%	16,4	16,8	17,1	17,2	16,2	15,7		
<b>TOTALE</b>		STIMA	<b>14.364.057</b>	<b>14.682.684</b>	<b>14.950.299</b>	<b>15.364.359</b>	<b>14.535.530</b>	<b>14.743.069</b>	<b>2,1</b>
		%	<b>29,1</b>	<b>29,7</b>	<b>30,2</b>	<b>30,9</b>	<b>29,2</b>	<b>29,7</b>	

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

b) VENETO		Anno						Δ % 1998/ 2003	
		1998	1999	2000	2001	2002	2003		
Maschi	14-17 adolescenti	STIMA	12.609	15.744	11.419	13.762	15.427	16.437	27,3
		%	14,7	21,3	11,8	15,1	17,0	18,7	
	18-24 giovani	STIMA	85.185	104.718	83.374	82.508	97.795	75.045	4,5
		%	43,1	52,8	50,4	50,5	59,7	45,0	
	25-44 giovani adulti	STIMA	403.739	383.729	389.324	429.797	398.858	415.808	-0,3
		%	55,1	51,8	51,9	56,8	52,7	54,9	
	45-64 adulti	STIMA	241.767	250.666	263.550	250.404	224.914	246.763	-0,9
%		42,9	44,1	45,9	43,1	38,7	42,5		
65-74 giovani anziani	STIMA	53.614	43.809	65.910	79.105	41.613	78.673	24,6	
	%	29,0	25,0	34,4	41,4	20,8	36,1		
75+ anziani	STIMA	25.645	28.639	35.875	31.469	15.651	19.483	-14,5	
	%	22,0	21,7	29,2	24,2	12,9	18,8		
<b>TOTALE MASCHI</b>	STIMA	822.560	827.304	849.452	887.046	794.259	852.209	1,8	
	%	43,7	43,8	44,7	46,3	41,5	44,5		
Femmine	14-17 adolescenti	STIMA	5.560	5.672	7.288	8.843	2.604	6.737	-10,1
		%	7,8	7,0	8,2	12,5	3,1	7,0	
	18-24 giovani	STIMA	39.715	42.617	34.761	39.547	36.636	34.311	17,0
		%	19,6	23,5	21,1	22,6	22,6	23,0	
	25-44 giovani adulti	STIMA	194.150	189.301	185.524	175.010	173.214	151.683	-23,9
		%	27,8	26,8	26,0	24,4	24,1	21,1	
	45-64 adulti	STIMA	129.096	116.551	137.414	132.653	102.915	116.064	-11,8
%		22,6	20,3	23,7	22,8	17,6	19,9		
65-74 giovani anziani	STIMA	39.427	31.357	32.725	37.660	27.881	36.739	-20,4	
	%	16,9	12,3	13,2	15,8	10,5	13,5		
75+ anziani	STIMA	15.274	15.820	18.318	17.059	16.669	12.205	-11,3	
	%	6,9	7,7	8,4	7,3	8,0	6,1		
<b>TOTALE FEMMINE</b>	STIMA	423.221	401.318	416.030	410.772	359.919	357.738	-16,5	
	%	21,2	20,0	20,7	20,4	17,8	17,7		
<b>TOTALE</b>	STIMA	<b>1.245.781</b>	<b>1.228.622</b>	<b>1.265.482</b>	<b>1.297.818</b>	<b>1.154.178</b>	<b>1.209.947</b>	<b>-4,0</b>	
	%	<b>32,1</b>	<b>31,6</b>	<b>32,3</b>	<b>33,0</b>	<b>29,4</b>	<b>30,8</b>		

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

**Tabella 53/a e b) Stima della frequenza assoluta e relativa dei consumatori di SUPERALCOLICI e variazione (%) osservata nelle prevalenze nel periodo 1998-2003 in Italia (a) e in Veneto (b)**

a) ITALIA		Anno						Δ % 1998/ 2003	
		1998	1999	2000	2001	2002	2003		
Maschi	14-17 adolescenti	STIMA	159.160	143.658	169.082	163.763	160.003	205.396	30,6
		%	11,8	12,1	13,4	13,1	12,6	15,4	
	18-24 giovani	STIMA	930.236	985.761	975.629	1.008.469	888.424	991.394	22,8
		%	36,1	37,8	40,5	43,6	38,7	44,4	
	25-44 giovani adulti	STIMA	3.911.938	4.033.016	4.088.265	4.395.532	4.070.073	4.114.257	3,1
		%	44,5	45,5	45,8	48,9	45,3	45,8	
	45-64 adulti	STIMA	2.841.454	2.952.938	2.947.585	3.093.566	2.890.217	3.075.176	6,2
%		40,7	42,1	41,7	43,5	40,6	43,2		
65-74 giovani anziani	STIMA	614.191	617.506	665.839	690.179	640.700	692.044	11,3	
	%	23,5	23,5	25,2	25,2	24,0	26,1		
75+ anziani	STIMA	213.321	196.418	190.677	216.751	231.017	259.349	6,7	
	%	14,6	13,0	12,0	13,7	14,0	15,6		
<b>TOTALE MASCHI</b>	STIMA	8.670.300	8.929.298	9.037.077	9.568.260	8.880.434	9.337.616	6,6	
	%	36,5	37,5	37,8	39,9	37,0	38,9		
Femmine	14-17 adolescenti	STIMA	82.563	103.316	82.131	95.959	84.517	117.490	45,6
		%	6,9	8,5	6,7	8,2	7,4	10,1	
	18-24 giovani	STIMA	486.685	467.678	483.676	483.605	466.480	501.904	17,9
		%	18,8	19,2	20,9	21,4	20,3	22,1	
	25-44 giovani adulti	STIMA	1.372.436	1.524.246	1.455.470	1.486.102	1.412.479	1.579.610	13,0
		%	15,8	17,4	16,5	16,8	16,0	17,9	
	45-64 adulti	STIMA	953.664	954.993	960.015	1.059.986	893.820	1.009.173	4,5
%		13,1	13,1	13,1	14,4	12,1	13,7		
65-74 giovani anziani	STIMA	201.675	186.613	186.066	165.810	175.515	188.850	-2,4	
	%	6,0	5,7	5,6	4,9	5,4	5,8		
75+ anziani	STIMA	64.903	77.002	77.884	92.506	87.747	84.564	12,8	
	%	2,6	2,9	2,9	3,4	3,1	3,0		
<b>TOTALE FEMMINE</b>	STIMA	3.161.925	3.313.846	3.245.241	3.383.968	3.120.559	3.481.590	8,9	
	%	12,4	12,9	12,6	13,2	12,1	13,5		
<b>TOTALE</b>		STIMA	<b>11.832.225</b>	<b>12.243.144</b>	<b>12.282.318</b>	<b>12.952.228</b>	<b>12.000.993</b>	<b>12.819.206</b>	<b>7,5</b>
		%	<b>24,0</b>	<b>24,8</b>	<b>24,8</b>	<b>26,1</b>	<b>24,1</b>	<b>25,8</b>	

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

b) VENETO			Anno						Δ % 1998/ 2003	
			1998	1999	2000	2001	2002	2003		
Maschi	14-17 adolescenti	STIMA	13.765	20.395	11.669	15.345	21.068	22.656	60,7	
		%	16,1	27,6	12,0	16,8	23,2	25,8		
	18-24 giovani	STIMA	92.518	106.661	89.612	88.480	89.049	90.733	16,3	
		%	46,8	53,8	54,2	54,2	54,3	54,4		
	25-44 giovani adulti	STIMA	376.638	362.741	378.108	416.855	369.634	401.916	3,3	
		%	51,4	48,9	50,4	55,1	48,8	53,1		
	45-64 adulti	STIMA	257.504	278.575	300.281	292.793	258.770	277.626	4,6	
%		45,7	49,0	52,3	50,4	44,6	47,8			
65-74 giovani anziani	STIMA	55.453	43.975	64.618	64.625	47.192	79.914	22,3		
	%	30,0	25,1	33,8	33,8	23,6	36,7			
75+ anziani	STIMA	21.130	30.554	32.474	31.088	20.360	24.862	32,4		
	%	18,2	23,1	26,4	23,9	16,8	24,0			
<b>TOTALE MASCHI</b>		STIMA	817.008	842.900	876.762	909.186	806.073	897.707	8,1	
		%	43,4	44,6	46,1	47,5	42,1	46,9		
Femmine	14-17 adolescenti	STIMA	4.104	13.704	10.803	18.452	12.133	16.699	202,0	
		%	5,8	16,8	12,2	26,1	14,5	17,4		
	18-24 giovani	STIMA	63.626	56.444	48.369	54.440	51.116	50.220	6,9	
		%	31,5	31,1	29,4	31,2	31,6	33,6		
	25-44 giovani adulti	STIMA	136.730	183.534	160.751	146.351	161.760	162.950	16,0	
		%	19,6	26,0	22,5	20,4	22,6	22,7		
	45-64 adulti	STIMA	99.750	101.771	129.234	112.313	107.630	95.671	-5,9	
%		17,4	17,7	22,3	19,3	18,5	16,4			
65-74 giovani anziani	STIMA	25.557	29.122	29.578	20.154	21.422	29.042	-2,9		
	%	11,0	11,5	11,9	8,5	8,1	10,7			
75+ anziani	STIMA	13.576	17.834	13.579	6.760	7.485	9.420	-23,0		
	%	6,1	8,7	6,2	2,9	3,6	4,7			
<b>TOTALE FEMMINE</b>		STIMA	343.345	402.411	392.315	358.471	361.546	364.002	4,7	
		%	17,2	20,1	19,5	17,8	17,9	18,0		
<b>TOTALE</b>			STIMA	<b>1.160.353</b>	<b>1.245.311</b>	<b>1.269.077</b>	<b>1.267.657</b>	<b>1.167.619</b>	<b>1.261.709</b>	<b>7,4</b>
			%	<b>29,9</b>	<b>32,0</b>	<b>32,4</b>	<b>32,2</b>	<b>29,7</b>	<b>32,1</b>	

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

**Tabella 54/a e b) - Stima della frequenza assoluta e relativa dei consumatori di *ALCOLICI FUORI PASTO* e variazione (%) osservata nelle prevalenze nel periodo 1998-2003 in Italia (a) e in Veneto (b)**

a) ITALIA		Anno						Δ % 1998/ 2003	
		1998	1999	2000	2001	2002	2003		
Maschi	14-17 adolescenti	STIMA	205.030	213.353	212.391	214.645	232.323	330.910	63,2
		%	15,2	18,0	16,8	17,1	18,3	24,8	
	18-24 giovani	STIMA	1.026.251	1.024.334	1.023.308	1.069.239	958.439	1.226.971	37,6
		%	39,9	39,3	42,5	46,2	41,7	54,9	
	25-44 giovani adulti	STIMA	4.066.230	3.571.969	3.516.899	3.915.567	3.619.466	5.078.905	22,5
		%	46,2	40,3	39,4	43,6	40,3	56,6	
	45-64 adulti	STIMA	2.951.471	2.572.112	2.635.461	2.731.865	2.544.624	3.041.023	0,9
%		42,3	36,7	37,3	38,4	35,8	42,7		
65-74 giovani anziani	STIMA	786.037	706.829	745.934	788.036	717.722	608.738	-23,3	
	%	30,0	26,9	28,2	28,8	26,9	23,0		
75+ anziani	STIMA	310.825	288.792	259.243	341.821	345.150	210.011	-40,6	
	%	21,2	19,1	16,4	21,6	20,9	12,6		
<b>TOTALE MASCHI</b>	STIMA	9.345.845	8.377.388	8.393.236	9.061.173	8.417.724	9.115.945	-3,3	
	%	39,3	35,2	35,1	37,8	35,1	38,0		
Femmine	14-17 adolescenti	STIMA	115.876	155.947	149.789	161.403	130.550	217.600	92,8
		%	9,7	12,8	12,2	13,8	11,5	18,7	
	18-24 giovani	STIMA	539.629	613.077	574.090	570.850	609.229	783.932	66,3
		%	20,8	25,2	24,8	25,2	26,5	34,6	
	25-44 giovani adulti	STIMA	1.335.738	1.346.166	1.357.594	1.426.157	1.352.451	2.344.330	72,1
		%	15,4	15,4	15,4	16,1	15,3	26,5	
	45-64 adulti	STIMA	898.025	830.024	798.582	871.366	761.678	1.201.275	31,5
%		12,4	11,4	10,9	11,8	10,4	16,3		
65-74 giovani anziani	STIMA	214.988	201.437	187.448	205.490	172.164	230.578	10,9	
	%	6,4	6,2	5,6	6,1	5,3	7,1		
75+ anziani	STIMA	92.331	105.672	108.857	130.697	91.222	78.724	-24,3	
	%	3,7	4,0	4,1	4,8	3,2	2,8		
<b>TOTALE FEMMINE</b>	STIMA	3.196.587	3.252.323	3.176.359	3.365.962	3.117.294	3.686.105	14,4	
	%	12,5	12,7	12,4	13,1	12,1	14,3		
<b>TOTALE</b>		STIMA	<b>12.542.432</b>	<b>11.629.711</b>	<b>11.569.595</b>	<b>12.427.135</b>	<b>11.535.018</b>	<b>12.802.050</b>	<b>1,6</b>
		%	<b>25,4</b>	<b>23,5</b>	<b>23,3</b>	<b>25,0</b>	<b>23,2</b>	<b>25,8</b>	

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

b) VENETO		Anno						Δ % 1998/ 2003	
		1998	1999	2000	2001	2002	2003		
Maschi	14-17 adolescenti	STIMA	17.150	20.381	22.837	24.299	35.998	28.339	61,5
		%	20,0	27,6	23,5	26,6	39,7	32,3	
	18-24 giovani	STIMA	106.846	116.157	112.079	115.347	110.844	106.856	18,7
		%	54,0	58,6	67,8	70,6	67,6	64,1	
	25-44 giovani adulti	STIMA	404.788	379.414	365.663	418.484	417.124	463.104	10,9
		%	55,2	51,2	48,7	55,3	55,1	61,2	
	45-64 adulti	STIMA	317.277	319.548	331.759	308.625	310.754	319.809	-2,1
	%	56,3	56,2	57,8	53,1	53,5	55,1		
65-74 giovani anziani	STIMA	72.663	78.921	87.018	93.883	88.151	105.818	23,7	
	%	39,3	45,1	45,5	49,1	44,1	48,6		
75+ anziani	STIMA	35.092	46.558	36.655	42.629	43.265	35.761	15,0	
	%	30,1	35,3	29,8	32,8	35,6	34,6		
<b>TOTALE MASCHI</b>	STIMA	953.816	960.980	956.010	1.003.268	1.006.136	1.059.688	9,3	
	%	50,7	50,9	50,3	52,4	52,6	55,4		
Femmine	14-17 adolescenti	STIMA	9.045	18.651	15.761	20.290	12.628	32.353	165,4
		%	12,7	22,9	17,8	28,7	15,1	33,7	
	18-24 giovani	STIMA	70.269	70.974	63.021	73.707	66.329	71.219	37,5
		%	34,7	39,1	38,3	42,2	40,9	47,7	
	25-44 giovani adulti	STIMA	157.576	191.680	159.847	178.350	192.019	190.663	17,7
		%	22,6	27,1	22,4	24,9	26,8	26,6	
	45-64 adulti	STIMA	101.449	106.957	116.996	119.726	111.005	110.315	6,8
	%	17,7	18,6	20,2	20,6	19,0	18,9		
65-74 giovani anziani	STIMA	25.191	30.504	29.021	30.020	16.976	28.930	-1,9	
	%	10,8	12,0	11,7	12,6	6,4	10,6		
75+ anziani	STIMA	5.260	14.147	23.502	11.667	10.497	17.922	270,8	
	%	2,4	6,9	10,8	5,0	5,1	8,9		
<b>TOTALE FEMMINE</b>	STIMA	368.790	432.914	408.148	433.761	409.454	451.402	21,7	
	%	18,4	21,6	20,3	21,5	20,3	22,4		
<b>TOTALE</b>	STIMA	<b>1.322.606</b>	<b>1.393.894</b>	<b>1.364.158</b>	<b>1.437.029</b>	<b>1.415.590</b>	<b>1.511.090</b>	<b>12,6</b>	
	%	<b>34,1</b>	<b>35,8</b>	<b>34,9</b>	<b>36,5</b>	<b>36,0</b>	<b>38,4</b>		

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

**Tabella 55/a e b) - Stima della frequenza assoluta e relativa dei consumatori di VINO AL DI SOTTO DELL'ETA' LEGALE e variazione (%) osservata nelle prevalenze nel periodo 1998-2003 in Italia (a) e in Veneto (b)**

a) ITALIA			Anno						Δ % 1998/ 2003
			1998	1999	2000	2001	2002	2003	
Maschi	14 anni	STIMA	35.333	44.294	47.014	45.673	48.805	31.406	0,0
		%	10,8	14,1	16,1	13,9	15,5	10,8	
	15 anni	STIMA	58.910	47.692	68.166	58.912	50.219	58.715	-11,7
		%	18,0	17,7	20,2	19,8	15,7	15,9	
	16 anni	STIMA	99.816	77.457	81.989	91.809	66.616	98.051	-2,4
		%	28,9	25,8	26,0	26,9	21,2	28,2	
	<b>TOTALE MASCHI</b>	STIMA	194.059	169.443	197.169	196.394	165.640	188.172	61,7
		%	11,5	13,8	11,7	13,8	9,3	18,6	
Femmine	14 anni	STIMA	25.246	20.925	18.545	28.205	17.053	22.960	-22,3
		%	9,4	7,3	6,2	10,0	6,2	7,3	
	15 anni	STIMA	38.518	55.764	35.509	53.032	24.009	36.515	-0,8
		%	12,8	17,3	12,6	16,6	8,7	12,7	
	16 anni	STIMA	37.943	47.950	54.524	41.145	39.655	33.043	-1,7
		%	12,0	16,2	15,7	14,5	12,5	11,8	
	<b>TOTALE FEMMINE</b>	STIMA	101.707	124.639	108.578	122.382	80.717	92.518	-8,7
		%	11,5	13,8	11,7	13,8	9,3	10,5	
<b>TOTALE</b>		STIMA	295.766	294.082	305.747	318.776	246.357	280.690	-5,7
		%	15,7	16,5	16,3	17,2	13,5	14,8	
<b>b) VENETO</b>									
Maschi	14 anni	STIMA	234	1.505	5.429	1.117	5.823	3.127	855,6
		%	1,8	9,2	25,6	4,9	29,5	17,2	
	15 anni	STIMA	2.958	4.276	7.331	3.750	1.324	10.915	175,0
		%	12,4	21,4	24,9	13,8	10,3	34,1	
	16 anni	STIMA	8.428	4.773	6.862	5.144	9.121	6.176	28,5
		%	33,0	23,4	25,9	21,9	30,6	42,4	
	<b>TOTALE MASCHI</b>	STIMA	11.620	10.554	19.622	10.011	16.268	20.218	66,8
		%	18,7	18,6	25,4	13,7	26,1	31,19	
Femmine	14 anni	STIMA	1.027	992	2.350	---	---	---	-100,0
		%	6,3	4,0	10,9	---	---	---	
	15 anni	STIMA	2.925	1.251	3.260	2.472	1.761	5.551	47,6
		%	14,7	6,0	16,2	13,2	8,3	21,7	
	16 anni	STIMA	2.985	6.434	3.850	3.833	6.504	1.430	-62,9
		%	15,9	34,3	16,0	19,5	18,6	5,9	
	<b>TOTALE FEMMINE</b>	STIMA	6.937	8.677	9.460	6.305	8.265	6.981	-21,4
		%	12,6	13,5	14,4	11,8	10,6	9,9	
<b>TOTALE</b>		STIMA	<b>18.557</b>	<b>19.231</b>	<b>29.082</b>	<b>16.316</b>	<b>24.533</b>	<b>27.199</b>	<b>27,2</b>
		%	<b>15,8</b>	<b>15,9</b>	<b>20,3</b>	<b>12,9</b>	<b>17,5</b>	<b>20,1</b>	

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

**Tabella 56/a e b) - Stima della frequenza assoluta e relativa dei consumatori di BIRRA AL DI SOTTO DELL'ETA' LEGALE e variazione (%) osservata nelle prevalenze nel periodo 1998-2003 in Italia (a) e in Veneto (b)**

a) ITALIA			Anno						Δ % 1998/ 2003
			1998	1999	2000	2001	2002	2003	
Maschi	14 anni	STIMA	63.161	74.282	65.929	84.122	78.851	55.748	-1,5
		%	19,4	23,7	22,5	25,7	25,1	19,1	
	15 anni	STIMA	108.403	104.007	117.035	105.061	100.813	114.177	-6,9
		%	33,1	38,6	34,7	35,4	31,5	30,8	
16 anni	STIMA	173.640	144.175	145.740	165.167	132.635	154.476	-11,6	
	%	50,2	48,1	46,2	48,4	42,2	44,4		
TOTALE MASCHI	STIMA	345.204	322.464	328.704	354.350	312.299	324.401	-6,9	
	%	34,5	36,5	34,8	36,7	32,9	32,13		
Femmine	14 anni	STIMA	47.494	46.898	36.912	47.914	30.473	39.994	-28,1
		%	17,8	16,4	12,3	17,0	11,0	12,8	
	15 anni	STIMA	68.778	76.818	66.412	77.306	35.149	60.685	-7,9
		%	22,9	23,9	23,5	24,1	12,7	21,1	
	16 anni	STIMA	98.843	91.712	100.431	91.242	89.158	76.849	-12,5
		%	31,2	31,0	29,0	32,3	28,1	27,3	
	TOTALE FEMMINE	STIMA	215.115	215.428	203.755	216.462	154.780	177.528	-17,3
		%	24,3	23,8	21,9	24,5	17,8	20,1	
TOTALE		STIMA	<b>560.319</b>	<b>537.892</b>	<b>532.459</b>	<b>570.812</b>	<b>467.079</b>	<b>501.929</b>	<b>10,8</b>
		%	<b>29,7</b>	<b>30,1</b>	<b>28,4</b>	<b>30,8</b>	<b>25,7</b>	<b>26,5</b>	
b) VENETO									
Maschi	14 anni	STIMA	509	2.778	5.482	3.347	7.312	5.255	620,0
		%	4,0	16,9	25,8	14,8	37,1	28,8	
	15 anni	STIMA	4.304	6.328	8.962	6.578	2.515	14.150	144,2
		%	18,1	31,7	30,4	24,2	19,6	44,2	
16 anni	STIMA	11.520	5.489	13.152	8.617	15.678	5.819	-11,3	
	%	45,0	27,0	49,6	36,7	52,6	39,9		
TOTALE MASCHI	STIMA	16.333	14.595	27.596	18.542	25.505	25.224	48,0	
	%	26,3	25,7	35,7	25,3	40,9	38,92		
Femmine	14 anni	STIMA	1.027	2.715	2.271	1.171	3.231	1.001	-22,2
		%	6,3	11,0	10,6	7,6	14,8	4,9	
	15 anni	STIMA	2.860	7.122	1.072	8.371	3.175	11.836	221,5
		%	14,4	34,3	5,3	44,8	15,0	46,3	
	16 anni	STIMA	8.034	10.616	6.195	5.391	11.841	6.411	-38,2
		%	42,9	56,6	25,7	27,4	33,9	26,5	
	TOTALE FEMMINE	STIMA	11.921	20.453	9.538	14.933	18.247	19.248	25,8
		%	21,7	31,8	14,5	27,8	23,4	27,3	
TOTALE		STIMA	<b>28.254</b>	<b>35.048</b>	<b>37.134</b>	<b>33.475</b>	<b>43.752</b>	<b>44.472</b>	
		%	<b>24,1</b>	<b>29,0</b>	<b>26,0</b>	<b>26,4</b>	<b>31,2</b>	<b>32,9</b>	

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

**Tabella 57/a e b) - Stima della frequenza assoluta e relativa dei consumatori di *APERITIVI ALCOLICI AL DI SOTTO DELL'ETA' LEGALE* e variazione (%) osservata nelle prevalenze nel periodo 1998-2003 in Italia (a) e in Veneto (b)**

a) ITALIA			Anno						Δ % 1998/ 2003
			1998	1999	2000	2001	2002	2003	
Maschi	14 anni	STIMA	25.146	31.400	29.353	30.169	40.379	30.673	36,4
		%	7,7	10,0	10,0	9,2	12,9	10,5	
	15 anni	STIMA	37.525	38.953	70.620	63.661	45.677	71.223	68,4
		%	11,4	14,5	21,0	21,4	14,3	19,2	
16 anni	STIMA	84.046	70.318	73.392	94.787	68.817	110.875	31,3	
	%	24,3	23,5	23,3	27,8	21,9	31,9		
TOTALE MASCHI	STIMA	146.717	140.671	173.365	188.617	154.873	212.771	43,3	
	%	14,7	15,9	18,3	19,5	16,3	21,07		
Femmine	14 anni	STIMA	19.253	24.593	18.171	24.379	24.915	28.212	25,0
		%	7,2	8,6	6,0	8,6	9,0	9,0	
	15 anni	STIMA	37.713	25.674	27.010	40.716	27.183	41.470	15,2
		%	12,5	8,0	9,6	12,7	9,8	14,4	
16 anni	STIMA	37.530	50.090	50.476	56.022	58.863	71.365	113,4	
	%	11,9	17,0	14,6	19,8	18,6	25,4		
TOTALE FEMMINE	STIMA	94.496	100.357	95.657	121.117	110.961	141.047	49,5	
	%	10,7	11,1	10,3	13,7	12,7	16,0		
TOTALE	STIMA	<b>241.213</b>	<b>241.028</b>	<b>269.022</b>	<b>309.734</b>	<b>265.834</b>	<b>353.818</b>	<b>46,1</b>	
	%	<b>12,8</b>	<b>13,5</b>	<b>14,3</b>	<b>16,7</b>	<b>14,6</b>	<b>18,7</b>		
b) VENETO									
Maschi	14 anni	STIMA	203	2.937	2.879	---	3.634	1.380	375,0
		%	1,6	17,9	13,6	---	18,4	7,6	
	15 anni	STIMA	3.227	4.405	9.213	6.330	1.279	6.729	54,4
		%	13,6	22,1	31,3	23,3	10,0	21,0	
16 anni	STIMA	11.898	5.665	5.928	8.738	11.322	12.340	81,9	
	%	46,5	27,8	22,4	37,2	38,0	84,6		
TOTALE MASCHI	STIMA	15.328	13.007	18.020	15.068	16.235	20.449	27,7	
	%	24,7	22,9	23,3	20,6	26,0	31,55		
Femmine	14 anni	STIMA	1.027	2.963	1.409	1.077	---	1.327	1,6
		%	6,3	12,0	6,6	7,0	---	6,4	
	15 anni	STIMA	3.702	2.943	1.072	3.786	3.175	10.960	130,6
		%	18,6	14,2	5,3	20,3	15,0	42,9	
16 anni	STIMA	1.834	8.053	4.199	8.892	10.266	8.362	252,0	
	%	9,8	43,0	17,4	45,3	29,4	34,5		
TOTALE FEMMINE	STIMA	6.563	13.959	6.680	13.755	13.441	20.649	146,2	
	%	11,9	21,7	10,2	25,6	17,3	29,3		
TOTALE	STIMA	<b>21.891</b>	<b>26.966</b>	<b>24.700</b>	<b>28.823</b>	<b>29.676</b>	<b>41.098</b>	<b>62,6</b>	
	%	<b>18,7</b>	<b>22,3</b>	<b>17,3</b>	<b>22,7</b>	<b>21,2</b>	<b>30,4</b>		

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

**Tabella 58/a e b) - Stima della frequenza assoluta e relativa dei consumatori di AMARI AL DI SOTTO DELL'ETA' LEGALE e variazione (%) osservata nelle prevalenze nel periodo 1998-2003 in Italia (a) e in Veneto (b)**

a) ITALIA			Anno						Δ % 1998/ 2003
			1998	1999	2000	2001	2002	2003	
Maschi	14 anni	STIMA	15.552	12.803	16.563	17.917	15.006	11.805	-14,6
		%	4,8	4,1	5,7	5,5	4,8	4,1	
	15 anni	STIMA	25.409	23.477	34.409	30.009	18.165	37.549	31,2
		%	7,7	8,7	10,2	10,1	5,7	10,1	
16 anni	STIMA	51.797	35.763	45.873	46.212	38.204	48.438	-7,3	
	%	15,0	11,9	14,5	13,6	12,2	13,9		
TOTALE MASCHI	STIMA	92.758	72.043	96.845	94.138	71.375	97.792	4,2	
	%	9,3	8,2	10,2	9,8	7,5	9,69		
Femmine	14 anni	STIMA	10.629	8.661	8.953	5.549	4.613	12.776	2,5
		%	4,0	3,0	3,0	2,0	1,7	4,1	
	15 anni	STIMA	14.473	10.013	11.114	9.406	7.924	14.766	6,3
		%	4,8	3,1	3,9	2,9	2,9	5,1	
16 anni	STIMA	13.328	18.235	16.581	19.899	24.328	22.390	90,5	
	%	4,2	6,2	4,8	7,0	7,7	8,0		
TOTALE FEMMINE	STIMA	38.430	36.909	36.648	34.854	36.865	49.932	32,6	
	%	4,3	4,1	3,9	3,9	4,2	5,7		
TOTALE	STIMA	<b>131.188</b>	<b>108.952</b>	<b>133.493</b>	<b>128.992</b>	<b>108.240</b>	<b>147.724</b>	<b>11,4</b>	
	%	<b>7,0</b>	<b>6,1</b>	<b>7,1</b>	<b>7,0</b>	<b>6,0</b>	<b>7,8</b>		
b) VENETO									
Maschi	14 anni	STIMA	---	1.505	2.942	1.777	---	1.380	---
		%	---	9,2	13,9	7,9	---	7,6	
	15 anni	STIMA	1.856	4.113	2.785	4.124	---	3.160	26,9
		%	7,8	20,6	9,4	15,2	---	9,9	
16 anni	STIMA	5.161	3.747	863	2.689	5.170	3.688	25,2	
	%	20,2	18,4	3,3	11,4	17,3	25,3		
TOTALE MASCHI	STIMA	7.017	9.365	6.590	8.590	5.170	8.228	12,4	
	%	11,3	16,5	8,5	11,7	8,3	12,70		
Femmine	14 anni	STIMA	1.027	992	---	---	---	---	-100,0
		%	6,3	4,0	---	---	---	---	
	15 anni	STIMA	1.868	---	1.072	1.163	---	1.405	-41,5
		%	9,4	---	5,3	6,2	---	5,5	
16 anni	STIMA	2.665	3.600	1.657	2.118	1.200	---	-100,0	
	%	14,2	19,2	6,9	10,8	3,4	---		
TOTALE FEMMINE	STIMA	5.560	4.592	2.729	3.281	1.200	1.405	-80,2	
	%	10,1	7,1	4,1	6,1	1,5	2,0		
TOTALE	STIMA	<b>12.577</b>	<b>13.957</b>	<b>9.319</b>	<b>11.871</b>	<b>6.370</b>	<b>9.633</b>	<b>-33,6</b>	
	%	<b>10,7</b>	<b>11,5</b>	<b>6,5</b>	<b>9,4</b>	<b>4,5</b>	<b>7,1</b>		

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

**Tabella 59/a e b) - Stima della frequenza assoluta e relativa dei consumatori di SUPERALCOLICI AL DI SOTTO DELL'ETA' LEGALE e variazione (%) osservata nelle prevalenze nel periodo 1998-2003 in Italia (a) e in Veneto (b)**

a) ITALIA			Anno						Δ % 1998/ 2003
			1998	1999	2000	2001	2002	2003	
Maschi	14 anni	STIMA	11.072	14.005	10.079	12.241	17.303	11.411	14,7
		%	3,4	4,5	3,4	3,7	5,5	3,9	
	15 anni	STIMA	27.023	26.209	31.887	25.367	18.893	32.692	7,3
		%	8,2	9,7	9,5	8,5	5,9	8,8	
	16 anni	STIMA	55.564	44.564	54.876	52.976	42.741	77.570	38,5
		%	16,1	14,9	17,4	15,5	13,6	22,3	
	<b>TOTALE MASCHI</b>	STIMA	93.659	84.778	96.842	90.584	78.937	121.673	28,2
		%	9,4	9,6	10,2	9,4	8,3	12,05	
Femmine	14 anni	STIMA	10.873	14.341	4.305	4.493	1.185	8.117	-36,6
		%	4,1	5,0	1,4	1,6	0,4	2,6	
	15 anni	STIMA	17.343	13.116	12.124	22.301	11.229	18.445	10,3
		%	5,8	4,1	4,3	7,0	4,0	6,4	
	16 anni	STIMA	24.440	29.238	27.252	29.388	38.423	35.636	64,9
		%	7,7	9,9	7,9	10,4	12,1	12,7	
	<b>TOTALE FEMMINE</b>	STIMA	52.656	56.695	43.681	56.182	50.837	62.198	18,3
		%	6,0	6,3	4,7	6,3	5,8	7,1	
<b>TOTALE</b>			<b>146.315</b>	<b>141.473</b>	<b>140.523</b>	<b>146.766</b>	<b>129.774</b>	<b>183.871</b>	<b>24,4</b>
			<b>7,8</b>	<b>7,9</b>	<b>7,5</b>	<b>7,9</b>	<b>7,1</b>	<b>9,7</b>	
b) VENETO									
Maschi	14 anni	STIMA	---	1.505	1.043	1.333	2.364	1.380	---
		%	---	9,2	4,9	5,9	12,0	7,6	
	15 anni	STIMA	2.554	4.280	2.785	4.667	---	4.427	29,0
		%	10,7	21,4	9,4	17,2	---	13,8	
	16 anni	STIMA	5.142	5.833	3.121	5.265	7.105	8.778	199,5
		%	20,1	28,6	11,8	22,4	23,8	60,2	
	<b>TOTALE MASCHI</b>	STIMA	7.696	11.618	6.949	11.265	9.469	14.585	81,5
		%	12,4	20,5	9,0	15,4	15,2	22,5	
Femmine	14 anni	STIMA	1.027	992	---	1.077	---	---	-100,0
		%	6,3	4,0	---	7,0	---	---	
	15 anni	STIMA	218	2.509	---	4.277	1.414	5.654	1909,1
		%	1,1	12,1	---	22,9	6,7	22,1	
	16 anni	STIMA	2.859	5.961	3.141	7.536	9.314	1.406	-62,1
		%	15,3	31,8	13,0	38,4	26,7	5,8	
	<b>TOTALE FEMMINE</b>	STIMA	4.104	9.462	3.141	12.890	10.728	7.060	33,3
		%	7,5	14,7	4,8	24,0	13,8	10,0	
<b>TOTALE</b>			<b>11.800</b>	<b>21.080</b>	<b>10.090</b>	<b>24.155</b>	<b>20.197</b>	<b>21.645</b>	<b>58,4</b>
			<b>10,1</b>	<b>17,4</b>	<b>7,1</b>	<b>19,0</b>	<b>14,4</b>	<b>16,0</b>	

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

**Tabella 60/a e b) - Stima della frequenza assoluta e relativa dei consumatori di *ALCOLCI FUORI PASTO AL DI SOTTO DELL'ETA' LEGALE* e variazione (%) osservata nelle prevalenze nel periodo 1998-2003 in Italia (a) e in Veneto (b)**

a) ITALIA			Anno					Δ % 1998/ 2003	
			1998	1999	2000	2001	2002		2003
Maschi	14 anni	STIMA	19.958	18.245	24.926	18.671	31.886	29.959	68,9
		%	6,1	5,8	8,5	5,7	10,2	10,3	
	15 anni	STIMA	32.484	43.839	49.086	37.577	39.254	56.616	54,5
		%	9,9	16,3	14,6	12,7	12,3	15,3	
16 anni	STIMA	74.834	63.932	52.999	70.797	57.781	96.674	28,7	
	%	21,6	21,3	16,8	20,8	18,4	27,8		
<b>TOTALE MASCHI</b>	STIMA	127.276	126.016	127.011	127.045	128.921	183.249	42,9	
	%	12,7	14,3	13,4	13,2	13,6	18,15		
Femmine	14 anni	STIMA	16.818	15.871	13.012	15.560	6.712	21.700	9,5
		%	6,3	5,5	4,3	5,5	2,4	6,9	
	15 anni	STIMA	24.723	20.158	25.363	32.810	26.643	32.658	39,0
		%	8,2	6,3	9,0	10,2	9,6	11,4	
16 anni	STIMA	35.177	50.211	47.227	50.222	40.081	67.968	118,0	
	%	11,1	17,0	13,6	17,8	12,6	24,2		
<b>TOTALE FEMMINE</b>	STIMA	76.718	86.240	85.602	98.592	73.436	122.326	59,8	
	%	8,7	9,5	9,2	11,1	8,4	13,9		
<b>TOTALE</b>			<b>203.994</b>	<b>212.256</b>	<b>212.613</b>	<b>225.637</b>	<b>202.357</b>	<b>305.575</b>	<b>50,0</b>
		%	<b>10,8</b>	<b>11,9</b>	<b>11,3</b>	<b>12,2</b>	<b>11,1</b>	<b>16,2</b>	
<b>b) VENETO</b>									
Maschi	14 anni	STIMA	---	---	1.836	1.333	3.430	4.389	---
		%	---	---	8,7	5,9	17,4	24,1	
	15 anni	STIMA	2.946	4.357	7.259	5.472	1.324	6.262	58,1
		%	12,4	21,8	24,6	20,2	10,3	19,6	
16 anni	STIMA	6.704	5.353	5.478	8.738	11.362	6.959	82,1	
	%	26,2	26,3	20,7	37,2	38,1	47,7		
<b>TOTALE MASCHI</b>	STIMA	9.650	9.710	14.573	15.543	16.116	17.610	75,3	
	%	15,5	17,1	18,9	21,2	25,8	27,17		
Femmine	14 anni	STIMA	1.027	2.205	1.409	---	---	1.001	-22,2
		%	6,3	8,9	6,6	---	---	4,9	
	15 anni	STIMA	1.289	1.036	2.142	4.798	1.414	11.285	580,0
		%	6,5	5,0	10,6	25,7	6,7	44,2	
16 anni	STIMA	2.912	10.295	5.148	9.063	9.808	8.362	122,6	
	%	15,5	54,9	21,3	46,1	28,1	34,5		
<b>TOTALE FEMMINE</b>	STIMA	5.228	13.536	8.699	13.861	11.222	20.648	208,4	
	%	9,5	21,1	13,2	25,8	14,4	29,3		
<b>TOTALE</b>		STIMA	<b>14.878</b>	<b>23.246</b>	<b>23.272</b>	<b>29.404</b>	<b>27.338</b>	<b>38.258</b>	<b>122,8</b>
		%	<b>12,7</b>	<b>19,2</b>	<b>16,3</b>	<b>23,2</b>	<b>19,5</b>	<b>28,3</b>	

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

**Tabella 61 - Distribuzione percentuale dei consumatori di VINO di 14 anni e più secondo le classi di età, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto**

Età in classi	Consumo		Più di 1 litro al giorno	Tra 1 e 1/2 litro al giorno	Oltre 1/2 litro al giorno	1-2 bicchieri al giorno		Più raramente		Solo Stagionalmente	
	VENETO	ITALIA	VENETO	VENETO	VENETO	ITALIA	VENETO	ITALIA	VENETO	ITALIA	
14	34,3		---	---	---		---		20,4		13,8
15	10,3		---	---	---		---		---		10,3
16	30,6		---	---	---		---		15,6		15,0
17	51,9		---	---	---		4,5		27,7		19,7
<b>14-17</b>	<b>35,2</b>	<b>22,7</b>	---	---	---	---	<b>1,5</b>	<b>4,4</b>	<b>18,1</b>	<b>13,5</b>	<b>15,6</b>
18	75,0		---	---	---		16,8		58,2		---
19	77,0		---	---	---		10,2		49,4		17,3
<b>18-19</b>	<b>76,2</b>	<b>42,4</b>	---	---	---	<b>1,4</b>	<b>12,8</b>	<b>8,1</b>	<b>52,9</b>	<b>27,7</b>	<b>10,4</b>
<b>20-24</b>	<b>58,1</b>	<b>50,7</b>	---	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>1,7</b>	<b>10,6</b>	<b>12,7</b>	<b>38,3</b>	<b>30,3</b>	<b>8,4</b>
25-29	66,1		0,7	---	0,7		18,1		44,7		2,6
30-34	73,0		---	1,4	1,4		28,4		38,8		4,4
<b>25-34</b>	<b>69,6</b>	<b>68,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,7</b>	<b>1,1</b>	<b>3,6</b>	<b>23,4</b>	<b>27,4</b>	<b>41,6</b>	<b>32,4</b>	<b>3,5</b>
35-39	71,3		---	5,2	5,2		32,1		31,2		2,9
40-44	84,7		0,8	4,2	5,0		55,0		23,3		1,4
<b>35-44</b>	<b>78,0</b>	<b>75,9</b>	<b>0,4</b>	<b>4,7</b>	<b>5,1</b>	<b>7,2</b>	<b>43,6</b>	<b>38,1</b>	<b>27,2</b>	<b>27,0</b>	<b>2,1</b>
45-49	82,2		0,8	14,8	15,6		41,3		21,6		3,6
50-54	83,1		1,0	8,7	9,7		50,6		19,1		3,7
<b>45-54</b>	<b>82,6</b>	<b>81,3</b>	<b>0,9</b>	<b>11,7</b>	<b>12,6</b>	<b>12,1</b>	<b>46,1</b>	<b>43,7</b>	<b>20,3</b>	<b>22,5</b>	<b>3,7</b>
<b>55-59</b>	<b>87,7</b>	<b>83,8</b>	<b>3,5</b>	<b>21,1</b>	<b>24,6</b>	<b>15,1</b>	<b>46,7</b>	<b>47,9</b>	<b>15,3</b>	<b>18,3</b>	<b>1,1</b>
<b>60-64</b>	<b>90,1</b>	<b>84,3</b>	---	<b>21,3</b>	<b>21,3</b>	<b>16,7</b>	<b>54,4</b>	<b>49,6</b>	<b>12,0</b>	<b>15,7</b>	<b>2,4</b>
>=65	85,1		2,5	15,5	18,0		54,7		11,7		0,8
<b>65-74</b>	<b>85,4</b>	<b>81,9</b>	<b>1,4</b>	<b>12,5</b>	<b>13,9</b>	<b>15,8</b>	<b>54,3</b>	<b>51,6</b>	<b>15,9</b>	<b>12,8</b>	<b>1,3</b>
<b>&gt;=75</b>	<b>84,8</b>	<b>75,0</b>	<b>4,3</b>	<b>20,5</b>	<b>24,7</b>	<b>12,9</b>	<b>55,5</b>	<b>46,6</b>	<b>4,6</b>	<b>14,0</b>	---
<b>Totale</b>	<b>76,6</b>	<b>71,6</b>	<b>0,9</b>	<b>8,7</b>	<b>9,6</b>	<b>9,0</b>	<b>38,3</b>	<b>36,3</b>	<b>25,1</b>	<b>22,9</b>	<b>3,6</b>
<b>MASCHI</b>											
14	---		---	---	---		---		---		---
15	8,3		---	---	---		---		8,3		---
16	18,6		---	5,0	5,0		---		5,0		8,6
17	---		---	---	---		---		---		---
<b>14-17</b>	<b>10,1</b>	<b>11,9</b>	---	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	---	---	<b>1</b>	<b>4,3</b>	<b>7,4</b>	<b>3,7</b>
18	27,1		---	---	---		---		17,6		9,6
19	34,8		---	---	---		5,0		29,8		---
<b>18-19</b>	<b>31,9</b>	<b>23,1</b>	---	---	---	---	<b>3,1</b>	<b>2,4</b>	<b>25,2</b>	<b>16,3</b>	<b>3,6</b>
<b>20-24</b>	<b>35,5</b>	<b>29,4</b>	---	---	---	---	<b>1,2</b>	<b>3,3</b>	<b>24,8</b>	<b>21,6</b>	<b>9,5</b>
25-29	51,2		---	---	---		11,7		37,0		2,5
30-34	45,4		---	0,7	0,7		10,1		30,3		4,2
<b>25-34</b>	<b>48,1</b>	<b>40,7</b>	---	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>1,2</b>	<b>10,9</b>	<b>9,5</b>	<b>33,4</b>	<b>26,3</b>	<b>3,4</b>
35-39	50,2		---	---	---		14,9		35,2		---
40-44	58,0		---	---	---		14,9		39,1		3,9
<b>35-44</b>	<b>53,7</b>	<b>47,1</b>	---	---	---	<b>1,4</b>	<b>14,9</b>	<b>15,3</b>	<b>37,0</b>	<b>27,0</b>	<b>1,8</b>
45-49	61,5		---	5,6	5,6		22,9		29,0		3,9
50-54	62,3		0,8	1,2	1,9		29,1		25,4		5,9
<b>45-54</b>	<b>61,9</b>	<b>53,4</b>	<b>0,4</b>	<b>3,6</b>	<b>4,0</b>	<b>2,9</b>	<b>25,7</b>	<b>21,9</b>	<b>27,4</b>	<b>25,1</b>	<b>4,8</b>
<b>55-59</b>	<b>63,4</b>	<b>53,1</b>	---	---	---	<b>3,1</b>	<b>33,2</b>	<b>25,5</b>	<b>25,4</b>	<b>21,9</b>	<b>4,9</b>
<b>60-64</b>	<b>68,3</b>	<b>50,6</b>	<b>0,6</b>	<b>3,5</b>	<b>4,1</b>	<b>2,7</b>	<b>34,3</b>	<b>25,6</b>	<b>26,8</b>	<b>20,6</b>	<b>3,0</b>
>=65	60,0		0,6	1,8	2,5		37,1		17,5		2,9
<b>65-74</b>	<b>57,8</b>	<b>49,7</b>	<b>0,6</b>	<b>2,6</b>	<b>3,2</b>	<b>2,7</b>	<b>35,2</b>	<b>26,9</b>	<b>16,6</b>	<b>17,9</b>	<b>2,7</b>
<b>&gt;=75</b>	<b>62,8</b>	<b>42,1</b>	<b>0,7</b>	<b>0,8</b>	<b>1,4</b>	<b>1,5</b>	<b>39,6</b>	<b>21,7</b>	<b>18,6</b>	<b>17,0</b>	<b>3,3</b>
<b>Totale</b>	<b>53,8</b>	<b>44,1</b>	<b>0,2</b>	<b>1,4</b>	<b>1,6</b>	<b>1,8</b>	<b>21,9</b>	<b>17,2</b>	<b>26,5</b>	<b>22,1</b>	<b>3,7</b>
<b>FEMMINE</b>											

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

Tabella 61 – segue

## Maschi e Femmine

Età in classi	Consumo		Più di 1 litro al giorno	Tra 1 e 1/2 litro al giorno	Oltre 1/2 litro al giorno		1-2 bicchieri al giorno		Più raramente		Solo Stagionalmente
	VENETO	ITALIA	VENETO	VENETO	VENETO	ITALIA	VENETO	ITALIA	VENETO	ITALIA	VENETO
14	15,6		---	---	---		---		9,3		6,3
15	9,1		---	---	---		---		5,2		3,9
16	24,2		---	2,7	2,7		---		9,9		11,5
17	43,3		---	---	---		3,8		23,1		16,4
<b>14-17</b>	<b>23,1</b>	<b>17,6</b>	---	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	---	<b>0,8</b>	<b>2,8</b>	<b>11,4</b>	<b>10,6</b>	<b>9,8</b>
18	48,7		---	---	---		7,5		35,9		5,3
19	52,8		---	---	---		7,3		38,2		7,4
<b>18-19</b>	<b>51,2</b>	<b>32,7</b>	---	---	---	<b>0,8</b>	<b>7,4</b>	<b>5,2</b>	<b>37,3</b>	<b>22,0</b>	<b>6,6</b>
<b>20-24</b>	<b>47,3</b>	<b>40,1</b>	---	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>1,0</b>	<b>6,1</b>	<b>8,0</b>	<b>31,8</b>	<b>26,0</b>	<b>8,9</b>
25-29	58,8		0,4	---	0,4		15,0		40,9		2,6
30-34	59,1		---	1,1	1,1		19,2		34,5		4,3
<b>25-34</b>	<b>59,0</b>	<b>54,5</b>	<b>0,2</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>	<b>2,4</b>	<b>17,2</b>	<b>18,6</b>	<b>37,6</b>	<b>29,4</b>	<b>3,5</b>
35-39	60,7		---	2,6	2,6		23,4		33,2		1,4
40-44	72,4		0,4	2,3	2,7		36,6		30,6		2,5
<b>35-44</b>	<b>66,3</b>	<b>61,6</b>	<b>0,2</b>	<b>2,4</b>	<b>2,6</b>	<b>4,3</b>	<b>29,7</b>	<b>26,8</b>	<b>32,0</b>	<b>27,0</b>	<b>1,9</b>
45-49	71,2		0,4	9,9	10,3		31,5		25,6		3,8
50-54	73,3		0,9	5,1	6,0		40,5		22,0		4,7
<b>45-54</b>	<b>72,2</b>	<b>67,1</b>	<b>0,6</b>	<b>7,6</b>	<b>8,2</b>	<b>7,4</b>	<b>35,8</b>	<b>32,6</b>	<b>23,9</b>	<b>23,8</b>	<b>4,3</b>
<b>55-59</b>	<b>75,4</b>	<b>67,9</b>	<b>1,7</b>	<b>10,4</b>	<b>12,1</b>	<b>8,9</b>	<b>39,8</b>	<b>36,3</b>	<b>20,4</b>	<b>20,2</b>	<b>3,0</b>
<b>60-64</b>	<b>79,3</b>	<b>67,5</b>	<b>0,3</b>	<b>12,5</b>	<b>12,8</b>	<b>9,7</b>	<b>44,5</b>	<b>37,6</b>	<b>19,3</b>	<b>18,1</b>	<b>2,7</b>
>=65	70,2		1,4	7,4	8,8		44,3		15,1		2,1
<b>65-74</b>	<b>69,7</b>	<b>64,1</b>	<b>0,9</b>	<b>6,9</b>	<b>7,8</b>	<b>8,6</b>	<b>43,4</b>	<b>38,0</b>	<b>16,3</b>	<b>15,6</b>	<b>2,1</b>
<b>&gt;=75</b>	<b>71,0</b>	<b>54,2</b>	<b>2,0</b>	<b>8,1</b>	<b>10,1</b>	<b>5,7</b>	<b>45,5</b>	<b>30,8</b>	<b>13,3</b>	<b>15,9</b>	<b>2,0</b>
<b>Totale</b>	<b>63,9</b>	<b>57,4</b>	<b>0,6</b>	<b>4,9</b>	<b>5,4</b>	<b>5,3</b>	<b>29,5</b>	<b>26,4</b>	<b>25,5</b>	<b>22,5</b>	<b>3,6</b>

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

**Tabella 62 - Distribuzione percentuale dei consumatori di VINO di 14 anni e più secondo la condizione lavorativa, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto**

Condizione lavorativa	Consumo		Oltre 1/2 litro al giorno		1-2 bicchieri al giorno		Più raramente	
	VENETO	ITALIA	VENETO	ITALIA	VENETO	ITALIA	VENETO	ITALIA
<b>MASCHI</b>								
<b>Occupati</b>	<b>75,9</b>	<b>75,9</b>	<b>6,7</b>	<b>8,1</b>	<b>36,2</b>	<b>37,4</b>	<b>29,5</b>	<b>26,7</b>
- Dirigenti; Imprenditori; Liberi Professionisti	82,2	81,1	5,0	7,3	45,2	41,1	28,4	29,6
- Direttivi; Quadri; Impiegati; Intermedi	79,6	76,6	4,4	5,8	40,7	36,5	31,8	30,3
- Operai, Apprendisti	66,8	71,7	6,0	8,7	28,2	34,8	28,2	24,2
- Lavoratori in proprio e coadiuvanti	84,3	79,1	12,6	11,3	39,6	41,7	29,3	23,1
<b>Disoccupati</b>	<b>64,1</b>		<b>3,6</b>		<b>15,5</b>		<b>36,6</b>	
- In cerca di nuova occupazione	87,3	67,1	7,5	5,7	20,7	30,6	59,1	27,7
- In cerca di prima occupazione	42,6	47,3	---	3,4	10,7	16,1	15,7	22,3
<b>Studenti</b>	<b>57,9</b>	<b>41,6</b>	<b>0,8</b>	<b>1,0</b>	<b>11,1</b>	<b>8,4</b>	<b>36,2</b>	<b>26,3</b>
<b>Ritirati dal lavoro</b>	<b>87,5</b>	<b>81,1</b>	<b>20,2</b>	<b>15,6</b>	<b>55,2</b>	<b>49,9</b>	<b>11,1</b>	<b>13,9</b>
<b>Altra condizione</b>	<b>65,2</b>	<b>56,3</b>	<b>9,8</b>	<b>8,7</b>	<b>33,8</b>	<b>26,5</b>	<b>17,4</b>	<b>18,7</b>
<b>Totale</b>	<b>77,0</b>	<b>72,4</b>	<b>9,7</b>	<b>9,1</b>	<b>38,7</b>	<b>36,7</b>	<b>25,1</b>	<b>23,1</b>
<b>FEMMINE</b>								
<b>Occupati</b>	53,0	48,4	1,4	1,8	14,9	15,3	33,6	27,6
- Dirigenti; Imprenditori; Liberi Professionisti	74,7	50,3	---	2,7	17,0	13,6	50,7	29,2
- Direttivi; Quadri; Impiegati; Intermedi	49,9	49,7	---	1,4	12,9	14,9	33,2	29,4
- Operai, Apprendisti	50,7	45,0	3,0	2,0	16,1	15,5	30,5	24,1
- Lavoratori in proprio e coadiuvanti	60,3	48,9	3,3	2,6	19,1	17,3	34,4	26,4
<b>Disoccupati</b>	44,4		2,7		10,4		22,5	
- In cerca di nuova occupazione	60,9	41,7	3,9	1,0	15,3	8,7	28,8	27,5
- In cerca di prima occupazione	9,1	26,8	---	0,7	---	5,6	9,1	17,7
<b>Casalinghe</b>	58,1	44,9	1,1	2,1	29,2	19,6	24,9	20,5
<b>Studenti</b>	30,8	26,1	1,3	0,4	1,0	3,1	19,8	18,2
<b>Ritirati dal lavoro</b>	60,9	51,0	3,3	2,4	34,1	27,5	19,3	18,9
<b>Altra condizione</b>	58,1	38,7	1,2	2,0	32,2	17,3	23,7	17,7
<b>Totale</b>	<b>54,3</b>	<b>44,6</b>	<b>1,7</b>	<b>1,9</b>	<b>22,1</b>	<b>17,4</b>	<b>26,8</b>	<b>22,3</b>
<b>MASCHI E FEMMINE</b>								
<b>Occupati</b>	66,7	65,3	4,6	5,7	27,7	28,9	31,1	27,0
- Dirigenti; Imprenditori; Liberi Professionisti	80,2	72,1	3,7	5,9	37,6	33,0	34,4	29,5
- Direttivi; Quadri; Impiegati; Intermedi	64,1	63,1	2,1	3,6	26,2	25,7	32,5	29,9
- Operai, Apprendisti	60,7	63,3	4,8	6,6	23,6	28,7	29,1	24,2
- Lavoratori in proprio e coadiuvanti	78,0	70,0	10,1	8,7	34,2	34,3	30,6	24,1
<b>Disoccupati</b>	52,9		3,1		12,6		28,6	
- In cerca di nuova occupazione	70,2	56,3	5,2	3,7	17,2	21,3	39,4	27,6
- In cerca di prima occupazione	27,6	37,0	---	2,0	5,9	10,8	12,7	20,0
<b>Casalinghe</b>	58,1	44,9	1,1	2,1	29,2	19,6	24,9	20,5
<b>Studenti</b>	44,2	33,6	1,0	0,7	6,0	5,6	27,8	22,1
<b>Ritirati dal lavoro</b>	76,0	68,1	12,9	9,9	46,0	40,2	14,7	16,0
<b>Altra condizione</b>	60,6	45,5	4,2	4,6	32,7	20,9	21,4	18,1
<b>Totale</b>	<b>65,3</b>	<b>58,0</b>	<b>5,6</b>	<b>5,4</b>	<b>30,2</b>	<b>26,7</b>	<b>26,0</b>	<b>22,7</b>

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

**Tabella 63 - Distribuzione percentuale dei consumatori di VINO di 14 anni e più secondo il titolo di studio conseguito, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto**

Titolo di studio	Consumo		Oltre 1/2 litro al giorno		1-2 bicchieri al giorno		Più raramente	
	VENETO	ITALIA	VENETO	ITALIA	VENETO	ITALIA	VENETO	ITALIA
<b>MASCHI</b>								
<b>Laurea</b>	77,3	77,1	1,4	5,2	41,7	38,4	34,2	30,4
Diploma universitario	79,6		12,8		43,1		23,7	
<b>Diploma superiore (5 anni)</b>	76,6	72,1	4,7	5,7	36,3	32,5	31,8	29,3
Diploma biennale-triennale	80,6		6,8		37,2		32,0	
<b>Licenza media inferiore</b>	71,2	66,9	7,2	7,6	33,3	33,0	25,0	22,5
<b>Licenza elementare</b>	83,1	77,7	23,2	16,6	46,5	46,0	12,4	13,5
Nessun titolo	74,8		10,5		55,4		9,0	
<b>Totale</b>	<b>76,6</b>	<b>71,6</b>	<b>9,6</b>	<b>9,0</b>	<b>38,3</b>	<b>36,3</b>	<b>25,1</b>	<b>22,9</b>
<b>FEMMINE</b>								
<b>Laurea</b>	50,7	52,0	1,2	2,2	15,2	14,9	29,2	30,9
Diploma universitario	57,7		---		15,7		30,8	
<b>Diploma superiore (5 anni)</b>	54,9	45,0	0,6	1,0	12,4	13,6	36,0	26,6
Diploma biennale-triennale	59,2		1,4		21,8		33,1	
<b>Licenza media inferiore</b>	45,3	40,7	1,9	1,8	16,4	14,8	24,1	21,0
<b>Licenza elementare</b>	60,3	45,5	2,3	2,4	33,6	23,1	21,9	17,9
Nessun titolo	51,4		2,3		36,8		10,2	
<b>Totale</b>	<b>53,8</b>	<b>44,1</b>	<b>1,6</b>	<b>1,8</b>	<b>21,9</b>	<b>17,2</b>	<b>26,5</b>	<b>22,1</b>
<b>MASCHI E FEMMINE</b>								
<b>Laurea</b>	64,9	65,2	1,3	3,8	29,4	27,3	31,9	30,7
Diploma universitario	65,3		4,4		25,3		28,3	
<b>Diploma superiore (5 anni)</b>	65,7	58,4	2,6	3,4	24,3	22,9	33,9	27,9
Diploma biennale-triennale	72,0		4,6		31,0		32,4	
<b>Licenza media inferiore</b>	59,1	54,5	4,8	4,9	25,4	24,4	24,6	21,8
<b>Licenza elementare</b>	69,5	58,4	10,8	8,1	38,8	32,2	18,1	16,2
Nessun titolo	58,0		4,6		42,0		9,8	
<b>Totale</b>	<b>64,8</b>	<b>57,4</b>	<b>5,5</b>	<b>5,3</b>	<b>29,9</b>	<b>26,4</b>	<b>25,8</b>	<b>22,5</b>

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

**Tabella 64 - Distribuzione percentuale dei consumatori di BIRRA di 14 anni e più secondo le classi di età, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto**

	Età in classi	Consumo		Più di 1 lt al dì	Tra 1 e 1/2 lt al dì	1-2 bicchieri al dì	Consuma birra tutti i giorni		Più raramente		Stagionalmente	
		VENETO	ITALIA	VENETO	VENETO	VENETO	VENETO	ITALIA	VENETO	ITALIA	VENETO	ITALIA
<b>MASCHI</b>	14	43,0		---	---	---	---		27,8		15,3	
	15	19,6		---	---	---	---		19,6		---	
	16	52,6		---	---	4,8	4,8		47,8		---	
	17	66,2		---	---	4,2	4,2		49,8		12,1	
	<b>14-17</b>	<b>50,3</b>	<b>37,9</b>	---	---	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,3</b>	<b>40,4</b>	<b>25,6</b>	<b>6,9</b>	<b>9,0</b>
	18	75,6		---	---	23,3	23,3		52,3		---	
	19	94,2		---	---	---	---		87,9		6,3	
	<b>18-19</b>	<b>86,8</b>	<b>67,6</b>	---	---	<b>9,3</b>	<b>9,3</b>	<b>10,1</b>	<b>73,7</b>	<b>44,6</b>	<b>3,8</b>	<b>13,0</b>
	<b>20-24</b>	<b>80,9</b>	<b>74,1</b>	---	<b>3,4</b>	<b>8,2</b>	<b>11,6</b>	<b>14,0</b>	<b>55,8</b>	<b>43,2</b>	<b>13,4</b>	<b>17,5</b>
	25-29	79,5		0,7	1,8	8,0	10,5		59,1		9,9	
	30-34	81,2		---	4,0	7,0	11,0		54,9		15,3	
	<b>25-34</b>	<b>80,4</b>	<b>76,1</b>	<b>0,4</b>	<b>2,9</b>	<b>7,5</b>	<b>10,8</b>	<b>14,1</b>	<b>57,0</b>	<b>44,9</b>	<b>12,7</b>	<b>17,1</b>
	35-39	74,0		0,7	1,6	8,6	10,9		52,8		10,3	
	40-44	80,3		---	1,5	8,7	10,2		53,0		17,1	
	<b>35-44</b>	<b>77,1</b>	<b>73,4</b>	<b>0,4</b>	<b>1,5</b>	<b>8,6</b>	<b>10,5</b>	<b>11,3</b>	<b>52,9</b>	<b>43,3</b>	<b>13,7</b>	<b>18,8</b>
	45-49	78,4		---	2,9	9,3	12,2		42,8		23,4	
	50-54	71,3		---	0,8	6,4	7,2		42,5		21,6	
	<b>45-54</b>	<b>74,8</b>	<b>69,8</b>	---	<b>1,9</b>	<b>7,8</b>	<b>9,7</b>	<b>9,6</b>	<b>42,6</b>	<b>36,8</b>	<b>22,5</b>	<b>23,4</b>
	<b>55-59</b>	<b>53,1</b>	<b>58,5</b>	---	---	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>7,8</b>	<b>28,9</b>	<b>29,7</b>	<b>21,1</b>	<b>21,0</b>
	<b>60-64</b>	<b>56,9</b>	<b>54,1</b>	---	<b>1,6</b>	<b>6,0</b>	<b>7,6</b>	<b>6,0</b>	<b>28,0</b>	<b>26,6</b>	<b>21,2</b>	<b>21,5</b>
>=65	33,7		---	0,4	1,5	1,9		19,4		12,4		
<b>65-74</b>	<b>40,9</b>	<b>40,3</b>	---	---	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>3,7</b>	<b>22,1</b>	<b>19,1</b>	<b>16,4</b>	<b>17,4</b>	
<b>&gt;=75</b>	<b>21,7</b>	<b>25,3</b>	---	<b>1,1</b>	---	<b>1,1</b>	<b>1,7</b>	<b>14,9</b>	<b>12,9</b>	<b>5,8</b>	<b>10,6</b>	
<b>Totale</b>	<b>66,2</b>	<b>62,0</b>	<b>0,1</b>	<b>1,6</b>	<b>6,3</b>	<b>8,0</b>	<b>9,1</b>	<b>43,0</b>	<b>34,7</b>	<b>15,2</b>	<b>18,1</b>	
<b>FEMMINE</b>	14	15,9		---	---	---	---		---		15,9	
	15	15,0		---	---	---	---		15,0		---	
	16	33,9		---	---	---	---		29,8		4,1	
	17	25,0		---	---	---	---		---		25,0	
	<b>14-17</b>	<b>24,0</b>	<b>22,4</b>	---	---	---	---	<b>1,3</b>	<b>16,6</b>	<b>14,0</b>	<b>7,4</b>	<b>7,1</b>
	18	40,9		---	---	---	---		15,7		25,3	
	19	49,3		---	---	5,1	5,1		33,9		10,3	
	<b>18-19</b>	<b>46,2</b>	<b>39,7</b>	---	---	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>	<b>2,4</b>	<b>27,0</b>	<b>25,9</b>	<b>16,0</b>	<b>11,4</b>
	<b>20-24</b>	<b>45,9</b>	<b>41,9</b>	---	---	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>2,2</b>	<b>34,4</b>	<b>28,8</b>	<b>10,3</b>	<b>10,8</b>
	25-29	48,9		---	---	2,9	2,9		37,6		8,4	
	30-34	50,4		0,7	---	0,9	1,6		41,8		7,0	
	<b>25-34</b>	<b>49,7</b>	<b>45,1</b>	<b>0,4</b>	---	<b>1,8</b>	<b>2,2</b>	<b>2,4</b>	<b>39,9</b>	<b>29,8</b>	<b>7,7</b>	<b>13,0</b>
	35-39	46,6		---	0,7	1,4	2,1		32,4		12,0	
	40-44	49,1		1,0	---	3,1	4,1		31,8		13,2	
	<b>35-44</b>	<b>47,7</b>	<b>43,4</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>	<b>2,2</b>	<b>3,0</b>	<b>2,5</b>	<b>32,2</b>	<b>26,1</b>	<b>12,6</b>	<b>14,8</b>
	45-49	49,5		---	1,0	2,5	3,5		29,6		16,3	
	50-54	40,3		---	---	2,1	2,1		25,2		13,0	
	<b>45-54</b>	<b>45,4</b>	<b>38,0</b>	---	<b>0,5</b>	<b>2,3</b>	<b>2,9</b>	<b>2,5</b>	<b>27,6</b>	<b>20,8</b>	<b>14,8</b>	<b>14,7</b>
	<b>55-59</b>	<b>38,3</b>	<b>28,9</b>	---	<b>1,1</b>	---	<b>1,1</b>	<b>1,3</b>	<b>20,0</b>	<b>14,9</b>	<b>17,2</b>	<b>12,6</b>
	<b>60-64</b>	<b>22,3</b>	<b>22,3</b>	---	<b>0,9</b>	---	<b>0,9</b>	<b>1,2</b>	<b>14,1</b>	<b>11,2</b>	<b>7,4</b>	<b>9,8</b>
>=65	15,6		---	---	1,0	1,0		8,5		6,2		
<b>65-74</b>	<b>19,7</b>	<b>14,0</b>	---	---	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>0,9</b>	<b>9,0</b>	<b>7,1</b>	<b>9,6</b>	<b>6,0</b>	
<b>&gt;=75</b>	<b>10,3</b>	<b>7,5</b>	---	---	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,5</b>	<b>7,8</b>	<b>4,2</b>	<b>1,7</b>	<b>2,9</b>	
<b>Totale</b>	<b>36,7</b>	<b>31,7</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>	<b>1,4</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>	<b>24,6</b>	<b>19,0</b>	<b>10,1</b>	<b>10,9</b>	

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

Tabella 64 - segue

## Maschi e Femmine

Età in classi	Consumo		Più di 1 litro al giorno	Tra 1 e 1/2 litro al giorno	1-2 bicchieri al giorno	Consuma birra tutti i giorni		Più raramente		Solo Stagionalmente	
	VENETO	ITALIA	VENETO	VENETO	VENETO	VENETO	ITALIA	VENETO	ITALIA	VENETO	ITALIA
14	28,2		---	---	---	---		12,6		15,6	
15	16,7		---	---	---	---		16,7		---	
16	42,5		---	---	2,2	2,2		38,1		2,2	
17	59,3		---	---	3,5	3,5		41,5		14,3	
<b>14-17</b>	<b>37,6</b>	<b>30,5</b>	---	---	1,6	<b>1,6</b>	<b>2,3</b>	<b>28,9</b>	<b>20,1</b>	<b>7,1</b>	<b>8,1</b>
18	56,6		---	---	10,5	10,5		32,2		13,9	
19	68,5		---	---	2,9	2,9		57,0		8,6	
<b>18-19</b>	<b>63,9</b>	<b>53,6</b>	---	---	5,9	<b>5,9</b>	<b>6,2</b>	<b>47,4</b>	<b>35,2</b>	<b>10,7</b>	<b>12,2</b>
<b>20-24</b>	<b>64,2</b>	<b>58,3</b>	---	1,8	4,9	<b>6,6</b>	<b>8,1</b>	<b>45,6</b>	<b>36,1</b>	<b>11,9</b>	<b>14,1</b>
25-29	64,6		0,4	0,9	5,5	6,8		48,6		9,2	
30-34	65,7		0,4	2,0	3,9	6,3		48,3		11,1	
<b>25-34</b>	<b>65,2</b>	<b>60,8</b>	0,4	1,5	4,7	<b>6,5</b>	<b>8,3</b>	<b>48,5</b>	<b>37,4</b>	<b>10,2</b>	<b>15,1</b>
35-39	60,2		0,4	1,1	5,0	6,5		42,6		11,2	
40-44	65,9		0,5	0,8	6,1	7,4		43,3		15,3	
<b>35-44</b>	<b>63,0</b>	<b>58,5</b>	0,4	1,0	5,5	<b>6,9</b>	<b>6,9</b>	<b>42,9</b>	<b>34,8</b>	<b>13,2</b>	<b>16,8</b>
45-49	63,0		---	1,9	5,7	7,6		35,8		19,6	
50-54	56,7		---	0,4	4,4	4,8		34,3		17,6	
<b>45-54</b>	<b>59,9</b>	<b>53,6</b>	---	1,2	5,1	<b>6,2</b>	<b>6,0</b>	<b>35,1</b>	<b>28,6</b>	<b>18,6</b>	<b>19,0</b>
<b>55-59</b>	<b>45,7</b>	<b>43,2</b>	---	0,6	1,5	<b>2,1</b>	<b>4,4</b>	<b>24,5</b>	<b>22,1</b>	<b>19,1</b>	<b>16,7</b>
<b>60-64</b>	<b>39,7</b>	<b>38,3</b>	---	1,3	3,0	<b>4,3</b>	<b>3,6</b>	<b>21,1</b>	<b>19,0</b>	<b>14,3</b>	<b>15,7</b>
>=65	22,9		---	0,2	1,2	1,3		12,9		8,7	
<b>65-74</b>	<b>28,8</b>	<b>25,8</b>	---	---	1,7	<b>1,7</b>	<b>2,2</b>	<b>14,6</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>	<b>11,2</b>
<b>&gt;=75</b>	<b>14,5</b>	<b>14,0</b>	---	0,4	0,4	<b>0,8</b>	<b>0,9</b>	<b>10,4</b>	<b>7,4</b>	<b>3,2</b>	<b>5,7</b>
<b>Totale</b>	<b>51,0</b>	<b>46,3</b>	<b>0,1</b>	<b>0,9</b>	<b>3,8</b>	<b>4,8</b>	<b>5,3</b>	<b>33,5</b>	<b>26,6</b>	<b>12,6</b>	<b>14,4</b>

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

**Tabella 65 - Distribuzione percentuale dei consumatori di BIRRA di 14 anni e più secondo la condizione lavorativa, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto**

Condizione lavorativa	Consumo		Consumo di birra tutti i giorni		Più raramente		Solo stagionalmente	
	VENETO	ITALIA	VENETO	ITALIA	VENETO	ITALIA	VENETO	ITALIA
<b>MASCHI</b>								
<b>Occupati</b>	77,0	72,5	10,7	11,6	50,3	41,2	16,0	19,7
- Dirigenti; Imprenditori; Liberi Professionisti	77,4	71,9	6,8	9,2	54,9	42,9	15,7	19,8
- Direttivi; Quadri; Impiegati; Intermedi	79,6	72,7	6,3	9,3	59,9	44,1	13,5	19,2
- Operai, Apprendisti	75,7	73,7	14,2	14,0	45,4	39,8	16,1	19,9
- Lavoratori in proprio e coadiuvanti	75,5	70,3	12,7	12,2	43,2	37,9	19,6	20,1
<b>Disoccupati</b>	61,8		11,4		26,4		23,9	
- In cerca di nuova occupazione	49,7	70,6	6,4	15,9	29,2	34,3	14,2	20,3
- In cerca di prima occupazione	73,0	64,6	16,1	11,6	23,9	33,5	33,0	19,6
<b>Studenti</b>	70,8	59,5	3,6	7,1	60,6	40,2	6,5	12,3
<b>Ritirati dal lavoro</b>	40,7	41,3	3,4	3,7	22,8	20,4	14,5	17,3
<b>Altra condizione</b>	50,7	41,5	---	6,0	30,2	23,7	20,5	11,9
<b>Totale</b>	<b>66,4</b>	<b>62,5</b>	<b>8,1</b>	<b>9,2</b>	<b>43,1</b>	<b>35,0</b>	<b>15,2</b>	<b>18,2</b>
<b>FEMMINE</b>								
<b>Occupati</b>	47,1	43,5	2,1	2,4	33,5	27,3	11,5	13,8
- Dirigenti; Imprenditori; Liberi Professionisti	60,3	41,7	11,4	2,2	39,4	26,0	9,5	13,4
- Direttivi; Quadri; Impiegati; Intermedi	46,5	45,8	1,8	2,3	34,8	29,7	9,8	13,7
- Operai, Apprendisti	46,0	41,6	1,2	2,8	31,6	24,3	13,2	14,5
- Lavoratori in proprio e coadiuvanti	44,2	39,7	---	2,1	29,8	24,7	14,4	12,9
<b>Disoccupati</b>	52,1		2,7		41,2		8,3	
- In cerca di nuova occupazione	62,4	41,2	3,9	3,0	49,5	26,7	8,9	11,5
- In cerca di prima occupazione	30,3	37,4	---	1,5	23,4	24,3	7,0	11,7
<b>Casalinghe</b>	35,2	28,3	2,6	1,7	21,5	15,4	11,1	11,2
<b>Studenti</b>	43,4	38,5	---	1,9	33,9	26,3	9,6	10,4
<b>Ritirati dal lavoro</b>	17,8	15,5	1,2	1,0	9,4	7,4	7,1	7,1
<b>Altra condizione</b>	17,2	14,8	1,5	1,4	10,3	9,1	5,4	4,3
<b>Totale</b>	<b>36,9</b>	<b>31,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>	<b>24,9</b>	<b>19,1</b>	<b>10,1</b>	<b>11,0</b>
<b>MASCHI E FEMMINE</b>								
<b>Occupati</b>	65,0	61,4	7,3	8,1	43,6	35,9	14,2	17,4
- Dirigenti; Imprenditori; Liberi Professionisti	72,8	63,1	8,0	7,2	50,7	38,0	14,1	17,9
- Direttivi; Quadri; Impiegati; Intermedi	62,3	59,2	3,9	5,9	46,8	36,9	11,6	16,5
- Operai, Apprendisti	64,6	63,5	9,3	10,5	40,2	34,9	15,0	18,2
- Lavoratori in proprio e coadiuvanti	67,3	61,0	9,4	9,2	39,7	33,9	18,2	17,9
<b>Disoccupati</b>	56,3		6,5		34,8		15,1	
- In cerca di nuova occupazione	57,9	58,1	4,8	10,4	42,4	31,1	10,8	16,6
- In cerca di prima occupazione	53,9	50,9	8,9	6,5	23,7	28,8	21,4	15,6
<b>Casalinghe</b>	35,2	28,3	2,6	1,7	21,5	15,4	11,1	11,2
<b>Studenti</b>	56,9	48,6	1,8	4,4	47,0	33,0	8,1	11,3
<b>Ritirati dal lavoro</b>	30,7	30,2	2,4	2,5	17,0	14,8	11,3	12,9
<b>Altra condizione</b>	29,3	25,1	1,0	3,2	17,5	14,7	10,9	7,2
<b>Totale</b>	<b>51,2</b>	<b>46,6</b>	<b>4,9</b>	<b>5,4</b>	<b>33,8</b>	<b>26,8</b>	<b>12,6</b>	<b>14,5</b>

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

**Tabella 66 - Distribuzione percentuale dei consumatori di BIRRA di 14 anni e più secondo il titolo di studio conseguito, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto**

Titolo di studio	Consumo		Consumo di birra tutti i giorni		Più raramente		Solo stagionalmente	
	VENETO	ITALIA	VENETO	ITALIA	VENETO	ITALIA	VENETO	ITALIA
<b>MASCHI</b>								
<b>Laurea</b>	<b>66,8</b>	<b>66,5</b>	<b>1,2</b>	<b>7,6</b>	<b>55,6</b>	<b>42,2</b>	<b>10,0</b>	<b>16,6</b>
Diploma universitario	64,8		37,0		27,9		---	
<b>Diploma superiore (5 anni)</b>	<b>77,4</b>	<b>70,9</b>	<b>7,3</b>	<b>9,9</b>	<b>54,2</b>	<b>41,9</b>	<b>15,9</b>	<b>19,1</b>
Diploma biennale-triennale	82,3		9,8		49,5		22,9	
<b>Licenza media inferiore</b>	<b>67,1</b>	<b>64,7</b>	<b>10,5</b>	<b>10,6</b>	<b>42,5</b>	<b>35,8</b>	<b>14,2</b>	<b>18,3</b>
<b>Licenza elementare</b>	<b>45,6</b>	<b>44,9</b>	<b>4,7</b>	<b>6,1</b>	<b>25,8</b>	<b>21,8</b>	<b>15,1</b>	<b>16,9</b>
Nessun titolo	39,5		9,6		22,4		7,5	
<b>Totale</b>	<b>66,2</b>	<b>62,0</b>	<b>8,0</b>	<b>9,1</b>	<b>43,0</b>	<b>34,7</b>	<b>15,2</b>	<b>18,1</b>
<b>FEMMINE</b>								
<b>Laurea</b>	<b>41,4</b>	<b>45,3</b>	<b>1,2</b>	<b>2,2</b>	<b>30,8</b>	<b>28,0</b>	<b>9,4</b>	<b>15,1</b>
Diploma universitario	51,4		---		33,6		17,8	
<b>Diploma superiore (5 anni)</b>	<b>48,9</b>	<b>42,6</b>	<b>1,9</b>	<b>2,3</b>	<b>35,4</b>	<b>27,1</b>	<b>11,5</b>	<b>13,2</b>
Diploma biennale-triennale	46,8		1,2		37,4		8,2	
<b>Licenza media inferiore</b>	<b>41,7</b>	<b>34,9</b>	<b>2,6</b>	<b>2,2</b>	<b>25,8</b>	<b>20,5</b>	<b>13,4</b>	<b>12,2</b>
<b>Licenza elementare</b>	<b>22,7</b>	<b>16,7</b>	<b>1,3</b>	<b>1,0</b>	<b>13,6</b>	<b>8,9</b>	<b>7,8</b>	<b>6,8</b>
Nessun titolo	10,3		1,2		7,0		2,1	
<b>Totale</b>	<b>36,7</b>	<b>31,7</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>	<b>24,6</b>	<b>19,0</b>	<b>10,1</b>	<b>10,9</b>
<b>MASCHI E FEMMINE</b>								
<b>Laurea</b>	<b>54,8</b>	<b>56,5</b>	<b>1,2</b>	<b>5,0</b>	<b>43,8</b>	<b>35,5</b>	<b>9,7</b>	<b>15,9</b>
Diploma universitario	56,1		12,9		31,6		11,6	
<b>Diploma superiore (5 anni)</b>	<b>63,1</b>	<b>56,6</b>	<b>4,6</b>	<b>6,1</b>	<b>44,8</b>	<b>34,4</b>	<b>13,7</b>	<b>16,1</b>
Diploma biennale-triennale	68,2		6,4		44,7		17,1	
<b>Licenza media inferiore</b>	<b>55,3</b>	<b>50,6</b>	<b>6,8</b>	<b>6,6</b>	<b>34,7</b>	<b>28,5</b>	<b>13,8</b>	<b>15,5</b>
<b>Licenza elementare</b>	<b>32,0</b>	<b>27,9</b>	<b>2,7</b>	<b>3,0</b>	<b>18,5</b>	<b>14,1</b>	<b>10,8</b>	<b>10,8</b>
Nessun titolo	18,3		3,5		11,2		3,6	
<b>Totale</b>	<b>51,0</b>	<b>46,3</b>	<b>4,8</b>	<b>5,3</b>	<b>33,5</b>	<b>26,6</b>	<b>12,6</b>	<b>14,4</b>

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

**Tabella 67 - Distribuzione percentuale dei consumatori di *APERITIVI ALCOLICI* di 14 anni e più secondo le classi di età, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto**

	Età in classi	Consumo		Consumo quotidiano	Qualche bicchiere a settimana	Più raramente	Eccezionalmente a)	
		VENETO	ITALIA	VENETO	VENETO	VENETO	VENETO	ITALIA
<b>MASCHI</b>	14	21,4		---	6,3	7,6	21,4	
	15	10,0		---	---	10,0	10,0	
	16	38,0		---	5,9	11,5	38,0	
	17	63,6		---	23,2	16,3	63,6	
	<b>14-17</b>	<b>38,4</b>	<b>20,3</b>	---	10,4	12,0	<b>38,4</b>	<b>20,3</b>
	18	85,0		---	17,5	36,1	85,0	
	19	77,0		---	15,6	36,2	77,0	
	<b>18-19</b>	<b>80,2</b>	<b>45,3</b>	---	16,4	36,2	<b>80,2</b>	<b>45,3</b>
	<b>20-24</b>	<b>68,3</b>	<b>52,4</b>	2,2	14,2	19,9	<b>68,3</b>	<b>52,4</b>
	25-29	61,8		1,5	15,3	18,8	61,8	
	30-34	65,5		2,6	8,8	22,9	65,5	
	<b>25-34</b>	<b>63,7</b>	<b>54,9</b>	2,1	12,0	20,9	<b>63,7</b>	<b>54,9</b>
	35-39	55,4		2,6	9,0	10,5	55,4	
	40-44	52,5		1,1	6,8	16,1	52,5	
	<b>35-44</b>	<b>54,0</b>	<b>48,8</b>	1,8	8,0	13,2	<b>54,0</b>	<b>48,8</b>
	45-49	43,8		1,7	4,8	14,8	43,8	
	50-54	45,4		0,8	6,9	12,1	45,4	
	<b>45-54</b>	<b>44,6</b>	<b>43,1</b>	1,2	5,9	13,4	<b>44,6</b>	<b>43,1</b>
	<b>55-59</b>	<b>44,5</b>	<b>36,7</b>	4,1	4,2	8,6	<b>44,5</b>	<b>36,7</b>
	<b>60-64</b>	<b>33,6</b>	<b>31,8</b>	0,8	3,2	8,4	<b>33,6</b>	<b>31,8</b>
>=65	13,9		2,1	2,2	2,8	13,9		
<b>65-74</b>	<b>16,5</b>	<b>22,2</b>	1,5	1,8	3,9	<b>16,5</b>	<b>22,2</b>	
<b>&gt;=75</b>	<b>9,5</b>	<b>10,8</b>	3,0	3,0	0,9	<b>9,5</b>	<b>10,8</b>	
<b>Totale</b>	<b>46,1</b>	<b>40,0</b>	<b>1,8</b>	<b>7,5</b>	<b>13,1</b>	<b>46,1</b>	<b>40,0</b>	
<b>FEMMINE</b>	14	---		---	---	---	---	
	15	15,0		---	---	---	100,0	
	16	29,4		---	---	5,0	83,0	
	17	52,5		---	---	---	100,0	
	<b>14-17</b>	<b>20,0</b>	<b>16,0</b>	---	---	2,1	<b>89,4</b>	<b>71,2</b>
	18	35,0		---	---	8,5	75,7	
	19	53,4		---	5,1	24,5	44,6	
	<b>18-19</b>	<b>46,4</b>	<b>29,8</b>	---	3,2	18,4	<b>53,4</b>	<b>57,1</b>
	<b>20-24</b>	<b>53,4</b>	<b>31,2</b>	---	6,0	12,4	<b>65,4</b>	<b>60,3</b>
	25-29	46,5		---	5,6	10,2	65,9	
	30-34	35,3		---	3,1	9,0	66,0	
	<b>25-34</b>	<b>40,6</b>	<b>27,5</b>	---	4,3	9,6	<b>65,9</b>	<b>63,2</b>
	35-39	21,1		---	---	2,8	86,5	
	40-44	19,3		---	---	3,8	80,2	
	<b>35-44</b>	<b>20,3</b>	<b>20,0</b>	---	---	3,3	<b>83,7</b>	<b>74,2</b>
	45-49	18,6		---	1,9	0,7	85,9	
	50-54	15,5		---	0,9	0,8	89,4	
	<b>45-54</b>	<b>17,2</b>	<b>17,7</b>	---	1,4	0,7	<b>87,3</b>	<b>78,8</b>
	<b>55-59</b>	<b>12,7</b>	<b>12,8</b>	---	2,1	1,0	<b>75,0</b>	<b>76,0</b>
	<b>60-64</b>	<b>11,5</b>	<b>10,1</b>	---	---	4,5	<b>61,3</b>	<b>79,2</b>
>=65	5,7		0,4	0,4	0,6	76,0		
<b>65-74</b>	<b>7,6</b>	<b>6,1</b>	0,7	0,8	0,6	<b>73,7</b>	<b>77,1</b>	
<b>&gt;=75</b>	<b>3,1</b>	<b>2,6</b>	---	---	0,5	<b>83,1</b>	<b>79,4</b>	
<b>Totale</b>	<b>21,4</b>	<b>16,8</b>	<b>0,1</b>	<b>1,6</b>	<b>4,2</b>	<b>72,5</b>	<b>70,0</b>	

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

Tabella 67 – segue

## Maschi e Femmine

Età in classi	Consumo		Consumo quotidiano	Qualche bicchiere a settimana	Più raramente	Eccezionalmente a)	
	VENETO	ITALIA	VENETO	VENETO	VENETO	VENETO	ITALIA
14	9,7		---	2,9	3,4	34,9	
15	13,1		---	---	3,8	71,3	
16	33,4		---	2,7	8,0	67,8	
17	61,7		---	19,1	13,4	47,2	
<b>14-17</b>	<b>29,4</b>	<b>18,3</b>	---	5,3	7,2	<b>57,5</b>	<b>61,1</b>
18	57,5		---	7,9	20,9	49,9	
19	63,5		---	9,6	29,5	38,4	
<b>18-19</b>	<b>61,2</b>	<b>37,5</b>	---	8,9	26,2	<b>42,6</b>	<b>53,1</b>
<b>20-24</b>	<b>61,2</b>	<b>41,8</b>	1,2	10,4	16,4	<b>54,5</b>	<b>51,2</b>
25-29	54,4		0,8	10,6	14,7	52,0	
30-34	50,4		1,3	5,9	15,9	54,0	
<b>25-34</b>	<b>52,3</b>	<b>41,3</b>	1,1	8,2	15,3	<b>53,0</b>	<b>52,2</b>
35-39	38,2		1,3	4,5	6,7	67,4	
40-44	37,1		0,6	3,7	10,4	60,5	
<b>35-44</b>	<b>37,7</b>	<b>34,5</b>	1,0	4,1	8,4	<b>64,1</b>	<b>64,0</b>
45-49	30,4		0,8	3,2	7,3	62,6	
50-54	31,3		0,4	4,0	6,7	64,1	
<b>45-54</b>	<b>30,8</b>	<b>30,2</b>	0,6	3,6	7,0	<b>63,3</b>	<b>65,7</b>
<b>55-59</b>	<b>28,7</b>	<b>24,3</b>	2,1	3,2	4,9	<b>64,8</b>	<b>64,3</b>
<b>60-64</b>	<b>22,6</b>	<b>21,0</b>	0,4	1,6	6,4	<b>62,6</b>	<b>68,2</b>
>=65	9,0		1,1	1,2	1,5	59,1	
<b>65-74</b>	<b>11,5</b>	<b>13,4</b>	1,0	1,2	2,0	<b>62,9</b>	<b>66,3</b>
<b>&gt;=75</b>	<b>5,5</b>	<b>5,6</b>	1,1	1,1	0,7	<b>47,7</b>	<b>68,9</b>
<b>Totale</b>	<b>33,4</b>	<b>28,0</b>	0,9	4,5	8,5	<b>58,3</b>	<b>60,0</b>

a) = per 100 consumatori della stessa bevanda

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

**Tabella 68 - Distribuzione percentuale dei consumatori di *APERITIVI ALCOLICI* di 14 anni e più secondo la condizione lavorativa, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto**

Condizione lavorativa	Consumo		Almeno una volta alla settimana	Più raramente	Eccezionalmente a)	
	VENETO	ITALIA	VENETO	VENETO	VENETO	ITALIA
<b>MASCHI</b>						
<b>Occupati</b>	54,9	49,0	10,9	15,4	52,3	55,0
- Dirigenti; Imprenditori; Liberi Professionisti	50,7	51,6	9,2	15,4	51,4	56,6
- Direttivi; Quadri; Impiegati; Intermedi	64,6	50,3	12,1	16,9	55,2	59,3
- Operai, Apprendisti	52,0	47,8	10,0	15,1	51,7	50,2
- Lavoratori in proprio e coadiuvanti	49,4	47,5	11,9	13,5	48,6	55,8
<b>Disoccupati</b>	45,7		15,8	8,6	46,4	
- In cerca di nuova occupazione	63,8	44,8	22,4	7,4	53,3	59,0
- In cerca di prima occupazione	27,1	42,8	9,2	9,9	29,8	45,2
<b>Studenti</b>	63,4	38,9	15,1	24,0	38,3	48,0
<b>Ritirati dal lavoro</b>	22,1	21,8	4,2	5,2	57,3	63,3
<b>Altra condizione</b>	29,2	24,3	2,1	12,0	51,8	62,0
<b>Totale</b>	<b>46,3</b>	<b>40,4</b>	<b>9,3</b>	<b>13,2</b>	<b>51,4</b>	<b>55,5</b>
<b>FEMMINE</b>						
<b>Occupati</b>	30,4	25,1	2,3	6,8	70,3	68,5
- Dirigenti; Imprenditori; Liberi Professionisti	38,5	26,7	4,8	13,0	53,8	67,4
- Direttivi; Quadri; Impiegati; Intermedi	31,3	27,0	2,7	6,6	70,2	70,1
- Operai, Apprendisti	28,9	22,8	1,0	6,4	74,2	67,0
- Lavoratori in proprio e coadiuvanti	26,0	21,2	2,6	4,5	72,5	64,0
<b>Disoccupati</b>	32,5		2,7	2,6	83,8	
- In cerca di nuova occupazione	35,2	20,5	3,9	3,8	78,1	66,9
- In cerca di prima occupazione	26,8	20,7	0,0	0,0	100,0	61,3
<b>Casalinghe</b>	14,5	11,6	1,3	1,4	81,2	78,2
<b>Studenti</b>	43,0	29,0	4,6	9,4	67,4	61,2
<b>Ritirati dal lavoro</b>	7,2	6,2	0,5	1,5	72,5	80,4
<b>Altra condizione</b>	7,8	8,3	0,0	2,5	68,2	66,6
<b>Totale</b>	<b>21,6</b>	<b>16,9</b>	<b>1,7</b>	<b>4,2</b>	<b>72,5</b>	<b>69,9</b>
<b>MASCHI E FEMMINE</b>						
<b>Occupati</b>	45,1	39,9	7,4	11,9	57,1	58,3
- Dirigenti; Imprenditori; Liberi Professionisti	47,4	44,3	8,0	14,8	51,9	58,5
- Direttivi; Quadri; Impiegati; Intermedi	47,2	38,6	7,2	11,5	60,4	63,1
- Operai, Apprendisti	43,3	40,0	6,6	11,8	57,4	53,2
- Lavoratori in proprio e coadiuvanti	43,3	39,5	9,5	11,2	52,3	57,1
<b>Disoccupati</b>	38,1		8,2	5,1	64,9	
- In cerca di nuova occupazione	45,3	34,5	10,4	5,1	65,8	61,0
- In cerca di prima occupazione	26,9	31,6	4,8	5,2	62,6	50,5
<b>Casalinghe</b>	<b>14,5</b>	<b>11,6</b>	1,3	1,4	81,2	78,2
<b>Studenti</b>	<b>53,1</b>	<b>33,8</b>	9,8	16,6	50,2	53,9
<b>Ritirati dal lavoro</b>	<b>15,6</b>	<b>15,1</b>	2,6	3,6	60,4	66,4
<b>Altra condizione</b>	<b>15,5</b>	<b>14,5</b>	0,8	5,9	57,0	63,6
<b>Totale</b>	<b>33,6</b>	<b>28,2</b>	<b>5,4</b>	<b>8,6</b>	<b>58,4</b>	<b>59,9</b>

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

**Tabella 69 - Distribuzione percentuale dei consumatori di *APERITIVI ALCOLICI* di 14 anni e più secondo il titolo di studio conseguito, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto**

Titolo di studio	Consumo		Almeno una volta alla settimana	Raramente	Eccezionalmente a)	
	VENETO	ITALIA	VENETO	VENETO	VENETO	ITALIA
<b>MASCHI</b>						
<b>Laurea</b>	47,1	50,3	8,7	7,5	65,7	55,5
Diploma universitario	79,6		36,2	21,2	27,9	
<b>Diploma superiore (5 anni)</b>	58,2	50,7	10,7	17,9	50,8	54,1
Diploma biennale-triennale	56,5		10,0	17,3	51,7	
<b>Licenza media inferiore</b>	47,2	43,8	9,8	14,6	48,2	53,1
<b>Licenza elementare</b>	25,7	26,2	6,1	5,2	55,9	59,0
Nessun titolo	19,7		6,9	7,9	24,5	
<b>Totale</b>	<b>46,1</b>	<b>42,0</b>	<b>9,3</b>	<b>13,1</b>	<b>51,3</b>	<b>54,5</b>
<b>FEMMINE</b>						
<b>Laurea</b>	37,5	29,5	5,4	6,5	68,1	65,0
Diploma universitario	53,5		4,7	13,8	65,5	
<b>Diploma superiore (5 anni)</b>	33,2	25,9	3,8	8,5	63,0	69,1
Diploma biennale-triennale	31,4		1,4	5,8	77,3	
<b>Licenza media inferiore</b>	21,4	18,5	0,8	3,3	80,8	70,2
<b>Licenza elementare</b>	8,9	7,7	0,5	0,8	85,0	74,1
Nessun titolo	2,5		---	0,9	64,4	
<b>Totale</b>	<b>21,4</b>	<b>17,5</b>	<b>1,7</b>	<b>4,2</b>	<b>72,5</b>	<b>69,8</b>
<b>MASCHI E FEMMINE</b>						
<b>Laurea</b>	42,6	40,1	7,2	7,0	66,7	58,9
Diploma universitario	62,3		15,3	16,3	49,3	
<b>Diploma superiore (5 anni)</b>	45,7	38,3	7,3	13,2	55,2	59,2
Diploma biennale-triennale	46,4		6,5	12,7	58,7	
<b>Licenza media inferiore</b>	35,2	32,0	5,6	9,4	57,4	57,7
<b>Licenza elementare</b>	15,7	15,1	2,8	2,6	65,7	63,7
Nessun titolo	7,2		1,9	2,8	34,7	
<b>Totale</b>	<b>33,4</b>	<b>29,3</b>	<b>5,4</b>	<b>8,5</b>	<b>58,3</b>	<b>59,2</b>

a) = per 100 consumatori della stessa bevanda

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

**Tabella 70 - Distribuzione percentuale dei consumatori di AMARI di 14 anni e più secondo le classi di età, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto**

Età in classi	Consumo		Qualche bicchiere a settimana	Più raramente	Eccezionalmente a)		
	VENETO	ITALIA	VENETO	VENETO	VENETO	ITALIA	
MASCHI	14	---	---	---	---	---	
	15	---	---	---	---	---	
	16	17,3	---	---	4,1	76,5	
	17	38,8	---	---	11,4	70,6	
	<b>14-17</b>	<b>17,9</b>	<b>10,8</b>	---	4,9	<b>72,6</b>	<b>64,3</b>
	18	68,3	---	8,1	9,3	74,5	
	19	65,9	---	5,0	11,1	75,6	
	<b>18-19</b>	<b>66,9</b>	<b>32,0</b>	6,2	10,4	<b>75,1</b>	<b>54,5</b>
	<b>20-24</b>	<b>58,7</b>	<b>47,1</b>	11,2	19,8	<b>47,1</b>	<b>50,6</b>
	25-29	53,6	---	13,6	11,3	53,6	
	30-34	59,5	---	12,7	12,5	57,7	
	<b>25-34</b>	<b>56,7</b>	<b>54,7</b>	13,1	11,9	<b>55,8</b>	<b>50,6</b>
	35-39	48,0	---	12,7	10,4	51,8	
	40-44	53,1	---	7,3	15,0	58,1	
	<b>35-44</b>	<b>50,5</b>	<b>52,0</b>	10,0	12,7	<b>55,1</b>	<b>54,8</b>
	45-49	48,8	---	9,1	14,6	51,5	
	50-54	35,9	---	5,6	9,1	59,1	
	<b>45-54</b>	<b>42,2</b>	<b>49,6</b>	7,3	11,8	<b>54,8</b>	<b>55,8</b>
	<b>55-59</b>	<b>37,4</b>	<b>44,1</b>	5,2	6,4	<b>69,0</b>	<b>54,0</b>
	<b>60-64</b>	<b>35,6</b>	<b>39,8</b>	6,7	9,4	<b>54,9</b>	<b>55,8</b>
>=65	18,0	---	3,6	4,1	57,0		
<b>65-74</b>	<b>20,9</b>	<b>31,8</b>	3,8	4,3	<b>61,2</b>	<b>59,5</b>	
<b>&gt;=75</b>	<b>13,1</b>	<b>19,9</b>	3,2	3,9	<b>45,9</b>	<b>63,0</b>	
<b>Totale</b>	<b>42,2</b>	<b>43,2</b>	<b>8,1</b>	<b>10,4</b>	<b>56,3</b>	<b>54,5</b>	
FEMMINE	14	---	---	---	---	---	
	15	---	---	---	---	---	
	16	3,4	---	---	---	100,0	
	17	25,0	---	---	---	100,0	
	<b>14-17</b>	<b>3,2</b>	<b>5,6</b>	---	---	<b>100,0</b>	<b>83,8</b>
	18	10,1	---	---	---	100,0	
	19	33,6	---	---	9,6	71,3	
	<b>18-19</b>	<b>24,7</b>	<b>12,0</b>	---	<b>6,0</b>	<b>75,7</b>	<b>71,3</b>
	<b>20-24</b>	<b>22,1</b>	<b>17,5</b>	<b>5,1</b>	<b>7,5</b>	<b>43,0</b>	<b>69,3</b>
	25-29	33,2	---	3,9	3,2	78,5	
	30-34	27,0	---	3,9	3,0	74,6	
	<b>25-34</b>	<b>29,9</b>	<b>22,2</b>	<b>3,9</b>	<b>3,1</b>	<b>76,7</b>	<b>69,5</b>
	35-39	19,9	---	1,6	5,9	62,4	
	40-44	17,4	---	1,1	3,8	72,0	
	<b>35-44</b>	<b>18,8</b>	<b>20,8</b>	<b>1,4</b>	<b>4,9</b>	<b>66,5</b>	<b>72,8</b>
	45-49	22,6	---	4,0	1,4	76,3	
	50-54	18,5	---	3,3	0,0	82,0	
	<b>45-54</b>	<b>20,8</b>	<b>22,3</b>	<b>3,7</b>	<b>0,8</b>	<b>78,5</b>	<b>76,0</b>
	<b>55-59</b>	<b>13,3</b>	<b>16,1</b>	<b>0,0</b>	<b>3,1</b>	<b>76,4</b>	<b>79,5</b>
	<b>60-64</b>	<b>16,2</b>	<b>14,4</b>	<b>0,9</b>	<b>4,9</b>	<b>64,1</b>	<b>73,6</b>
>=65	9,5	---	1,5	1,8	65,5		
<b>65-74</b>	<b>10,6</b>	<b>9,3</b>	<b>1,2</b>	<b>1,9</b>	<b>70,4</b>	<b>75,9</b>	
<b>&gt;=75</b>	<b>8,2</b>	<b>5,2</b>	<b>1,8</b>	<b>1,7</b>	<b>57,2</b>	<b>73,6</b>	
<b>Totale</b>	<b>18,1</b>	<b>16,2</b>	<b>2,2</b>	<b>3,1</b>	<b>70,6</b>	<b>73,4</b>	

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

Tabella 70 – segue

**Maschie e femmine**

Età in classi	Consumo		Qualche bicchiere a settimana	Più raramente	Eccezionalmente a)	
	VENETO	ITALIA	VENETO	VENETO	VENETO	ITALIA
14	---		---	---	---	
15	---		---	---	---	
16	9,8		---	1,9	81,0	
17	36,3		---	9,4	74,1	
<b>14-17</b>	<b>10,7</b>	<b>8,3</b>	---	2,5	<b>76,5</b>	<b>70,5</b>
18	36,3		3,7	4,2	78,4	
19	47,4		2,1	10,3	73,8	
<b>18-19</b>	<b>43,1</b>	<b>21,9</b>	2,7	7,9	<b>75,3</b>	<b>59,1</b>
<b>20-24</b>	<b>41,3</b>	<b>32,4</b>	8,3	14,0	<b>46,1</b>	<b>55,6</b>
25-29	43,7		8,9	7,4	62,8	
30-34	43,2		8,3	7,7	63,0	
<b>25-34</b>	<b>43,4</b>	<b>38,6</b>	8,6	7,5	<b>62,9</b>	<b>56,0</b>
35-39	34,0		7,2	8,2	54,9	
40-44	36,6		4,4	9,8	61,1	
<b>35-44</b>	<b>35,3</b>	<b>36,5</b>	5,8	9,0	<b>58,0</b>	<b>59,9</b>
45-49	34,9		6,4	7,6	60,0	
50-54	27,7		4,5	4,8	66,3	
<b>45-54</b>	<b>31,5</b>	<b>35,7</b>	5,5	6,3	<b>62,7</b>	<b>62,2</b>
<b>55-59</b>	<b>25,4</b>	<b>29,6</b>	2,6	4,8	<b>70,9</b>	<b>61,2</b>
<b>60-64</b>	<b>25,9</b>	<b>27,2</b>	3,8	7,1	<b>57,8</b>	<b>60,5</b>
>=65	13,0		2,3	2,8	60,7	
<b>65-74</b>	<b>15,0</b>	<b>19,4</b>	2,3	2,9	<b>64,9</b>	<b>63,8</b>
<b>&gt;=75</b>	<b>10,0</b>	<b>10,6</b>	2,3	2,5	<b>51,7</b>	<b>66,3</b>
<b>Totale</b>	<b>29,8</b>	<b>29,2</b>	<b>5,1</b>	<b>6,6</b>	<b>60,8</b>	<b>59,9</b>

a) = per 100 consumatori della stessa bevanda

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

**Tabella 71 - Distribuzione percentuale dei consumatori di AMARI di 14 anni e più secondo la condizione lavorativa, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto**

Condizione lavorativa	Consumo		Almeno una volta alla settimana	Più raramente	Eccezionalmente a)	
	VENETO	ITALIA	VENETO	VENETO	VENETO	ITALIA
<b>MASCHI</b>						
<b>Occupati</b>	50,2	52,2	10,2	12,4	55,0	53,4
- Dirigenti; Imprenditori; Liberi Professionisti	43,5	51,8	8,4	6,7	65,1	54,9
- Direttivi; Quadri; Impiegati; Intermedi	55,2	52,7	11,0	14,1	54,4	57,8
- Operai, Apprendisti	47,9	52,2	10,4	13,4	50,4	49,1
- Lavoratori in proprio e coadiuvanti	52,0	51,5	9,7	11,7	58,7	52,9
<b>Disoccupati</b>	42,3		4,5	15,7	52,2	
- In cerca di nuova occupazione	57,2	46,8	0,0	21,4	62,5	51,4
- In cerca di prima occupazione	27,1	44,2	9,2	9,9	29,8	45,2
<b>Studenti</b>	43,4	28,2	5,6	9,4	65,6	58,9
<b>Ritirati dal lavoro</b>	25,2	30,9	4,1	6,0	59,9	60,0
<b>Altra condizione</b>	29,0	28,0	8,3	6,5	48,9	54,0
<b>Totale</b>	<b>42,6</b>	<b>43,7</b>	<b>8,1</b>	<b>10,5</b>	<b>56,3</b>	<b>54,5</b>
<b>FEMMINE</b>						
<b>Occupati</b>	24,0	22,4	3,0	3,5	72,7	72,1
- Dirigenti; Imprenditori; Liberi Professionisti	30,1	21,5	7,1	7,2	52,3	66,6
- Direttivi; Quadri; Impiegati; Intermedi	23,4	24,0	2,5	2,9	76,8	73,7
- Operai, Apprendisti	25,3	20,2	3,4	3,7	71,9	69,9
- Lavoratori in proprio e coadiuvanti	17,9	21,5	1,4	3,0	75,5	73,3
<b>Disoccupati</b>	35,1		2,7	8,1	69,3	
- In cerca di nuova occupazione	38,1	21,2	3,9	11,8	58,5	73,6
- In cerca di prima occupazione	28,6	19,0	0,0	0,0	100,0	70,0
<b>Casalinghe</b>	14,9	14,8	2,0	3,0	66,1	75,7
<b>Studenti</b>	14,6	13,6	2,0	2,9	66,5	72,0
<b>Ritirati dal lavoro</b>	12,4	9,7	1,1	2,4	71,9	75,5
<b>Altra condizione</b>	9,0	10,1	1,1	1,2	74,3	70,5
<b>Totale</b>	<b>18,2</b>	<b>16,4</b>	<b>2,2</b>	<b>3,1</b>	<b>70,6</b>	<b>73,4</b>
<b>MASCHI E FEMMINE</b>						
<b>Occupati</b>	39,7	40,7	7,3	8,9	59,2	57,3
- Dirigenti; Imprenditori; Liberi Professionisti	39,8	42,9	8,1	6,9	62,5	56,6
- Direttivi; Quadri; Impiegati; Intermedi	38,6	38,3	6,6	8,3	61,5	62,8
- Operai, Apprendisti	39,4	42,1	7,8	9,7	55,6	52,3
- Lavoratori in proprio e coadiuvanti	43,1	42,4	7,5	9,5	60,6	56,0
<b>Disoccupati</b>	38,1		3,5	11,3	61,3	
- In cerca di nuova occupazione	44,8	35,9	2,6	15,2	60,3	56,9
- In cerca di prima occupazione	27,8	31,5	4,8	5,2	63,8	52,8
<b>Casalinghe</b>	14,9	14,8	2,0	3,0	66,1	75,7
<b>Studenti</b>	28,8	20,6	3,8	6,1	65,8	63,4
<b>Ritirati dal lavoro</b>	19,6	21,7	2,8	4,4	63,2	63,0
<b>Altra condizione</b>	16,3	17,0	3,7	3,1	57,9	60,0
<b>Totale</b>	<b>30,1</b>	<b>29,6</b>	<b>5,1</b>	<b>6,7</b>	<b>60,8</b>	<b>59,9</b>

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

**Tabella 72 - Distribuzione percentuale dei consumatori di AMARI di 14 anni e più secondo il titolo di studio conseguito, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto**

Titolo di studio	Consumo		Almeno una volta alla settimana	Raramente	Eccezionalmente a)	
	VENETO	ITALIA	VENETO	VENETO	VENETO	ITALIA
<b>MASCHI</b>						
<b>Laurea</b>	<b>37,8</b>	<b>51,7</b>	7,8	5,1	<b>66,0</b>	<b>55,9</b>
Diploma universitario	39,8		15,2	8,2	41,2	
<b>Diploma superiore (5 anni)</b>	<b>50,2</b>	<b>51,6</b>	8,7	12,3	<b>58,1</b>	<b>51,8</b>
Diploma biennale-triennale	52,9		14,5	10,5	52,7	
<b>Licenza media inferiore</b>	<b>44,4</b>	<b>46,3</b>	7,6	11,3	<b>57,5</b>	<b>51,8</b>
<b>Licenza elementare</b>	<b>29,1</b>	<b>35,5</b>	5,4	9,0	<b>50,1</b>	<b>54,3</b>
Nessun titolo	15,1		2,7	5,3	47,2	
<b>Totale</b>	<b>42,2</b>	<b>45,6</b>	8,1	10,4	<b>56,3</b>	<b>52,6</b>
<b>FEMMINE</b>						
<b>Laurea</b>	<b>19,6</b>	<b>27,3</b>	2,4	---	<b>87,7</b>	<b>72,9</b>
Diploma universitario	27,7		---	10,1	63,7	
<b>Diploma superiore (5 anni)</b>	<b>23,1</b>	<b>22,4</b>	2,6	4,4	<b>69,7</b>	<b>69,5</b>
Diploma biennale-triennale	29,2		5,9	7,0	55,6	
<b>Licenza media inferiore</b>	<b>19,9</b>	<b>17,5</b>	2,3	2,3	<b>76,5</b>	<b>70,6</b>
<b>Licenza elementare</b>	<b>11,2</b>	<b>11,0</b>	0,6	2,3	<b>74,3</b>	<b>70,4</b>
Nessun titolo	7,5		3,7	3,0	10,5	
<b>Totale</b>	<b>18,1</b>	<b>17,2</b>	<b>2,2</b>	<b>3,1</b>	<b>70,6</b>	<b>70,4</b>
<b>MASCHI E FEMMINE</b>						
<b>Laurea</b>	<b>29,3</b>	<b>39,8</b>	5,3	2,7	<b>72,8</b>	<b>61,6</b>
Diploma universitario	31,8		5,1	9,4	54,2	
<b>Diploma superiore (5 anni)</b>	<b>36,7</b>	<b>37,0</b>	5,7	8,3	<b>61,8</b>	<b>57,2</b>
Diploma biennale-triennale	43,3		11,1	9,1	53,5	
<b>Licenza media inferiore</b>	<b>33,0</b>	<b>32,8</b>	5,1	7,1	<b>62,8</b>	<b>56,5</b>
<b>Licenza elementare</b>	<b>18,5</b>	<b>20,8</b>	2,6	5,0	<b>58,9</b>	<b>59,4</b>
Nessun titolo	9,5		3,4	3,6	26,3	
<b>Totale</b>	<b>29,8</b>	<b>30,9</b>	<b>5,1</b>	<b>6,6</b>	<b>60,8</b>	<b>57,7</b>

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

**Tabella 73 - Distribuzione percentuale dei consumatori di LIQUORI di 14 anni e più secondo le classi di età, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto**

Età in classi	Consumo		Qualche bicchiere a settimana	Più raramente	Eccezionalmente a)	
	VENETO	ITALIA	VENETO	VENETO	VENETO	ITALIA
14	13,9		---	6,3	54,5	
15	---		---	---	---	
16	23,8		---	5,9	75,1	
17	43,8		11,0	---	74,9	
<b>14-17</b>	<b>24,5</b>	<b>12,6</b>	<b>3,4</b>	<b>3,3</b>	<b>72,7</b>	<b>64,4</b>
18	56,7		8,1	---	85,7	
19	65,9		5,0	5,0	84,8	
<b>18-19</b>	<b>62,3</b>	<b>30,5</b>	<b>6,2</b>	<b>3,0</b>	<b>85,1</b>	<b>59,4</b>
<b>20-24</b>	<b>53,1</b>	<b>41,6</b>	<b>11,3</b>	<b>18,5</b>	<b>43,8</b>	<b>52,6</b>
25-29	51,7		10,9	15,1	49,8	
30-34	50,7		8,5	11,3	60,9	
<b>25-34</b>	<b>51,2</b>	<b>46,4</b>	<b>9,7</b>	<b>13,1</b>	<b>55,4</b>	<b>57,2</b>
35-39	43,9		3,8	10,6	67,3	
40-44	52,3		7,5	11,9	62,8	
<b>35-44</b>	<b>48,1</b>	<b>44,4</b>	<b>5,6</b>	<b>11,3</b>	<b>64,9</b>	<b>63,6</b>
45-49	47,1		8,7	9,7	60,9	
50-54	47,8		9,0	9,8	60,8	
<b>45-54</b>	<b>47,5</b>	<b>44,4</b>	<b>8,8</b>	<b>9,8</b>	<b>60,8</b>	<b>63,7</b>
<b>55-59</b>	<b>43,1</b>	<b>38,3</b>	<b>7,5</b>	<b>8,0</b>	<b>64,0</b>	<b>60,5</b>
<b>60-64</b>	<b>43,0</b>	<b>34,7</b>	<b>8,5</b>	<b>9,7</b>	<b>57,7</b>	<b>64,4</b>
>=65	21,2		6,5	2,6	57,1	
<b>65-74</b>	<b>23,6</b>	<b>24,0</b>	<b>5,0</b>	<b>2,5</b>	<b>68,4</b>	<b>64,0</b>
<b>&gt;=75</b>	<b>17,1</b>	<b>14,0</b>	<b>9,0</b>	<b>2,8</b>	<b>30,9</b>	<b>63,3</b>
<b>Totale</b>	<b>42,8</b>	<b>37,0</b>	<b>7,7</b>	<b>9,5</b>	<b>59,7</b>	<b>61,1</b>
<b>MASCHI</b>						
14	---		---	---	---	
15	6,7		---	6,7	---	
16	26,7		---	14,0	47,7	
17	25,0		---	25,0	---	
<b>14-17</b>	<b>14,8</b>	<b>7,4</b>	<b>---</b>	<b>9,4</b>	<b>36,6</b>	<b>64,3</b>
18	35,0		---	15,9	54,7	
19	44,3		5,1	15,6	53,3	
<b>18-19</b>	<b>40,8</b>	<b>20,0</b>	<b>3,2</b>	<b>15,7</b>	<b>53,7</b>	<b>56,8</b>
<b>20-24</b>	<b>28,2</b>	<b>20,5</b>	<b>2,5</b>	<b>1,1</b>	<b>87,2</b>	<b>68,9</b>
25-29	29,5		1,6	8,6	65,6	
30-34	25,6		2,6	4,5	72,2	
<b>25-34</b>	<b>27,4</b>	<b>17,5</b>	<b>2,2</b>	<b>6,4</b>	<b>68,8</b>	<b>71,0</b>
35-39	18,2		0,0	3,6	80,4	
40-44	17,9		0,0	4,0	77,5	
<b>35-44</b>	<b>18,1</b>	<b>14,6</b>	<b>0,0</b>	<b>3,8</b>	<b>79,1</b>	<b>78,6</b>
45-49	20,8		0,0	3,4	83,8	
50-54	21,8		1,1	5,5	69,9	
<b>45-54</b>	<b>21,3</b>	<b>13,8</b>	<b>0,5</b>	<b>4,3</b>	<b>77,3</b>	<b>79,4</b>
<b>55-59</b>	<b>15,9</b>	<b>11,3</b>	<b>1,2</b>	<b>2,1</b>	<b>79,3</b>	<b>84,6</b>
<b>60-64</b>	<b>15,8</b>	<b>9,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>88,0</b>	<b>84,6</b>
>=65	6,2		0,5	1,4	70,1	
<b>65-74</b>	<b>8,1</b>	<b>5,4</b>	<b>0,4</b>	<b>2,0</b>	<b>70,4</b>	<b>75,6</b>
<b>&gt;=75</b>	<b>3,7</b>	<b>3,1</b>	<b>0,5</b>	<b>0,6</b>	<b>69,2</b>	<b>75,7</b>
<b>Totale</b>	<b>18,1</b>	<b>12,1</b>	<b>0,9</b>	<b>3,9</b>	<b>73,9</b>	<b>75,1</b>
<b>FEMMINE</b>						

Tabella 73 - segue

## c) Maschi e Femmine

Età in classi	Consumo		Qualche bicchiere a settimana	Più raramente	Eccezionalmente a)	
	VENETO	ITALIA	VENETO	VENETO	VENETO	ITALIA
14	6,3		---	2,9	54,5	
15	4,2		---	4,2	---	
16	25,4		---	10,3	59,6	
17	40,5		9,1	4,4	66,8	
<b>14-17</b>	<b>19,7</b>	<b>10,2</b>	<b>1,7</b>	<b>6,3</b>	<b>59,5</b>	<b>64,4</b>
18	44,8		3,7	8,7	72,4	
19	53,6		5,1	11,1	69,9	
<b>18-19</b>	<b>50,2</b>	<b>25,2</b>	<b>4,5</b>	<b>10,2</b>	<b>70,7</b>	<b>58,4</b>
<b>20-24</b>	<b>41,3</b>	<b>31,1</b>	<b>7,1</b>	<b>10,2</b>	<b>57,9</b>	<b>57,9</b>
25-29	40,9		6,4	11,9	55,3	
30-34	38,0		5,6	7,8	64,7	
<b>25-34</b>	<b>39,4</b>	<b>32,1</b>	<b>6,0</b>	<b>9,8</b>	<b>60,1</b>	<b>60,9</b>
35-39	31,0		1,9	7,1	71,1	
40-44	36,4		4,1	8,3	66,2	
<b>35-44</b>	<b>33,6</b>	<b>29,6</b>	<b>2,9</b>	<b>7,7</b>	<b>68,5</b>	<b>67,3</b>
45-49	33,1		4,1	6,3	68,5	
50-54	35,5		5,2	7,7	63,4	
<b>45-54</b>	<b>34,2</b>	<b>28,8</b>	<b>4,6</b>	<b>7,0</b>	<b>66,0</b>	<b>67,5</b>
<b>55-59</b>	<b>29,5</b>	<b>24,3</b>	<b>4,4</b>	<b>5,0</b>	<b>68,1</b>	<b>66,3</b>
<b>60-64</b>	<b>29,5</b>	<b>22,1</b>	<b>4,3</b>	<b>5,8</b>	<b>65,8</b>	<b>68,6</b>
>=65	12,3		2,9	1,9	61,0	
<b>65-74</b>	<b>14,8</b>	<b>13,8</b>	<b>2,4</b>	<b>2,2</b>	<b>69,0</b>	<b>66,5</b>
<b>&gt;=75</b>	<b>8,6</b>	<b>7,1</b>	<b>3,7</b>	<b>1,4</b>	<b>41,2</b>	<b>66,7</b>
<b>Totale</b>	<b>30,1</b>	<b>24,1</b>	<b>4,2</b>	<b>6,6</b>	<b>64,1</b>	<b>64,7</b>

a) = per 100 consumatori della stessa bevanda

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

**Tabella 74 - Distribuzione percentuale dei consumatori di LIQUORI di 14 anni e più secondo la condizione lavorativa, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto**

Condizione lavorativa	Consumo		Almeno una volta alla settimana	Più raramente	Eccezionalmente a)	
	VENETO	ITALIA	VENETO	VENETO	VENETO	ITALIA
<b>MASCHI</b>						
<b>Occupati</b>	48,6	52,2	8,1	11,8	59,0	53,4
- Dirigenti; Imprenditori; Liberi Professionisti	49,2	51,8	6,4	8,9	69,0	54,9
- Direttivi; Quadri; Impiegati; Intermedi	60,4	52,7	10,5	16,8	54,7	57,8
- Operai, Apprendisti	40,7	52,2	6,5	9,4	60,8	49,1
- Lavoratori in proprio e coadiuvanti	46,6	51,5	9,0	11,0	56,9	52,9
<b>Disoccupati</b>	39,0		3,2	4,9	79,2	
- In cerca di nuova occupazione	48,8	46,8	6,4	0,0	87,0	51,4
- In cerca di prima occupazione	28,9	44,2	0,0	9,9	65,8	45,2
<b>Studenti</b>	46,8	28,2	10,4	7,6	61,4	58,9
<b>Ritirati dal lavoro</b>	29,1	30,9	6,6	4,8	61,0	60,0
<b>Altra condizione</b>	40,7	28,0	7,0	11,9	53,5	54,0
<b>Totale</b>	<b>43,1</b>	<b>43,7</b>	<b>7,8</b>	<b>9,6</b>	<b>59,7</b>	<b>54,5</b>
<b>FEMMINE</b>						
<b>Occupati</b>	24,3	22,4	1,2	5,8	71,0	72,1
- Dirigenti; Imprenditori; Liberi Professionisti	39,7	21,5	2,5	9,6	69,5	66,6
- Direttivi; Quadri; Impiegati; Intermedi	26,6	24,0	1,2	6,6	70,9	73,7
- Operai, Apprendisti	19,0	20,2	1,0	4,5	71,5	69,9
- Lavoratori in proprio e coadiuvanti	21,6	21,5	1,4	4,6	72,3	73,3
<b>Disoccupati</b>	25,0		5,0	5,1	59,8	
- In cerca di nuova occupazione	27,6	21,2	7,3	7,5	46,4	73,6
- In cerca di prima occupazione	19,5	19,0	0,0	0,0	100,0	70,0
<b>Casalinghe</b>	13,0	14,8	0,3	1,2	88,6	75,7
<b>Studenti</b>	33,2	13,6	1,0	9,8	67,4	72,0
<b>Ritirati dal lavoro</b>	9,7	9,7	0,0	2,1	78,0	75,5
<b>Altra condizione</b>	6,3	10,1	2,3	1,2	45,0	70,5
<b>Totale</b>	<b>18,3</b>	<b>16,4</b>	<b>0,9</b>	<b>3,9</b>	<b>73,9</b>	<b>73,4</b>
<b>MASCHI E FEMMINE</b>						
<b>Occupati</b>	38,8	40,7	5,4	9,4	62,0	57,3
- Dirigenti; Imprenditori; Liberi Professionisti	46,6	42,9	5,3	9,1	69,1	56,6
- Direttivi; Quadri; Impiegati; Intermedi	42,7	38,3	5,6	11,5	60,0	62,8
- Operai, Apprendisti	32,5	42,1	4,4	7,6	63,2	52,3
- Lavoratori in proprio e coadiuvanti	40,0	42,4	7,0	9,3	59,1	56,0
<b>Disoccupati</b>	30,9		4,2	5,0	70,1	
- In cerca di nuova occupazione	35,0	35,9	7,0	4,9	66,2	56,9
- In cerca di prima occupazione	24,5	31,5	0,0	5,2	78,6	52,8
<b>Casalinghe</b>	13,0	14,8	0,3	1,2	88,6	75,7
<b>Studenti</b>	39,9	20,6	5,7	8,7	63,9	63,4
<b>Ritirati dal lavoro</b>	20,7	21,7	3,7	3,6	64,5	63,0
<b>Altra condizione</b>	18,8	17,0	4,0	5,1	51,7	60,0
<b>Totale</b>	<b>30,3</b>	<b>29,6</b>	<b>4,2</b>	<b>6,7</b>	<b>64,1</b>	<b>59,9</b>

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

**Tabella 75 - Distribuzione percentuale dei consumatori di LIQUORI di 14 anni e più secondo il titolo di studio conseguito, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto**

Titolo di studio	Consumo		Almeno una volta alla settimana	Raramente	Eccezionalmente a)	
	VENETO	ITALIA	VENETO	VENETO	VENETO	ITALIA
<b>MASCHI</b>						
<b>Laurea</b>	<b>43,6</b>	<b>51,5</b>	<b>8,6</b>	<b>7,7</b>	<b>62,7</b>	<b>59,1</b>
Diploma universitario	39,8		23,4	---	41,2	
<b>Diploma superiore (5 anni)</b>	<b>56,2</b>	<b>47,9</b>	<b>9,2</b>	<b>15,5</b>	<b>56,0</b>	<b>59,1</b>
Diploma biennale-triennale	49,9		10,8	12,3	53,7	
<b>Licenza media inferiore</b>	<b>39,6</b>	<b>40,0</b>	<b>5,1</b>	<b>8,2</b>	<b>66,3</b>	<b>60,0</b>
<b>Licenza elementare</b>	<b>32,2</b>	<b>26,9</b>	<b>8,5</b>	<b>5,3</b>	<b>57,1</b>	<b>60,5</b>
Nessun titolo	12,6		2,3	2,9	58,2	
<b>Totale</b>	<b>42,8</b>	<b>39,9</b>	<b>7,7</b>	<b>9,5</b>	<b>59,7</b>	<b>59,7</b>
<b>FEMMINE</b>						
<b>Laurea</b>	<b>28,0</b>	<b>23,5</b>	<b>2,6</b>	<b>5,6</b>	<b>70,6</b>	<b>75,3</b>
Diploma universitario	38,8		---	10,1	74,1	
<b>Diploma superiore (5 anni)</b>	<b>26,3</b>	<b>19,0</b>	<b>1,2</b>	<b>5,4</b>	<b>75,1</b>	<b>76,4</b>
Diploma biennale-triennale	26,0		0,9	6,4	72,2	
<b>Licenza media inferiore</b>	<b>17,5</b>	<b>13,8</b>	<b>0,7</b>	<b>4,2</b>	<b>71,8</b>	<b>73,5</b>
<b>Licenza elementare</b>	<b>10,5</b>	<b>6,1</b>	<b>0,4</b>	<b>1,8</b>	<b>78,8</b>	<b>75,0</b>
Nessun titolo	3,6		0,9	0,9	48,7	
<b>Totale</b>	<b>18,1</b>	<b>13,2</b>	<b>0,9</b>	<b>3,9</b>	<b>73,9</b>	<b>75,0</b>
<b>MASCHI E FEMMINE</b>						
<b>Laurea</b>	<b>36,3</b>	<b>37,8</b>	<b>5,8</b>	<b>6,7</b>	<b>65,6</b>	<b>64,0</b>
Diploma universitario	39,1		7,9	6,7	62,8	
<b>Diploma superiore (5 anni)</b>	<b>41,2</b>	<b>33,4</b>	<b>5,2</b>	<b>10,4</b>	<b>62,1</b>	<b>64,0</b>
Diploma biennale-triennale	40,3		6,8	9,9	58,5	
<b>Licenza media inferiore</b>	<b>29,3</b>	<b>27,8</b>	<b>3,1</b>	<b>6,3</b>	<b>67,8</b>	<b>63,2</b>
<b>Licenza elementare</b>	<b>19,3</b>	<b>14,4</b>	<b>3,7</b>	<b>3,2</b>	<b>64,2</b>	<b>64,1</b>
Nessun titolo	6,0		1,3	1,5	54,1	
<b>Totale</b>	<b>30,1</b>	<b>26,1</b>	<b>4,2</b>	<b>6,6</b>	<b>64,1</b>	<b>63,7</b>

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

**Tabella 76 - Distribuzione percentuale dei consumatori di *ALCOLICI FUORI DEI PASTI* di 14 anni e più secondo le classi di età, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto**

	Età in classi	Consumo		Più raramente		Eccezionalmente a)	
		VENETO	ITALIA	VENETO	VENETO	ITALIA	
<b>MASCHI</b>	14	13,9		6,3		54,5	
	15	---		---		---	
	16	23,8		5,9		75,1	
	17	43,8		---		74,9	
	<b>14-17</b>	<b>24,5</b>	<b>12,6</b>	<b>3,3</b>		<b>72,7</b>	<b>64,4</b>
	18	56,7		---		85,7	
	19	65,9		5,0		84,8	
	<b>18-19</b>	<b>62,3</b>	<b>30,5</b>	<b>3,0</b>		<b>85,1</b>	<b>59,4</b>
	<b>20-24</b>	<b>53,1</b>	<b>41,6</b>	<b>18,5</b>		<b>43,8</b>	<b>52,6</b>
	25-29	51,7		15,1		49,8	
	30-34	50,7		11,3		60,9	
	<b>25-34</b>	<b>51,2</b>	<b>46,4</b>	<b>13,1</b>		<b>55,4</b>	<b>57,2</b>
	35-39	43,9		10,6		67,3	
	40-44	52,3		11,9		62,8	
	<b>35-44</b>	<b>48,1</b>	<b>44,4</b>	<b>11,3</b>		<b>64,9</b>	<b>63,6</b>
	45-49	47,1		9,7		60,9	
	50-54	47,8		9,8		60,8	
	<b>45-54</b>	<b>47,5</b>	<b>44,4</b>	<b>9,8</b>		<b>60,8</b>	<b>63,7</b>
	<b>55-59</b>	<b>43,1</b>	<b>38,3</b>	<b>8,0</b>		<b>64,0</b>	<b>60,5</b>
	<b>60-64</b>	<b>43,0</b>	<b>34,7</b>	<b>9,7</b>		<b>57,7</b>	<b>64,4</b>
>=65	21,2		2,6		57,1		
<b>65-74</b>	<b>23,6</b>	<b>24,0</b>	<b>2,5</b>		<b>68,4</b>	<b>64,0</b>	
<b>&gt;=75</b>	<b>17,1</b>	<b>14,0</b>	<b>2,8</b>		<b>30,9</b>	<b>63,3</b>	
<b>Totale</b>	<b>42,8</b>	<b>37,0</b>	<b>9,5</b>		<b>59,7</b>	<b>61,1</b>	
<b>FEMMINE</b>	<b>14</b>	---		---		---	
	<b>15</b>	6,7		---		100,0	
	<b>16</b>	28,1		10,0		64,3	
	<b>17</b>	25,0		---		100,0	
	<b>14-17</b>	<b>15,4</b>	<b>11,5</b>	<b>4,3</b>		<b>72,3</b>	<b>80,5</b>
	<b>18</b>	16,3		---		100,0	
	<b>19</b>	38,7		10,2		73,7	
	<b>18-19</b>	<b>30,2</b>	<b>26,3</b>	<b>6,3</b>		<b>79,1</b>	<b>72,8</b>
	<b>20-24</b>	<b>45,9</b>	<b>26,6</b>	<b>11,5</b>		<b>74,9</b>	<b>71,7</b>
	<b>25-29</b>	33,8		8,8		73,9	
	<b>30-34</b>	30,9		6,9		77,8	
	<b>25-34</b>	<b>32,3</b>	<b>18,5</b>	<b>7,8</b>		<b>75,9</b>	<b>77,3</b>
	<b>35-39</b>	23,3		4,5		80,8	
	<b>40-44</b>	19,9		2,1		84,5	
	<b>35-44</b>	<b>21,8</b>	<b>12,3</b>	<b>3,4</b>		<b>82,3</b>	<b>83,2</b>
	<b>45-49</b>	22,1		3,5		84,0	
	<b>50-54</b>	16,9		2,6		84,8	
	<b>45-54</b>	<b>19,8</b>	<b>12,1</b>	<b>3,1</b>		<b>84,3</b>	<b>82,2</b>
	<b>55-59</b>	<b>19,6</b>	<b>9,3</b>	<b>7,4</b>		<b>54,9</b>	<b>77,6</b>
	<b>60-64</b>	<b>17,7</b>	<b>7,5</b>	<b>1,6</b>		<b>87,4</b>	<b>83,6</b>
>=65	5,8		1,0		66,5		
<b>65-74</b>	<b>6,4</b>	<b>5,3</b>	<b>1,4</b>		<b>68,2</b>	<b>74,3</b>	
<b>&gt;=75</b>	<b>5,1</b>	<b>3,2</b>	<b>0,6</b>		<b>63,7</b>	<b>81,7</b>	
<b>Totale</b>	<b>20,4</b>	<b>12,1</b>	<b>4,2</b>		<b>77,2</b>	<b>78,4</b>	

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

Tabella 76 - segue

Età in classi	Consumo		Qualche volta alla settimana	Consumo di alcolici fuori pasto meno di una volta a settimana a)	
	VENETO	ITALIA		VENETO	ITALIA
14	9,2		3,4	63,0	
15	8,1		---	100,0	
16	32,7		10,6	67,5	
17	62,8		21,3	66,1	
<b>14-17</b>	<b>28,6</b>	<b>15,1</b>	<b>9,0</b>	<b>68,4</b>	<b>73,2</b>
18	43,0		6,3	85,4	
19	52,4		22,8	52,1	
<b>18-19</b>	<b>48,8</b>	<b>31,9</b>	<b>16,4</b>	<b>63,5</b>	<b>68,0</b>
<b>20-24</b>	<b>57,0</b>	<b>35,0</b>	<b>23,5</b>	<b>58,7</b>	<b>61,2</b>
25-29	45,8		16,5	62,2	
30-34	43,4		11,7	66,1	
<b>25-34</b>	<b>44,6</b>	<b>31,3</b>	<b>14,0</b>	<b>64,1</b>	<b>67,1</b>
35-39	37,2		9,1	72,9	
40-44	40,8		10,6	70,5	
<b>35-44</b>	<b>38,9</b>	<b>24,7</b>	<b>9,8</b>	<b>71,7</b>	<b>72,5</b>
45-49	35,9		9,6	65,8	
50-54	34,3		10,7	64,8	
<b>45-54</b>	<b>35,2</b>	<b>24,0</b>	<b>10,2</b>	<b>65,3</b>	<b>70,6</b>
<b>55-59</b>	<b>35,8</b>	<b>22,3</b>	<b>13,2</b>	<b>53,0</b>	<b>66,5</b>
<b>60-64</b>	<b>39,9</b>	<b>20,9</b>	<b>13,1</b>	<b>55,6</b>	<b>67,1</b>
>=65	20,1		5,6	60,0	
<b>65-74</b>	<b>22,6</b>	<b>15,0</b>	<b>5,5</b>	<b>68,6</b>	<b>67,2</b>
<b>&gt;=75</b>	<b>16,4</b>	<b>9,7</b>	<b>5,8</b>	<b>43,2</b>	<b>67,9</b>
<b>Totale</b>	<b>36,3</b>	<b>23,2</b>	<b>11,2</b>	<b>63,6</b>	<b>68,4</b>

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

**Tabella 77 - Distribuzione percentuale dei consumatori di *ALCOLICI FUORI DEI PASTI* di 14 anni e più secondo la condizione lavorativa, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto**

Condizione lavorativa	Consumo		Qualche volta alla settimana	Consumo di alcolici fuori pasto meno di una volta a settimana a)	
	VENETO	ITALIA		VENETO	ITALIA
<b>MASCHI</b>					
<b>Occupati</b>	55,8	39,4	19,1	59,6	65,7
- Dirigenti; Imprenditori; Liberi Professionisti	54,1	38,8	18,8	60,4	66,6
- Direttivi; Quadri; Impiegati; Intermedi	58,7	37,7	17,4	66,2	69,3
- Operai, Apprendisti	52,7	40,8	16,1	61,4	63,0
- Lavoratori in proprio e coadiuvanti	59,0	40,1	27,8	46,6	64,6
<b>Disoccupati</b>	45,9		32,6	29,1	
- In cerca di nuova occupazione	65,2	36,6	37,5	42,5	59,9
- In cerca di prima occupazione	28,0	30,4	28,0	0,0	61,4
<b>Studenti</b>	61,3	33,9	25,0	54,9	59,8
<b>Ritirati dal lavoro</b>	47,1	28,7	14,7	57,0	64,3
<b>Altra condizione</b>	40,9	24,5	18,0	56,0	62,9
<b>Totale</b>	<b>53,4</b>	<b>35,4</b>	<b>18,7</b>	<b>58,0</b>	<b>64,6</b>
<b>FEMMINE</b>					
<b>Occupati</b>	28,0	17,5	5,9	77,3	78,9
- Dirigenti; Imprenditori; Liberi Professionisti	40,9	18,7	4,8	88,3	82,5
- Direttivi; Quadri; Impiegati; Intermedi	27,6	18,0	6,4	76,8	80,5
- Operai, Apprendisti	25,0	18,0	5,1	77,1	75,9
- Lavoratori in proprio e coadiuvanti	30,8	14,0	7,1	70,0	75,5
<b>Disoccupati</b>	36,1		5,0	86,3	
- In cerca di nuova occupazione	45,3	20,2	7,3	83,9	79,0
- In cerca di prima occupazione	16,3	15,8	0,0	100,0	71,2
<b>Casalinghe</b>	15,5	7,2	3,8	72,7	79,9
<b>Studenti</b>	36,2	23,6	8,1	77,6	76,0
<b>Ritirati dal lavoro</b>	7,5	5,5	0,7	79,1	79,7
<b>Altra condizione</b>	10,5	6,3	1,2	88,5	81,5
<b>Totale</b>	<b>20,6</b>	<b>12,2</b>	<b>4,3</b>	<b>77,2</b>	<b>78,4</b>
<b>MASCHI E FEMMINE</b>					
<b>Occupati</b>	44,7	31,0	13,8	64,0	68,6
- Dirigenti; Imprenditori; Liberi Professionisti	50,6	32,9	15,0	66,5	69,3
- Direttivi; Quadri; Impiegati; Intermedi	42,5	27,8	11,7	69,8	72,9
- Operai, Apprendisti	42,2	33,6	11,9	64,9	65,2
- Lavoratori in proprio e coadiuvanti	51,6	32,1	22,4	50,2	66,1
<b>Disoccupati</b>	40,3		16,9	58,1	
- In cerca di nuova occupazione	52,3	29,7	17,9	65,8	65,4
- In cerca di prima occupazione	22,8	23,0	15,5	32,0	64,8
<b>Casalinghe</b>	15,5	7,2	3,8	72,7	79,9
<b>Studenti</b>	48,5	28,6	16,4	63,5	66,7
<b>Ritirati dal lavoro</b>	29,8	18,7	8,6	59,4	66,2
<b>Altra condizione</b>	21,6	13,3	7,3	66,0	68,4
<b>Totale</b>	<b>36,6</b>	<b>23,4</b>	<b>11,3</b>	<b>63,6</b>	<b>68,3</b>

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

**Tabella 78 - Distribuzione percentuale dei consumatori di *ALCOLICI FUORI DEI PASTI* di 14 anni e più secondo il titolo di studio conseguito, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto**

Titolo di studio	Consumo		Qualche volta alla settimana	Consumo di alcolici fuori pasto meno di una volta a settimana a)	
	VENETO	ITALIA		VENETO	VENETO
<b>MASCHI</b>					
<b>Laurea</b>	<b>50,9</b>	<b>39,1</b>	<b>16,6</b>	<b>64,0</b>	<b>74,8</b>
Diploma universitario	64,8		32,3	50,1	
<b>Diploma superiore (5 anni)</b>	<b>59,4</b>	<b>41,3</b>	<b>20,8</b>	<b>58,2</b>	<b>67,0</b>
Diploma biennale-triennale	55,2		17,1	63,2	
<b>Licenza media inferiore</b>	<b>52,7</b>	<b>38,7</b>	<b>19,1</b>	<b>59,0</b>	<b>66,6</b>
<b>Licenza elementare</b>	<b>47,8</b>	<b>31,8</b>	<b>15,9</b>	<b>53,2</b>	<b>63,4</b>
Nessun titolo	28,9		15,3	37,0	
<b>Totale</b>	<b>53,1</b>	<b>37,8</b>	<b>18,6</b>	<b>58,0</b>	<b>66,7</b>
<b>FEMMINE</b>					
<b>Laurea</b>	<b>29,3</b>	<b>18,6</b>	<b>5,4</b>	<b>81,6</b>	<b>77,5</b>
Diploma universitario	53,5		4,7	79,8	
<b>Diploma superiore (5 anni)</b>	<b>29,7</b>	<b>18,6</b>	<b>6,8</b>	<b>77,3</b>	<b>81,8</b>
Diploma biennale-triennale	28,2		3,4	87,8	
<b>Licenza media inferiore</b>	<b>21,3</b>	<b>14,3</b>	<b>5,1</b>	<b>74,8</b>	<b>81,9</b>
<b>Licenza elementare</b>	<b>11,1</b>	<b>6,6</b>	<b>2,1</b>	<b>73,1</b>	<b>80,4</b>
Nessun titolo	---		---	---	
<b>Totale</b>	<b>20,4</b>	<b>13,1</b>	<b>4,2</b>	<b>77,2</b>	<b>81,2</b>
<b>MASCHI E FEMMINE</b>					
<b>Laurea</b>	<b>40,8</b>	<b>29,1</b>	<b>11,4</b>	<b>69,9</b>	<b>75,7</b>
Diploma universitario	57,3		14,0	68,5	
<b>Diploma superiore (5 anni)</b>	<b>44,5</b>	<b>29,9</b>	<b>13,8</b>	<b>64,6</b>	<b>71,6</b>
Diploma biennale-triennale	44,4		11,6	69,5	
<b>Licenza media inferiore</b>	<b>38,1</b>	<b>27,3</b>	<b>12,6</b>	<b>63,1</b>	<b>70,4</b>
<b>Licenza elementare</b>	<b>25,9</b>	<b>16,6</b>	<b>7,7</b>	<b>58,3</b>	<b>67,5</b>
Nessun titolo	7,9		4,2	37,0	
<b>Totale</b>	<b>36,3</b>	<b>25,0</b>	<b>11,2</b>	<b>63,6</b>	<b>70,6</b>

Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo

