

Uso di sostanze illegali nella popolazione giovanile scolarizzata. Anno 2016 (stime pesate).

ITALIA	15-19			PREVALENZA NELLA VITA (%)														
SOSTANZE				15			16			17			18			19		
				M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T
Cannabis	37,1	27,6	32,4	16,1	13,1	14,6	26,8	20,2	23,5	38,5	29,6	34,1	49,1	35,7	42,4	54,9	40,5	48,0
Cocaina (totale)	4,8	2,3	3,6	3,5	1,3	2,4	3,9	1,9	2,9	4,2	2,5	3,3	5,8	3,0	4,4	6,5	3,1	4,8
Eroina (totale)	1,9	1,0	1,5	1,9	0,8	1,3	1,6	1,1	1,4	2,0	1,2	1,6	2,3	1,2	1,7	1,7	1,0	1,4
Allucinogeni (totale)	4,5	2,1	3,3	3,1	1,8	2,5	3,8	1,8	2,8	4,3	1,7	3,0	5,4	2,3	3,8	5,9	2,7	4,4
Stimolanti (totale)	4,7	2,5	3,6	3,1	1,9	2,5	3,0	2,6	2,8	4,4	2,1	3,3	5,3	2,4	3,9	7,3	3,5	5,5
Alcol	88,4	85,4	86,9	77,8	72,6	75,2	85,3	82,8	84,1	89,8	87,4	88,6	94,4	91,2	92,8	94,8	94,1	94,4
Energy drink	66,5	47,2	57,0	58,0	41,9	49,8	62,7	44,8	53,8	67,8	48,1	58,0	71,2	51,7	61,5	73,1	50,4	62,2
Tabacco	59,7	61,2	60,4	42,6	45,0	43,8	53,1	56,3	54,7	60,8	61,4	61,1	69,1	69,1	69,1	73,0	75,2	74,0
Anabolizzanti	2,5	1,3	1,9	2,8	1,6	2,2	2,6	0,8	1,7	2,5	1,4	2,0	3,2	1,5	2,4	1,6	1,4	1,5
Psicofarmaci (totale)	11,4	22,4	17,0	12,3	19,9	16,3	8,7	19,8	14,3	12,2	22,1	17,3	12,0	24,8	18,6	11,6	25,6	18,5
Farmaci attenzione	4,4	6,3	5,4	3,9	5,4	4,7	3,4	5,3	4,3	5,8	6,0	5,9	4,7	7,9	6,4	4,4	7,1	5,7
Farmaci diete	2,3	7,5	5,0	2,2	7,0	4,7	1,7	7,1	4,4	2,9	6,1	4,6	2,7	8,7	5,8	2,2	8,7	5,4
Farmaci dormire	8,3	16,4	12,4	9,9	13,3	11,7	5,8	14,2	10,0	8,7	16,5	12,8	9,1	18,2	13,8	8,0	19,6	13,7
Farmaci umore	2,6	5,4	4,0	2,5	4,8	3,7	1,4	4,6	3,0	3,2	5,3	4,3	3,4	5,9	4,7	2,6	6,1	4,3
Gioco d'azzardo	57,8	37,6	47,4	46,5	32,1	38,9	53,1	34,4	43,6	58,3	34,2	45,8	63,6	40,8	51,7	67,2	46,2	56,7

Fonte: Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche
Nota: allucinogeni: LSD, funghi allucingeni e ketamina; stimolanti: amfetamine, ecstasy, MDMA e GHB
Psicofarmaci: farmaci per dormire, diete, iperattività e umore

ITALIA	15-19			PREVALENZA NEGLI ULTIMI DODICI MESI (%)														
SOSTANZE				15			16			17			18			19		
				M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T
Cannabis	30,6	20,8	25,8	14,4	10,3	12,3	22,5	16,7	19,7	32,3	22,7	27,6	40,0	27,5	33,8	43,7	28,0	36,2
Cocaina (totale)	3,4	1,5	2,5	2,9	0,6	1,7	2,6	1,3	2,0	2,8	1,6	2,2	3,9	2,2	3,1	4,8	1,8	3,3
Eroina (totale)	1,5	0,8	1,1	1,7	0,5	1,1	1,1	0,8	0,9	1,5	1,0	1,2	1,9	0,9	1,4	1,3	0,7	1,0
Allucinogeni (totale)	2,9	1,3	2,1	2,5	1,0	1,7	2,8	1,1	2,0	3,0	1,4	2,2	3,2	1,8	2,5	3,0	1,4	2,2
Stimolanti (totale)	3,2	1,7	2,4	2,4	0,9	1,7	2,2	1,7	1,9	3,4	1,6	2,5	3,4	1,8	2,6	4,4	2,2	3,3
Alcol	81,8	76,8	79,3	66,5	60,4	63,4	78,4	73,7	76,1	84,4	79,0	81,8	89,5	85,0	87,3	90,3	87,4	88,9
Energy drink	53,0	28,4	40,8	45,5	26,9	36,1	49,3	28,6	39,0	54,5	29,5	42,1	56,4	30,4	43,5	59,1	27,1	43,7
Tabacco	43,0	44,5	43,8	28,1	33,1	30,6	37,1	41,9	39,5	43,7	45,8	44,8	51,3	48,4	49,8	54,9	54,3	54,6
Tabacco (almeno una sigaretta al giorno)	25,0	23,8	24,4	11,1	13,7	12,4	18,7	22,0	20,3	25,1	23,0	24,1	31,6	26,6	29,1	38,1	34,2	36,2
Anabolizzanti	1,8	1,0	1,4	1,8	1,2	1,5	1,9	0,7	1,3	2,0	1,1	1,6	2,3	1,2	1,7	1,2	0,9	1,1
Psicofarmaci (totale)	5,8	12,5	9,2	5,2	11,3	8,4	5,1	10,9	8,0	5,9	11,5	8,8	7,1	14,2	10,8	5,8	14,5	10,1
Farmaci attenzione	2,5	3,4	2,9	2,4	3,1	2,8	1,6	2,6	2,1	3,1	3,1	3,1	2,7	4,4	3,6	2,7	3,7	3,2
Farmaci diete	1,4	4,0	2,7	1,1	4,2	2,7	1,3	4,2	2,8	1,4	3,2	2,3	1,9	4,4	3,2	1,4	4,1	2,7
Farmaci dormire	3,9	8,8	6,4	3,7	7,2	5,5	2,9	7,6	5,3	3,9	8,3	6,2	5,1	10,5	7,9	3,8	10,4	7,0
Farmaci umore	1,8	3,1	2,5	1,7	2,2	2,0	0,9	2,8	1,8	2,1	3,7	2,9	2,3	3,5	2,9	2,0	3,4	2,7
Gioco d'azzardo	50,3	29,8	40,1	41,9	25,7	33,7	48,4	28,4	38,4	50,7	28,7	39,8	52,5	31,0	41,7	57,8	35,5	47,0

Fonte: Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche
Nota: allucinogeni: LSD, funghi allucingeni e ketamina; stimolanti: amfetamine, ecstasy, MDMA e GHB
Psicofarmaci: farmaci per dormire, diete, iperattività e umore

ITALIA	15-19			PREVALENZA NEGLI ULTIMI TRENTA GIORNI (%)														
SOSTANZE				15			16			17			18			19		
				M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T
Cannabis	20,2	12,0	16,1	9,6	6,3	7,9	14,4	10,0	12,3	22,5	13,0	17,9	27,0	15,1	21,1	27,4	16,0	22,0
Cocaina (totale)	2,2	0,9	1,6	2,2	0,4	1,3	2,0	0,7	1,4	2,3	1,1	1,7	2,6	1,5	2,1	2,1	0,7	1,4
Eroina (totale)	1,3	0,6	0,9	1,5	0,4	0,9	0,9	0,6	0,8	1,4	0,8	1,1	1,6	0,9	1,2	1,0	0,4	0,7
Allucinogeni (totale)	1,8	0,7	1,3	2,1	0,6	1,3	1,4	0,5	1,0	2,0	0,8	1,4	2,0	1,2	1,6	1,6	0,4	1,0
Stimolanti (totale)	2,0	1,0	1,5	1,7	0,8	1,3	1,8	0,9	1,4	2,0	1,1	1,6	2,8	1,1	2,0	2,0	1,2	1,6
Alcol	65,6	57,7	61,7	46,7	37,0	41,8	58,9	53,0	56,0	68,2	59,3	63,8	76,8	69,7	73,3	77,6	71,4	74,6
Energy drink	36,6	15,5	26,2	32,5	15,2	23,7	35,8	15,7	25,7	38,3	17,0	27,8	38,5	16,2	27,4	38,3	13,4	26,3
Binge drinking	38,1	29,7	34,0	22,7	19,4	21,0	32,1	29,0	30,6	40,4	31,0	35,8	48,5	35,7	42,1	47,2	34,7	41,2
Tabacco	36,5	37,0	36,7	21,5	26,5	24,0	30,0	34,4	32,2	37,5	38,1	37,8	44,5	39,9	42,2	48,8	46,6	47,7
Anabolizzanti	1,6	0,7	1,2	1,6	0,8	1,2	1,6	0,6	1,1	1,7	0,7	1,2	2,2	0,9	1,5	0,8	0,6	0,7
Psicofarmaci (totale)	3,7	7,3	5,5	3,1	7,0	5,1	3,0	6,2	4,6	4,2	6,6	5,4	4,5	8,0	6,3	3,8	8,7	6,2
Farmaci attenzione	1,8	2,0	1,9	1,5	1,8	1,7	0,9	1,7	1,3	2,4	2,2	2,3	1,8	2,1	2,0	2,2	2,3	2,2
Farmaci diete	1,0	2,5	1,8	0,9	2,8	1,9	0,8	2,5	1,7	1,3	1,6	1,4	1,4	2,6	2,1	0,8	2,9	1,9
Farmaci dormire	2,4	4,9	3,7	2,1	3,7	2,9	1,6	4,3	3,0	2,8	4,6	3,7	3,0	6,2	4,6	2,4	6,0	4,2
Farmaci umore	1,5	2,3	1,9	1,6	1,6	1,6	0,8	2,0	1,4	2,0	2,9	2,5	1,7	2,6	2,2	1,6	2,6	2,1

Fonte: Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche
Nota: allucinogeni: LSD, funghi allucingeni e ketamina; stimolanti: amfetamine, ecstasy, MDMA e GHB; binge drinking: 5 o più "bevute" di fila
Psicofarmaci: farmaci per dormire, diete, iperattività e umore