

Uso di sostanze illegali nella popolazione giovanile scolarizzata. Anno 2018 (stime pesate).

ITALIA	15-19			PREVALENZA NELLA VITA (%)														
SOSTANZE				15			16			17			18			19		
				M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T
Cannabis	36,8	29,4	33,2	14,9	11,2	13,1	26,4	19,4	23,0	39,5	33,1	36,4	46,9	37,5	42,2	55,3	46,6	51,2
Cocaina (totale)	3,5	2,1	2,8	1,7	1,5	1,6	1,8	1,5	1,7	3,4	2,3	2,9	4,1	2,1	3,1	6,5	3,2	4,9
Eroina (totale)	1,7	1,2	1,5	1,1	1,1	1,1	1,3	0,9	1,1	1,8	1,1	1,5	1,4	1,1	1,3	2,9	1,9	2,4
Allucinogeni (totale)	3,0	1,5	2,3	1,5	1,1	1,3	2,5	0,8	1,7	2,7	2,1	2,4	3,0	1,2	2,1	5,1	2,4	3,8
Stimolanti (totale)	2,9	2,3	2,6	2,1	1,8	2,0	2,5	1,8	2,1	2,2	2,1	2,1	2,6	2,1	2,4	5,1	3,6	4,4
Alcol	87,5	85,2	86,3	75,7	69,8	72,7	83,8	82,4	83,1	90,0	88,9	89,4	92,7	91,6	92,2	94,8	94,3	94,6
Energy drink	72,8	61,9	67,4	69,4	60,5	64,9	70,0	60,1	65,1	73,9	63,4	68,7	74,1	61,5	67,9	76,2	64,2	70,5
Tabacco	55,9	58,0	56,9	37,4	37,4	37,4	46,6	52,4	49,4	58,2	62,4	60,3	65,0	65,9	65,5	71,5	72,9	72,2
Anabolizzanti	1,8	1,4	1,6	1,8	1,6	1,7	2,1	1,6	1,9	1,7	1,5	1,6	2,2	0,8	1,5	1,4	1,2	1,3
Psicofarmaci (totale)	9,7	18,6	14,1	9,5	17,2	13,3	10,1	16,4	13,2	8,3	17,6	12,9	10,4	21,7	16,0	9,9	20,5	14,9
Farmaci attenzione	4,3	6,1	5,2	4,2	5,4	4,8	4,1	5,6	4,8	3,8	6,3	5,0	5,2	6,4	5,8	4,2	7,1	5,6
Farmaci diete	2,0	5,9	3,9	2,4	6,2	4,3	1,9	4,3	3,1	1,9	5,3	3,6	2,1	7,3	4,7	1,7	6,5	4,0
Farmaci dormire	7,2	13,4	10,3	7,3	12,4	9,8	7,6	11,8	9,7	6,1	12,1	9,1	7,8	16,2	12,0	7,1	14,8	10,7
Farmaci umore	2,6	5,5	4,0	2,0	5,0	3,5	2,5	4,5	3,5	2,1	6,0	4,0	3,0	6,3	4,6	3,1	5,9	4,4
Gioco d'azzardo	53,1	32,9	43,2	44,6	30,4	37,4	50,4	29,1	40,0	54,7	32,1	43,5	56,9	32,6	44,9	58,5	40,3	49,9

Fonte: Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche
Nota: allucinogeni: LSD, funghi allucigeni e ketamina; stimolanti: amfetamine, ecstasy, MDMA, GHB e metamfetamine
Psicofarmaci: farmaci per dormire, diete, iperattività e umore

ITALIA	15-19			PREVALENZA NEGLI ULTIMI DODICI MESI (%)														
SOSTANZE				15			16			17			18			19		
				M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T
Cannabis	29,2	21,7	25,5	11,5	9,7	10,6	22,4	16,0	19,3	32,6	25,8	29,2	37,5	26,7	32,2	41,6	31,2	36,7
Cocaina (totale)	2,4	1,2	1,8	1,1	0,9	1,0	1,6	0,8	1,2	2,1	1,1	1,6	2,8	1,5	2,1	4,1	1,9	3,1
Eroina (totale)	1,2	0,7	0,9	1,0	0,6	0,8	0,8	0,6	0,7	1,2	0,4	0,8	0,9	0,8	0,8	1,8	1,1	1,5
Allucinogeni (totale)	1,9	0,9	1,4	1,3	0,7	1,0	1,6	0,6	1,1	1,6	1,0	1,3	1,7	0,7	1,2	3,1	1,3	2,2
Stimolanti (totale)	1,7	1,2	1,4	1,2	1,1	1,1	1,3	0,9	1,1	1,3	1,2	1,3	1,4	1,0	1,2	2,9	1,6	2,3
Alcol	82,1	78,0	80,1	67,4	60,4	63,9	77,0	74,3	75,6	86,1	81,8	84,0	88,8	86,8	87,8	90,8	87,8	89,4
Energy drink	59,5	38,5	49,1	57,5	41,0	49,3	56,6	38,2	47,5	60,9	38,7	50,0	60,6	37,6	49,1	61,7	36,8	49,8
Tabacco	39,0	42,7	40,8	23,9	28,1	26,0	31,3	37,7	34,4	41,8	47,8	44,7	47,4	46,7	47,0	50,4	54,1	52,1
Tabacco (almeno una sigaretta al giorno)	22,0	21,3	21,7	8,3	9,6	8,9	15,7	15,6	15,6	24,1	22,8	23,4	28,6	24,6	26,6	32,7	34,7	33,6
Anabolizzanti	1,3	0,9	1,1	1,5	1,0	1,2	1,9	1,0	1,4	1,0	0,8	0,9	1,3	0,7	1,0	1,0	1,1	1,0
Psicofarmaci (totale)	5,3	12,2	8,7	5,5	11,7	8,6	5,6	10,3	7,9	4,9	11,1	7,9	5,1	14,6	9,8	5,1	13,3	9,0
Farmaci attenzione	2,4	3,9	3,2	2,4	3,5	3,0	2,2	3,4	2,8	2,2	4,0	3,1	2,8	4,4	3,6	2,5	4,5	3,4
Farmaci diete	1,2	3,7	2,4	1,8	3,8	2,8	0,9	2,9	1,9	1,1	3,0	2,0	1,3	4,8	3,1	0,9	3,9	2,3
Farmaci dormire	3,8	8,7	6,2	4,3	8,3	6,3	3,9	7,4	5,6	3,8	7,5	5,6	3,3	10,6	7,0	3,7	9,6	6,5
Farmaci umore	1,6	3,6	2,6	1,4	3,6	2,5	1,6	2,8	2,2	1,2	3,7	2,4	1,7	4,0	2,9	1,9	4,1	3,0
Gioco d'azzardo	49,8	29,8	40,0	40,9	28,3	34,6	47,2	26,3	37,0	52,0	28,6	40,4	53,2	29,5	41,5	55,5	36,2	46,3

Fonte: Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche
Nota: allucinogeni: LSD, funghi allucingeni e ketamina; stimolanti: amfetamine, ecstasy, MDMA, GHB e metamfetamine
Psicofarmaci: farmaci per dormire, diete, iperattività e umore

ITALIA	15-19			PREVALENZA NEGLI ULTIMI TRENTA GIORNI (%)														
SOSTANZE				15			16			17			18			19		
				M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T
Cannabis	18,2	12,2	15,3	6,7	6,0	6,4	13,8	10,1	12,0	20,2	14,8	17,5	23,7	13,7	18,7	26,5	17,0	22,0
Cocaina (totale)	1,3	0,5	0,9	1,0	0,4	0,7	0,9	0,3	0,6	0,9	0,7	0,8	1,4	0,5	0,9	2,4	0,8	1,6
Eroina (totale)	0,7	0,4	0,5	0,9	0,3	0,6	0,4	0,4	0,4	0,5	0,1	0,3	0,5	0,2	0,4	1,0	0,8	0,9
Allucinogeni (totale)	1,0	0,4	0,7	1,0	0,3	0,7	0,9	0,1	0,5	0,6	0,3	0,5	1,2	0,3	0,8	1,5	0,7	1,1
Stimolanti (totale)	0,9	0,6	0,7	1,1	0,7	0,9	0,7	0,3	0,5	0,7	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	1,3	0,9	1,1
Alcol	67,1	60,0	63,6	49,1	38,7	43,9	59,1	54,4	56,8	71,8	64,3	68,1	77,8	70,8	74,3	77,6	72,9	75,4
Energy drink	42,1	21,1	31,7	45,0	23,4	34,2	39,7	20,5	30,2	43,1	20,7	32,1	41,4	19,7	30,6	41,0	21,0	31,5
Binge drinking	38,2	30,6	34,5	23,6	18,0	20,7	33,9	28,3	31,1	41,1	35,7	38,4	47,8	34,5	41,3	44,7	37,1	41,1
Tabacco	32,9	35,7	34,3	17,3	21,7	19,5	24,9	30,0	27,4	36,4	40,0	38,1	40,8	39,8	40,3	44,8	47,9	46,3
Anabolizzanti	1,1	0,6	0,8	1,1	0,5	0,8	1,6	0,6	1,1	0,8	0,5	0,7	1,1	0,4	0,7	0,9	0,8	0,9
Psicofarmaci (totale)	2,8	6,5	4,6	3,0	6,2	4,6	2,4	5,3	3,9	2,8	6,1	4,5	2,8	7,9	5,4	2,7	6,8	4,7
Farmaci attenzione	1,2	1,9	1,6	1,5	2,0	1,7	1,0	1,9	1,4	1,3	2,0	1,6	1,3	1,7	1,5	1,2	1,8	1,5
Farmaci diete	0,6	1,6	1,1	0,9	1,9	1,4	0,3	1,0	0,6	0,5	1,8	1,1	1,0	2,1	1,6	0,5	1,5	1,0
Farmaci dormire	1,9	4,5	3,2	2,2	4,4	3,3	1,6	3,9	2,7	1,9	3,8	2,8	1,5	5,8	3,6	2,1	4,5	3,3
Farmaci umore	0,8	2,0	1,4	0,7	2,0	1,4	0,8	1,3	1,0	0,7	1,9	1,3	0,9	2,2	1,6	1,0	2,3	1,6

Fonte: Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche
Nota: allucinogeni: LSD, funghi allucingeni e ketamina; stimolanti: amfetamine, ecstasy, MDMA, GHB e metamfetamine; binge drinking: 5 o più "bevute" di fila
Psicofarmaci: farmaci per dormire, diete, iperattività e umore