

Uso di sostanze illegali nella popolazione giovanile scolarizzata. Anno 2019 (stime pesate).

ITALIA	15-19			PREVALENZA NELLA VITA (%)														
SOSTANZE				15			16			17			18			19		
				M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T
Cannabis	37,1	29,8	33,5	14,9	10,4	12,7	27,2	22,4	24,9	40,0	31,8	36,0	46,8	38,6	42,7	55,7	47,5	51,8
Cocaina (totale)	3,7	2,0	2,9	1,9	1,0	1,5	2,1	1,8	1,9	3,4	1,4	2,4	3,5	2,1	2,8	7,3	3,8	5,6
Oppiacei (totale)	1,3	0,8	1,1	1,0	0,6	0,8	0,7	0,9	0,8	1,5	0,7	1,1	1,5	0,6	1,1	2,0	1,2	1,6
Allucinogeni (totale)	2,7	1,3	2,0	1,7	0,6	1,1	1,6	0,9	1,2	2,6	0,9	1,8	3,1	1,6	2,3	4,6	2,6	3,6
Stimolanti (totale)	3,0	2,0	2,5	2,1	1,5	1,8	2,1	1,8	1,9	2,6	1,2	1,9	2,8	2,1	2,5	5,2	3,3	4,3
Alcol	87,5	86,1	86,8	76,1	72,3	74,2	84,8	83,2	84,0	90,0	91,0	90,5	92,9	90,8	91,9	94,0	94,1	94,0
Energy drink	75,7	61,8	68,8	69,4	58,6	63,9	76,4	63,6	70,2	77,4	63,0	70,4	78,6	62,1	70,3	77,0	61,9	69,8
Tabacco	55,9	59,6	57,7	36,3	37,6	36,9	49,4	54,6	52,0	57,4	62,6	59,9	64,6	69,7	67,1	71,3	75,1	73,1
Anabolizzanti	1,5	0,7	1,1	1,4	0,8	1,1	1,8	0,6	1,2	1,4	0,9	1,1	1,3	0,7	1,0	1,6	0,7	1,2
Psicofarmaci (totale)	7,2	17,1	12,0	5,8	14,0	9,9	6,4	17,0	11,5	7,9	18,7	13,1	7,9	17,6	12,8	7,9	18,4	12,9
Farmaci attenzione	2,5	5,5	4,0	1,9	4,8	3,4	2,0	6,3	4,1	2,9	5,4	4,1	2,7	5,1	3,9	2,8	6,0	4,3
Farmaci diete	1,0	4,0	2,5	0,8	3,3	2,1	1,0	3,8	2,4	1,1	4,4	2,7	1,3	4,5	2,9	0,9	3,9	2,3
Farmaci dormire	5,1	12,4	8,7	4,4	10,3	7,4	4,2	12,6	8,3	5,6	13,3	9,3	5,6	12,4	9,0	5,9	13,5	9,6
Farmaci umore	1,8	4,6	3,2	0,9	2,8	1,9	1,4	3,8	2,6	2,2	5,1	3,7	2,1	5,4	3,8	2,4	6,2	4,2
Gioco d'azzardo	56,7	38,3	47,7	48,8	35,2	41,9	52,0	34,8	43,6	55,9	37,0	46,6	62,2	40,3	51,2	64,9	44,7	55,3

Fonte: Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche
Nota: allucinogeni: LSD, funghi allucinogeni e ketamina; stimolanti: amfetamine, ecstasy, MDMA e GHB
Psicofarmaci: farmaci per dormire, diete, iperattività e umore

ITALIA	15-19			PREVALENZA NEGLI ULTIMI DODICI MESI (%)														
SOSTANZE				15			16			17			18			19		
				M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T
Cannabis	29,4	22,1	25,8	12,4	8,6	10,5	23,3	19,0	21,2	33,2	25,5	29,4	36,9	28,6	32,8	41,1	30,3	36,0
Cocaina (totale)	2,4	1,3	1,8	1,5	0,7	1,1	1,0	1,1	1,1	2,3	1,0	1,6	2,2	1,3	1,8	4,6	2,3	3,5
Oppiacei (totale)	0,9	0,4	0,6	0,9	0,1	0,5	0,4	0,4	0,4	1,0	0,5	0,7	0,9	0,3	0,6	1,3	0,6	1,0
Allucinogeni (totale)	1,8	0,7	1,3	0,9	0,5	0,7	1,2	0,5	0,9	1,8	0,6	1,2	2,3	0,7	1,5	2,8	1,2	2,1
Stimolanti (totale)	1,9	1,0	1,4	1,5	0,7	1,1	1,1	0,7	0,9	1,7	0,8	1,3	1,9	1,1	1,5	3,0	1,8	2,4
Alcol	82,5	79,0	80,8	68,4	61,8	65,1	78,8	76,4	77,6	86,1	84,9	85,5	89,1	85,3	87,2	90,2	88,0	89,1
Energy drink	63,4	38,3	51,0	59,8	37,9	48,7	64,4	43,4	54,2	64,8	39,2	52,2	65,4	35,7	50,3	62,9	35,4	49,7
Tabacco	38,4	42,9	40,7	24,3	26,4	25,3	32,0	40,5	36,1	37,9	46,3	42,0	46,5	49,3	47,9	52,1	54,1	53,1
Tabacco (almeno una sigaretta al giorno)	20,7	22,1	21,4	8,0	8,0	8,0	15,8	18,8	17,2	19,5	21,5	20,5	26,1	28,8	27,4	34,6	35,0	34,8
Anabolizzanti	1,0	0,5	0,7	1,1	0,5	0,8	0,9	0,3	0,6	1,0	0,6	0,8	0,8	0,4	0,6	1,1	0,5	0,8
Psicofarmaci (totale)	3,7	9,6	6,6	2,7	7,9	5,4	4,0	9,5	6,7	3,8	10,4	7,0	4,1	9,2	6,7	4,1	11,2	7,5
Farmaci attenzione	1,4	3,0	2,2	1,1	2,8	2,0	1,5	3,8	2,6	1,2	2,5	1,9	1,5	2,6	2,0	1,7	3,2	2,4
Farmaci diete	0,5	2,0	1,2	0,4	1,7	1,1	0,6	2,0	1,3	0,3	2,3	1,3	0,9	2,0	1,4	0,5	2,0	1,2
Farmaci dormire	2,6	6,8	4,7	2,0	5,5	3,7	2,5	6,8	4,6	2,8	7,9	5,3	2,8	6,2	4,5	3,3	7,6	5,3
Farmaci umore	1,0	2,7	1,8	0,4	1,3	0,8	0,9	2,2	1,5	1,3	2,9	2,1	1,2	3,0	2,1	1,4	4,1	2,7
Gioco d'azzardo	54,3	35,9	45,2	46,3	33,8	40,0	50,2	32,7	41,7	53,9	34,5	44,4	59,8	37,2	48,5	61,4	41,2	51,8

Fonte: Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche
Nota: allucinogeni: LSD, funghi allucingeni e ketamina; stimolanti: amfetamine, ecstasy, MDMA e GHB
Psicofarmaci: farmaci per dormire, diete, iperattività e umore

ITALIA	15-19			PREVALENZA NEGLI ULTIMI TRENTA GIORNI (%)														
SOSTANZE				15			16			17			18			19		
				M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T
Cannabis	19,1	12,0	15,6	8,4	4,8	6,6	15,2	11,3	13,3	21,6	15,0	18,3	24,5	16,1	20,4	25,8	13,5	20,0
Cocaina (totale)	1,4	0,6	1,0	1,0	0,3	0,7	0,6	0,4	0,5	1,5	0,6	1,0	0,9	0,5	0,7	2,6	1,1	1,9
Oppiacei (totale)	0,6	0,2	0,4	0,7	0,0	0,4	0,4	0,2	0,3	0,7	0,3	0,5	0,4	0,2	0,3	0,9	0,3	0,6
Allucinogeni (totale)	1,0	0,3	0,7	0,7	0,1	0,4	0,9	0,3	0,6	1,0	0,3	0,7	0,8	0,4	0,6	1,5	0,6	1,1
Stimolanti (totale)	1,0	0,5	0,8	1,1	0,3	0,7	0,7	0,2	0,5	0,9	0,6	0,7	0,8	0,6	0,7	1,6	0,9	1,3
Alcol	66,8	60,7	63,8	46,5	40,7	43,6	59,4	55,8	57,7	71,5	65,9	68,8	77,5	69,9	73,7	78,8	72,5	75,8
Energy drink	45,4	20,3	33,0	42,3	20,5	31,3	48,0	24,1	36,4	47,1	20,6	34,1	46,1	18,5	32,2	43,5	17,9	31,3
Binge drinking	41,1	32,0	36,6	24,5	19,6	22,0	35,5	29,3	32,4	44,9	36,4	40,7	49,0	38,4	43,7	51,4	37,5	44,8
Tabacco	32,8	35,3	34,0	16,8	19,5	18,1	27,1	32,0	29,5	32,7	37,8	35,2	39,5	43,0	41,2	47,1	45,9	46,5
Anabolizzanti	0,8	0,3	0,5	0,8	0,3	0,6	0,7	0,1	0,4	0,9	0,4	0,7	0,5	0,2	0,3	0,9	0,4	0,7
Psicofarmaci (totale)	2,1	5,6	3,8	1,5	4,6	3,1	2,4	5,5	3,9	2,0	6,4	4,1	2,2	4,4	3,3	2,7	7,1	4,8
Farmaci attenzione	0,8	1,7	1,3	0,6	1,6	1,1	0,9	2,3	1,5	0,7	1,3	1,0	0,8	1,1	1,0	1,1	2,4	1,7
Farmaci diete	0,5	1,1	0,8	0,4	0,9	0,6	0,7	1,2	1,0	0,3	1,1	0,7	0,7	1,1	0,9	0,4	1,0	0,7
Farmaci dormire	1,5	3,8	2,6	1,2	2,8	2,0	1,2	3,8	2,5	1,3	4,7	3,0	1,6	3,1	2,3	2,0	4,7	3,3
Farmaci umore	0,7	1,5	1,1	0,2	0,8	0,5	0,8	1,4	1,1	0,8	1,5	1,1	0,5	1,5	1,0	1,3	2,3	1,8

Fonte: Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche
Nota: allucinogeni: LSD, funghi allucingeni e ketamina; stimolanti: amfetamine, ecstasy, MDMA e GHB; binge drinking: 5 o più "bevute" di fila
Psicofarmaci: farmaci per dormire, diete, iperattività e umore