

Uso di sostanze illegali nella popolazione giovanile scolarizzata. Anno 2021

ITALIA	15-19			PREVALENZA NELLA VITA (%)														
				15			16			17			18			19		
				M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T
Cannabis	26,5	20,9	23,7	7,0	5,5	6,2	16,8	15,3	16,1	25,8	20,5	23,2	38,1	30,8	34,4	43,9	33,1	38,8
Cocaina (totale)	3,1	1,4	2,3	1,5	0,5	1,0	2,3	1,4	1,8	2,1	2,2	2,2	3,9	1,2	2,6	5,6	1,9	3,9
Eroina (totale)	1,2	0,7	1,0	1,1	0,4	0,7	1,5	0,4	1,0	0,7	0,7	0,7	2,0	1,1	1,5	0,8	0,9	0,9
Allucinogeni (totale)	1,9	1,2	1,5	1,6	0,5	1,0	2,0	1,2	1,6	1,1	1,6	1,4	2,1	0,6	1,4	2,5	1,9	2,2
Stimolanti (totale)	1,6	1,4	1,5	0,8	0,8	0,8	1,4	1,1	1,3	1,0	1,8	1,4	2,6	1,3	1,9	2,3	1,9	2,1
Alcol	75,8	75,9	75,9	56,0	58,6	57,3	68,9	69,9	69,4	78,8	79,2	79,0	83,8	85,8	84,8	88,1	85,7	87,0
Energy drink	68,7	57,3	63,6	57,8	48,9	53,5	64,2	53,7	59,4	69,8	59,7	65,2	75,0	63,2	69,9	78,5	65,1	72,8
Tabacco	59,2	62,9	61,0	31,9	37,5	34,8	50,5	55,7	53,1	60,5	68,8	64,7	70,1	72,6	71,4	76,8	77,2	77,0
Anabolizzanti	1,9	1,3	1,6	2,2	1,3	1,7	1,8	1,6	1,7	1,9	0,7	1,4	2,2	1,3	1,8	1,2	1,4	1,3
Psicofarmaci (totale)	5,9	15,6	10,5	4,8	12,8	8,6	6,5	14,5	10,2	5,4	17,5	11,1	5,6	16,6	10,9	7,2	16,6	11,4
Farmaci attenzione	1,4	2,9	2,1	0,6	3,3	1,9	1,6	2,9	2,1	1,0	2,7	1,7	1,7	2,5	2,1	2,1	3,0	2,5
Farmaci diete	1,2	4,4	2,6	1,5	3,4	2,4	2,1	3,1	2,6	0,6	6,0	3,0	1,0	4,9	2,8	0,8	4,6	2,5
Farmaci dormire	4,3	12,0	7,9	3,1	9,5	6,2	4,6	11,2	7,6	4,4	13,6	8,6	3,8	13,2	8,3	5,5	12,6	8,7
Farmaci umore	1,7	3,7	2,6	1,5	3,4	2,4	1,6	3,8	2,6	1,3	3,8	2,4	1,8	4,2	2,9	2,4	3,3	2,8
Gioco d'azzardo	55,7	44,3	50,1	44,7	40,9	42,8	50,6	42,3	46,5	54,4	46,8	50,6	58,9	44,9	51,9	68,9	46,9	58,3

PREVALENZA NELLA VITA (%)					
15-17			18-19		
M	F	T	M	F	T
16,4	13,6	15,0	41,2	32,0	36,8
1,9	1,4	1,7	4,8	1,6	3,2
1,1	0,5	0,8	1,4	1,0	1,2
1,6	1,1	1,3	2,3	1,3	1,8
1,1	1,2	1,1	2,5	1,6	2,0
68,1	69,2	68,6	86,1	85,8	85,9
63,7	53,7	59,0	76,8	64,2	71,4
47,9	54,2	51,1	73,8	75,0	74,4
2,0	1,2	1,6	1,7	1,3	1,5
5,6	14,9	10,0	6,5	16,6	11,4
1,0	3,0	1,9	2,0	2,7	2,3
1,4	4,2	2,6	0,9	4,8	2,6
4,0	11,3	7,4	4,7	12,9	8,5
1,5	3,6	2,5	2,1	3,8	2,9
49,9	43,3	46,6	64,3	45,9	55,3

Fonte: Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche

Nota: allucinogeni: LSD, funghi allucinogeni e ketamina; stimolanti: amfetamine, ecstasy, MDMA, GHB e metamfetamine

Psicofarmaci: farmaci per dormire, diete, iperattività e umore

ITALIA	15-19			PREVALENZA NEGLI ULTIMI DODICI MESI (%)														
				15			16			17			18			19		
				M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T
Cannabis	20,0	15,4	17,7	5,7	4,2	4,9	13,6	13,3	13,4	19,1	16,0	17,5	30,1	22,5	26,3	31,4	21,7	26,8
Cocaina (totale)	1,8	0,9	1,4	1,1	0,4	0,8	1,8	1,0	1,4	1,0	1,4	1,2	1,9	0,9	1,4	3,1	0,8	2,0
Eroina (totale)	0,7	0,3	0,5	0,3	0,4	0,3	1,2	0,3	0,8	0,6	0,4	0,5	0,9	0,2	0,6	0,4	0,3	0,4
Allucinogeni (totale)	0,9	0,5	0,7	0,8	0,1	0,4	1,2	0,6	0,9	0,6	1,0	0,8	1,0	0,3	0,6	0,8	0,7	0,8
Stimolanti (totale)	0,8	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	1,1	0,7	0,9	0,6	1,1	0,8	1,0	0,6	0,8	0,6	0,3	0,5
Alcol	71,0	70,6	70,8	47,1	52,2	49,8	63,9	65,3	64,6	74,5	73,0	73,7	80,4	80,7	80,6	85,1	81,1	83,2
Energy drink	55,7	38,8	48,1	47,7	35,8	42,0	54,3	37,8	46,7	56,6	41,4	49,7	60,2	40,5	51,6	61,1	39,5	52,1
Tabacco	39,9	45,3	42,6	16,5	26,3	21,6	30,8	41,6	36,3	42,2	46,2	44,3	48,3	51,3	49,9	56,2	59,1	57,6
Tabacco (almeno una sigaretta al giorno)	22,5	20,7	21,6	6,6	6,5	6,5	12,2	18,7	15,5	22,3	20,4	21,3	28,7	24,3	26,4	38,1	32,3	35,3
Anabolizzanti	1,0	0,6	0,8	1,4	0,5	1,0	1,0	0,9	1,0	0,9	0,2	0,6	1,1	0,8	1,0	0,7	0,5	0,6
Psicofarmaci (totale)	3,5	10,2	6,6	3,1	9,3	6,1	4,1	10,3	7,0	2,7	11,3	6,8	3,6	11,3	7,3	4,0	8,7	6,1
Farmaci attenzione	0,9	1,5	1,2	0,5	2,4	1,4	1,4	1,8	1,6	0,3	1,2	0,7	0,9	1,3	1,1	1,3	0,9	1,1
Farmaci diete	0,8	2,8	1,7	1,0	2,9	1,9	1,4	2,4	1,8	0,2	3,5	1,7	0,9	2,9	1,8	0,7	2,1	1,3
Farmaci dormire	2,6	7,8	5,0	2,1	6,7	4,3	3,3	7,9	5,4	2,4	8,6	5,3	2,3	9,1	5,5	3,0	6,9	4,8
Farmaci umore	1,1	2,5	1,7	1,2	2,1	1,6	1,2	2,8	1,9	0,6	2,6	1,5	1,3	3,2	2,2	1,3	1,8	1,5
Gioco d'azzardo	48,2	35,8	42,0	38,4	33,9	36,1	43,0	34,4	38,8	47,2	38,2	42,7	50,9	34,5	42,7	60,3	37,7	49,4

PREVALENZA 12 MESI (%)					
15-17			18-19		
M	F	T	M	F	T
12,7	11,0	11,8	30,8	22,1	26,6
1,3	0,9	1,1	2,6	0,9	1,7
0,7	0,4	0,5	0,6	0,3	0,5
0,9	0,6	0,7	0,9	0,5	0,7
0,8	0,8	0,8	0,8	0,4	0,6
62,1	63,5	62,8	83,0	80,9	82,0
52,6	38,1	45,9	60,7	40,0	51,9
30,2	38,2	34,3	52,6	55,3	53,9
13,8	15,3	14,6	33,8	28,4	31,2
1,1	0,5	0,9	0,9	0,6	0,8
3,3	10,3	6,6	3,8	10,0	6,7
0,7	1,8	1,2	1,1	1,1	1,1
0,9	2,9	1,8	0,7	2,5	1,5
2,6	7,7	5,0	2,7	8,0	5,1
1,0	2,5	1,7	1,3	2,5	1,8
42,8	35,5	39,2	56,0	36,2	46,3

Fonte: Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche

Nota: allucinogeni: LSD, funghi allucinogeni e ketamina; stimolanti: amfetamine, ecstasy, MDMA, GHB e metamfetamine

Psicofarmaci: farmaci per dormire, diete, iperattività e umore

ITALIA	15-19			PREVALENZA NEGLI ULTIMI TRENTA GIORNI (%)														
				15			16			17			18			19		
				M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T
Cannabis	11,9	8,5	10,2	3,1	2,9	3,0	9,4	7,8	8,6	11,2	8,8	10,0	16,5	12,9	14,7	19,2	10,4	15,1
Cocaina (totale)	1,1	0,4	0,8	0,9	0,1	0,5	1,4	0,8	1,1	0,6	0,5	0,5	0,8	0,3	0,5	1,6	0,6	1,1
Eroina (totale)	0,4	0,1	0,3	0,3	0,1	0,2	0,9	0,3	0,6	0,3	0,1	0,2	0,7	0,1	0,4	0,1	0,0	0,1
Allucinogeni (totale)	0,4	0,1	0,3	0,4	0,1	0,3	0,8	0,1	0,4	0,5	0,4	0,5	0,3	0,1	0,2	0,2	0,0	0,1
Stimolanti (totale)	0,4	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,7	0,3	0,5	0,4	0,2	0,3	0,6	0,1	0,4	0,2	0,1	0,2
Alcol	62,3	62,1	62,2	42,4	44,2	43,3	54,7	57,2	56,0	65,2	63,3	64,3	70,2	73,1	71,7	75,6	72,4	74,0
Energy drink	36,6	21,4	29,7	31,5	20,7	26,2	38,8	21,6	30,9	36,8	22,7	30,5	38,5	21,1	30,9	38,0	21,0	30,9
Binge drinking	33,1	27,1	30,1	15,6	13,6	14,5	24,5	23,3	23,9	32,2	27,5	29,8	40,9	35,5	38,2	48,4	35,1	42,0
Tabacco	31,8	34,4	33,1	9,6	17,9	13,9	23,4	31,1	27,3	32,4	33,8	33,1	39,7	39,9	39,8	48,5	48,0	48,2
Anabolizzanti	0,8	0,3	0,6	1,0	0,4	0,7	0,7	0,5	0,6	0,6	0,0	0,4	0,9	0,5	0,7	0,6	0,2	0,4
Psicofarmaci (totale)	2,0	6,2	4,0	2,3	6,0	4,1	2,6	6,6	4,4	1,2	6,8	3,9	1,9	6,2	4,0	1,8	5,7	3,5
Farmaci attenzione	0,7	0,9	0,8	0,5	1,6	1,0	1,1	0,8	0,9	0,1	0,7	0,4	0,8	0,8	0,8	0,9	0,7	0,8
Farmaci diete	0,7	1,4	1,0	0,8	1,8	1,2	1,3	1,3	1,3	0,2	1,5	0,8	0,8	1,1	1,0	0,6	1,3	0,9
Farmaci dormire	1,3	4,9	2,9	1,2	4,2	2,6	1,9	5,4	3,5	1,2	5,3	3,1	0,7	5,2	2,8	1,3	4,5	2,7
Farmaci umore	0,7	1,5	1,0	1,1	1,7	1,4	0,8	1,3	1,0	0,4	1,8	1,1	0,5	1,2	0,8	0,6	1,3	0,9

PREVALENZA 30 GIORNI (%)					
15-17			18-19		
M	F	T	M	F	T
7,8	6,4	7,1	18,0	11,6	14,9
0,9	0,4	0,7	1,2	0,4	0,8
0,5	0,2	0,3	0,4	0,1	0,2
0,6	0,2	0,4	0,2	0,1	0,2
0,4	0,3	0,3	0,4	0,1	0,3
54,3	54,9	54,6	73,1	72,7	72,9
35,6	21,6	29,0	38,2	21,1	30,9
24,2	21,4	22,8	45,0	35,3	40,2
22,1	27,7	24,9	44,5	44,0	44,2
0,8	0,3	0,6	0,7	0,3	0,6
2,0	6,4	4,1	1,9	5,9	3,8
0,6	1,1	0,8	0,9	0,8	0,8
0,8	1,5	1,1	0,7	1,2	0,9
1,4	4,9	3,1	1,0	4,8	2,8
0,8	1,6	1,1	0,6	1,3	0,9

Fonte: Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche

Nota: allucinogeni: LSD, funghi allucinogeni e ketamina; stimolanti: amfetamine, ecstasy, MDMA, GHB e metamfetamine; binge drinking: 5 o più "bevute" di fila

Psicofarmaci: farmaci per dormire, diete, iperattività e umore