

Uso di sostanze illegali nella popolazione giovanile scolarizzata. Anno 2022 (stime pesate).

ITALIA	15-19			PREVALENZA NELLA VITA (%)														
				15			16			17			18			19		
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T
Cannabis	31,3	28,1	29,7	12,2	14,2	13,2	23,8	23,4	23,6	31,6	24,5	28,1	36,9	33,0	35,0	52,6	46,5	49,6
Cocaina (totale)	4,0	2,7	3,3	3,3	3,9	3,6	5,5	2,6	4,1	2,3	1,9	2,1	4,0	2,0	3,0	5,0	3,1	4,0
Oppiacei (totale)	2,3	2,3	2,3	1,3	3,3	2,3	2,3	2,5	2,4	1,7	1,0	1,4	3,4	1,4	2,4	2,7	3,7	3,2
Allucinogeni (totale)	4,2	2,7	3,5	4,4	3,8	4,1	3,0	2,8	2,9	3,2	2,4	2,8	5,5	2,4	4,0	4,9	2,4	3,7
Stimolanti (totale)	4,8	5,7	5,2	4,5	6,6	5,5	5,3	6,5	5,9	4,3	4,1	4,2	4,2	4,4	4,3	5,7	7,1	6,4
Alcol	82,4	84,4	83,4	72,0	71,7	71,9	77,9	81,1	79,4	81,9	86,6	84,2	88,1	90,3	89,2	93,9	92,7	93,3
Energy drink	73,8	52,0	63,0	72,9	53,5	63,2	71,8	58,3	65,2	73,3	51,0	62,3	72,8	45,8	59,4	78,9	51,4	65,3
Tabacco	42,3	52,3	47,2	24,4	36,7	30,5	31,8	46,5	39,0	43,9	53,8	48,7	49,3	59,5	54,3	65,0	68,1	66,5
Anabolizzanti	2,8	1,9	2,4	2,1	2,2	2,1	3,8	1,4	2,6	3,2	1,9	2,6	2,0	1,4	1,7	2,8	2,6	2,7
Psicofarmaci (totale)	12,9	24,5	18,7	12,1	25,7	19,1	11,2	24,8	17,8	10,7	24,5	17,5	16,7	23,0	19,8	13,9	24,8	19,3
Farmaci attenzione	4,2	7,8	6,0	3,5	9,7	6,7	3,9	8,5	6,1	3,6	8,3	5,9	7,0	5,7	6,3	3,0	6,7	4,8
Farmaci diete	2,0	7,3	4,6	1,5	7,0	4,3	2,3	8,7	5,4	2,0	6,8	4,3	1,9	7,7	4,8	2,1	6,2	4,1
Farmaci dormire	8,5	17,5	13,0	7,6	17,9	12,9	6,5	16,3	11,3	8,1	16,9	12,4	10,3	17,6	13,9	9,9	19,2	14,5
Farmaci umore	2,5	6,2	4,3	3,1	6,1	4,7	1,6	7,6	4,6	1,5	5,6	3,5	3,3	4,8	4,1	3,0	6,8	4,8
Gioco d'azzardo	63,0	51,2	57,2	57,8	54,2	56,0	58,8	51,0	55,0	62,9	47,7	55,5	65,2	49,8	57,5	70,5	54,1	62,4

PREVALENZA NELLA VITA (%)					
15-17			18-19		
M	F	T	M	F	T
22,9	20,8	21,9	44,3	39,4	41,9
3,7	2,8	3,2	4,4	2,5	3,5
1,8	2,2	2,0	3,0	2,5	2,8
3,5	3,0	3,2	5,2	2,4	3,8
4,7	5,7	5,2	4,9	5,7	5,3
77,4	79,9	78,6	90,9	91,4	91,1
72,7	54,3	63,6	75,7	48,4	62,2
33,5	45,7	39,5	56,8	63,4	60,0
3,1	1,8	2,5	2,4	2,0	2,2
11,3	25,0	18,1	15,4	23,9	19,6
3,6	8,8	6,2	5,1	6,1	5,6
2,0	7,5	4,7	2,0	7,0	4,5
7,4	17,0	12,2	10,1	18,3	14,2
2,0	6,4	4,2	3,2	5,7	4,4
59,9	50,8	55,5	67,7	51,8	59,8

Fonte: Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche
 Nota: allucinogeni: LSD, funghi allucigeni e ketamina; stimolanti: amfetamine, ecstasy, MDMA e GHB
 Psicofarmaci: farmaci per dormire, diete, iperattività e umore

ITALIA	15-19			PREVALENZA NEGLI ULTIMI DODICI MESI (%)														
				15			16			17			18			19		
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T
Cannabis	25,4	21,9	23,7	10,0	11,1	10,6	19,8	18,6	19,2	28,0	20,9	24,5	28,5	25,2	26,9	40,9	34,7	37,8
Cocaina (totale)	2,1	1,4	1,8	1,3	2,2	1,8	2,1	1,2	1,7	1,2	1,0	1,1	3,0	1,1	2,1	3,0	1,6	2,3
Oppiacei (totale)	0,9	1,1	1,0	0,6	0,7	0,7	1,0	1,1	1,0	0,8	0,8	0,8	1,3	0,7	1,0	0,9	2,4	1,6
Allucinogeni (totale)	2,0	1,1	1,6	1,5	1,2	1,3	0,9	0,9	0,9	1,5	1,3	1,4	3,4	0,9	2,2	3,0	1,2	2,1
Stimolanti (totale)	2,6	1,7	2,1	2,4	1,9	2,1	2,8	2,3	2,5	1,7	0,9	1,3	3,2	1,1	2,2	3,1	2,1	2,6
Alcol	76,7	78,6	77,7	64,3	66,1	65,2	70,1	76,4	73,2	77,5	78,7	78,1	85,5	85,8	85,6	88,2	86,6	87,4
Energy drink	61,9	36,1	49,1	63,7	40,1	52,0	60,5	41,1	51,0	61,3	37,2	49,4	58,0	28,6	43,4	66,6	33,3	50,0
Tabacco	33,0	40,8	36,9	16,6	29,5	23,1	27,5	38,1	32,7	33,2	37,5	35,3	37,9	46,1	41,9	51,6	54,8	53,2
Tabacco (almeno una sigaretta al giorno)	17,2	19,8	18,5	6,3	11,5	8,9	14,1	17,0	15,5	16,3	15,8	16,1	19,5	23,6	21,5	31,5	32,6	32,0
Anabolizzanti	1,7	0,5	1,1	1,6	0,9	1,2	2,3	0,5	1,4	2,1	0,3	1,2	1,2	0,6	0,9	1,0	0,3	0,7
Psicofarmaci (totale)	6,5	15,1	10,8	5,1	14,7	10,0	5,4	16,6	10,9	5,1	14,8	9,8	9,2	14,3	11,7	7,5	15,3	11,3
Farmaci attenzione	2,0	4,0	3,0	1,2	5,0	3,1	2,8	6,2	4,4	1,6	3,4	2,5	2,7	2,1	2,4	1,7	3,3	2,5
Farmaci diete	0,8	4,2	2,5	0,5	4,4	2,5	0,9	4,2	2,5	0,4	4,3	2,3	1,1	5,2	3,1	1,1	3,0	2,0
Farmaci dormire	4,9	10,8	7,8	4,0	9,7	6,9	2,8	11,6	7,2	3,9	10,6	7,2	7,5	9,9	8,7	6,3	12,0	9,1
Farmaci umore	1,1	4,0	2,6	1,3	4,5	3,0	1,0	5,1	3,0	0,7	3,4	2,1	1,9	3,4	2,6	0,7	3,6	2,1
Gioco d'azzardo	57,4	44,1	50,9	52,8	47,7	50,3	52,6	43,6	48,1	56,7	41,0	49,1	59,5	43,5	51,5	65,9	45,3	55,7

PREVALENZA 12 MESI (%)					
15-17			18-19		
M	F	T	M	F	T
19,6	17,0	18,3	34,3	29,7	32,0
1,5	1,5	1,5	3,0	1,3	2,2
0,8	0,9	0,8	1,1	1,5	1,3
1,3	1,1	1,2	3,2	1,1	2,1
2,3	1,7	2,0	3,2	1,6	2,4
70,8	73,8	72,3	86,8	86,2	86,5
61,8	39,4	50,8	62,0	30,8	46,5
26,0	35,0	30,4	44,4	50,3	47,3
12,4	14,8	13,6	25,2	27,9	26,5
2,0	0,6	1,3	1,1	0,4	0,8
5,2	15,4	10,3	8,4	14,7	11,5
1,9	4,9	3,4	2,3	2,6	2,4
0,6	4,3	2,4	1,1	4,1	2,6
3,5	10,7	7,1	6,9	10,9	8,9
1,0	4,4	2,7	1,4	3,5	2,4
54,1	44,0	49,1	62,5	44,3	53,5

Fonte: Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche
 Nota: allucinogeni: LSD, funghi allucigeni e ketamina; stimolanti: amfetamine, ecstasy, MDMA e GHB
 Psicofarmaci: farmaci per dormire, diete, iperattività e umore

ITALIA	15-19			PREVALENZA NEGLI ULTIMI TRENTA GIORNI (%)														
				15			16			17			18			19		
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T
Cannabis	16,5	14,0	15,3	7,3	7,7	7,5	15,5	12,7	14,1	15,8	12,4	14,2	19,1	15,9	17,5	25,0	21,9	23,5
Cocaina (totale)	1,1	0,8	1,0	0,6	1,7	1,2	0,8	0,8	0,8	0,7	0,3	0,5	1,5	0,9	1,2	1,9	0,5	1,2
Oppiacei (totale)	0,6	0,8	0,7	0,6	0,4	0,5	0,6	0,7	0,7	0,5	0,5	0,5	0,7	0,5	0,6	0,7	1,7	1,2
Allucinogeni (totale)	1,2	0,6	0,9	1,2	0,6	0,9	0,4	0,6	0,5	0,9	0,7	0,8	2,1	0,9	1,5	1,2	0,2	0,7
Stimolanti (totale)	1,5	0,8	1,2	1,1	1,1	1,1	2,0	1,0	1,5	0,7	0,4	0,5	1,7	0,7	1,2	2,2	0,7	1,4
Alcol	63,4	65,0	64,2	48,2	50,3	49,2	56,4	59,8	58,0	62,0	66,2	64,0	74,9	76,0	75,5	77,9	73,4	75,7
Energy drink	47,6	24,5	36,2	48,8	26,0	37,5	47,0	29,9	38,6	46,1	25,9	36,2	45,8	17,8	31,9	50,8	22,9	36,9
Binge drinking	30,4	28,8	29,6	17,4	22,1	19,8	24,2	29,3	26,7	31,9	28,6	30,3	40,8	32,1	36,6	38,2	32,2	35,2
Tabacco	27,6	33,1	30,3	12,2	22,4	17,3	22,1	26,4	24,2	27,7	29,9	28,7	31,8	39,9	35,8	45,9	49,0	47,4
Anabolizzanti	1,1	0,4	0,7	0,4	0,5	0,5	1,8	0,4	1,1	1,0	0,2	0,6	1,2	0,6	0,9	0,9	0,2	0,5
Psicofarmaci (totale)	3,4	8,9	6,1	1,9	9,4	5,7	2,6	9,5	6,0	2,1	8,2	5,1	5,2	8,6	6,9	5,3	8,8	7,0
Farmaci attenzione	1,1	2,3	1,7	0,3	3,4	1,9	1,3	2,7	2,0	0,7	2,1	1,4	2,1	1,5	1,8	1,2	1,9	1,5
Farmaci diete	0,4	2,1	1,3	0,3	2,7	1,6	0,7	2,7	1,7	0,3	1,8	1,0	0,4	1,7	1,0	0,5	1,4	0,9
Farmaci dormire	2,5	6,2	4,3	1,4	6,1	3,9	1,3	5,8	3,5	1,6	5,5	3,5	3,7	6,0	4,9	4,5	7,6	6,0
Farmaci umore	0,6	2,3	1,4	0,3	2,3	1,3	0,6	2,9	1,7	0,5	2,2	1,4	1,0	2,1	1,5	0,6	2,0	1,3

PREVALENZA 30 GIORNI (%)					
15-17			18-19		
M	F	T	M	F	T
13,1	11,0	12,0	21,9	18,7	20,3
0,7	0,9	0,8	1,7	0,7	1,2
0,6	0,6	0,6	0,7	1,1	0,9
0,8	0,6	0,7	1,7	0,6	1,1
1,3	0,8	1,1	2,0	0,7	1,3
55,7	58,9	57,2	76,4	74,8	75,6
47,2	27,3	37,4	48,2	20,2	34,3
24,7	26,7	25,7	39,6	32,2	35,9
20,9	26,2	23,5	38,5	44,2	41,3
1,1	0,4	0,7	1,0	0,4	0,7
2,2	9,0	5,6	5,3	8,7	7,0
0,8	2,7	1,7	1,6	1,7	1,7
0,4	2,4	1,4	0,4	1,6	1,0
1,4	5,8	3,6	4,1	6,7	5,4
0,5	2,5	1,5	0,8	2,0	1,4

Fonte: Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche
 Nota: allucinogeni: LSD, funghi allucigeni e ketamina; stimolanti: amfetamine, ecstasy, MDMA e GHB; binge drinking: 5 o più "bevute" di fila
 Psicofarmaci: farmaci per dormire, diete, iperattività e umore